



CXXI.

CENTURIA INSECTORUM

QUAM

P R A E S I D E

D. D. CAR. VON LINNÉ

Proposuit

BOAS JOHANSSON,
Calmariensis.

Upfaliæ 1763. Junii 23.

D. D.

Scientiæ quævis, æque ac imperia, suas habent vicissitudines, quibus adoleſcunt, florent, decrescent, & deprimuntur. Illa scientiæ naturalis pars, quam dudum *Aristoteles* incepérat liberaſtate Alexandri Magni ſuffultus, densis etiamnum tenebris occultata est.

Regnum, quod dicunt *Animale*, in sex coimmo-de fatis dividitur provincias, quarum unam inco-lunt INSECTA, quibus in describendis, noſtra nunc verſabitur opera. Incolæ hujus provinciæ, mira quidem ſunt animalia, *Pedum* numero, ani-malibus cæteris, quibus perfectiora ſunt corpora, longe præſtant; cuique enim ſex ſaltem, variis autem

CENTURIA INSECTORUM.

385

utem plures competit pedusculi. Communi quidem fruuntur aura, quam tamen non ore, non capite, sed laterum quibusdam hauriunt *spiraculis*. sensu, quem dicunt *Antennas*, organico gaudent, perspicaciam nostram prorsus eludente, quippe quo ipsi caremus. Sunt quidem instruēta Capite, quod vero, si unquam, certe hoc singulare est, mirandum, cerebro quod destituitur omni, etiam fibra medullaris, quamvis non prius, quam a ipso capite desinat, ibi tamen in molem organizatam vix glomeratur. Hæcce denique, ad unum omnia, animalia, suis vestita offibus cataracta & quasi loricata, mirifice incedunt. Proprietates hæc cuivis admirationem moverent maximam, nisi majori miraculo triplex esset forma, tria trinam quasi *metamorphosin* pleraque subeant; hæcce varium habent statum, quo non observatio alter ab altero, dignosci vix potest. Hæc nimantium turba numerum, in arido sibi vindicat maximam, *molem* vero minimam constituit; et vero, ut multitudine, ita opere, cæteris longe antecellit.

Ab antiquissimis inde temporibus, hæcce volalia fuere parvi æstimata; quin immo *noxia* eadem, nescio quid abominandum, nemo non habuerit. In primo rerum initio, insecta non extitisse, atque sic non ordine naturæ solemini, sed generatione equivoca produci, credula statuerat antiquitas, donec felix posteritas eos genuit viros, qui naturæ penetralia jugi studio petentes, cimelia ejusdem caulo sibi familiariora reddere occiperent. De instantiis nihil certi, perspicui saltem nihil, nobis improvida & negligens reliquit vetustas; Licet fateatur, communi litterarum palingenesiæ initio, radios quosdam luminis assulgere scientiæ entomologicæ incepisse, per paucos tamen justoque lani-

Tom. VI. B b guidio-

guidiores, ita ut nostris demum temporibus in aprico posita videatur.

Historia insectorum litteraria, in tres adposite omnino distribuitur EPOCHAS, quarum PRIMA, agmen dicit seculi sui jubar *Conradus Gesnerus*, qui indefessa, quæ ejus erat naturam rimendi aviditas, omnes historiæ naturalis partes versavit. Dein *Moufettus*, *Anglus*, in scenam prodiens, insecta demonstrare incepit. Tum *Aldrovandus*, *Italus*, in hac re magis sudavit, quam profecit. His denique *Fonstonus* successit, sed magis ut compilator, quam auctor.

SECUNDA Epochæ res naturæ perscrutati sunt, felicius distinctiusque in horum animalium cognitione procedere cœperunt; namque historiam insectorum ab ovo ipso ad ultimam senectutem perlustrarunt, vitam eorum, victum, immo ipsam, quam mireris, metamorphosin contuentes. Quid, quod exquisitus insecta delineata et æri incisa proposuerunt, & ea quidem arte, ut imagines agnoscere quivis facile posset. Huic peragendæ rei, omnium primi, summo inserviere opere *Hoeffnagelius* & *Goedartus*, viri pingendi arte clari, quos *Lijster* ingenio acutissimus, una cum *Blancardo*, fecutus est, donec *Swammerdamius*, quo laboris patientior non fuit alter, hanc rem ex professo tradendam sibi sumeret, ita quidem, ut sibi haud satis duxerit, formam Insectorum considerasse externam, sed anatomen eorum, ad miraculum usque subtilissimum fecutus sit *Merianam* matronam, belle & festive omnino curiosam, ea tantum, quæ alit Europa, insecta pervestigasse haud contentam, tantus insectorum permulxit atque allexit amor, ut, trans mare infestissimum, Surinamum usque Americæ, se infectis delectandi gratiâ iter iniverit. *Rajus* maxime laboriosus in descriptiones insectorum componen-

ponendas, ultimum senectutis tempus impendit. Quæ habitant in Anglia, insectorum examina, *Albinus* affabre delineavit. *Frischius* denique, quæ Germania habet insecta, clare proposuit.

TERTIA epocha hanc scientiam longe abundantiori auxit luce. N. D. PRÆSES entomologiam disciplinam in formam systematis redegit, insectis in Ordines Naturales dispositis, eorumdemque Generibus rite constitutis, quæ dilucidis & determinatis adumbravit Characteribus; adeo ut, e tenebris quasi evocata, in lucem pleniori processerint gradu. Eodem vero tempore, in hujus disciplinæ laudem & dignitatem, nova effulsit lux, insigne puta Galliæ Decus *Reaumur*, qui hanc doctrinam, a primis principiis & staminibus repetens, quodvis insectorum, ab ovo inde ad sepulcrum usque sequendo, intentiorique oculorum acie, formam, anatomiam, vitam, vietum, & mores eorum perlustrando, immortalitati dum commendavit nomen. Hunc Aulæ Mare-schallus D. *De Geer*, tenore uno continuavit laborem. Paullo aliquanto post, *Roesel*, Germanus, & laboris & honoris se præbuit æmulum, æmulis vero palmam præripuit figuris vivido prorsus colore efformatis, & id effecit, ut hæc cuiusvis grata acceptaque fuerit scientia. In hoc deinceps opere, *Wilkes*, Anglus, suum consumxit laborem, multa vero a *Roeseliis* mutuatus est. *L'Amiral*, Hollandus, insectorum figuras egregiæ & militæ pulchritudinis, omni diligentia nunc edendas perulgandasque curat. Præter, Araneas Svecicas, & Phalænas novas, formosissimis figuris ornatas, in lucem edidit Nostras *Clerk*, cujus vero opere novissimo, de *Papilionibus* Indicis, a Museo Ser. Reginæ mutuatis, vivido colore illustratis, quidquam pretiosius, vel splendidius, an quisquam in toto erudito orbe viderit, merito ambigitur.

Scilicet ibi quasi coram intuearis Papiliones, & qua formam, & qua numerum, insignes, ea abundantes venustate, qua lectissimis omnibus longe antecellant flosculis; quare nihil esset optabilius, quam ut hoc typis divulgaretur opus, cuius quidem unum alterumve exemplar est impressum. Physici, postquam moram, quam objectorum naturalium fecerat multitudo, beneficio disciplinæ systematicæ, concinne & perite constitutæ, tollere incepissent, si interius mox penetrarent & pressus inquirerent in naturæ œconomiam & politiam, operæ pretium se facturos judicarunt; sic enim uberrimam nobis dari occasionem, singularem Summi Artificis considerandi admirandique œconomiam, &, quod ad præsentem usque diem fere fuisset umbratile, luce palam intuendi, quomodo infecta, animalium minima, quorum officiis remotis, naturæ œconomia torperet, maxima onera laboris sustineant. Ea veritas, qua asseritur, Deum nihil frustra produxisse, sed, quæcumque creaverit, valde fuisse bona, tam oculos quam animos naturam intuentium abunde satis pavit. Quamvis enim infecta nostræ œconomiæ saepius officere putemus, eam tamen posthabendam esse œconomiæ totius universi, nulli dubitamus. Quemadmodum præterea medicinam facturos, constitutionem hominis valantis, & naturam corporis prius cognovisse, haud mediocriter juvabit, ita, si œconomiæ privatæ, ab universali quodammodo turbatæ & afflictæ, succurrere velimus, e re certe nobis erit, prius intellexisse, unde & a quo fonte incommoda exundent; quem ad recludendum, perperam adnitionem, nisi hanc disciplinam diligentius colamus, ea notantes infecta, quæ œconomiæ nostræ maxime noceant. Quod dum agitur, eveniet simul, ut stupenda naturæ miracula, ad debitam veneratio-

rationem piisque admirationem Summi Conditoris, totos nos convertant & rapiant.

NOSTRA, quæ jam agitur, Epocha tantum in cognoscendis insectis profecit, ut tot sibi habeat insectorum millia perspecta, quot orbis litteratus, ante dimidium circiter seculum, pernoferet centurias. Hæc animalcula adeo ordinate sunt disposita, nominibus genericis, characteribus, differentiis specificis, synonymis denique, in *Systemate Naturæ* N. D. Præsidis, editione decima, ut haud multo post plantis ipsis, nihil vel parum certe, cedant, & multitudine, & ordine, quem Botanici numerosissimi diu multum & multo labore quæsiverunt. Ante dimidium & quod excurrit seculum, viri scientia Botanica alioquin clarissimi, alto, quod ajunt, supercilie minimos despexerunt muscos, qui tanto hodie pretio invaserunt, & æstimatione, ut celeberrimus quisque Botanicus, novum detegere potuisse, insigni sibi honori ducat. Gre ges insectorum veteribus tanto fuerunt fastidio, quantæ æmulationi recentioribus, nova quævis indagandi insecta. Nostris temporibus, quodlibet Europæ regnum, plurimis magnique nominis naturæ consultis gloriatur & superbit, qui omnem operam, studium omne, novis copiis scribendis, & insectorum exercitui jungendis, navant. *Scopoli Fauna Carniolica* una cum *Goüani Fauna Monspeliensi*, quarum utraque plura nova insecta nobis promittit, communiter & avide exspectantur.

Ad hanc Academiam, in literarum studiis dum versor, duas, præ ceteris addiscendis, cura & attentione, qua possim, disciplinas proponi ex studio, Medicinam scilicet, & Historiam Naturam. Hujus particula, de Insectis, illis juxta, que nondum fuere divulgata, accuratius notatis, obiectamentum mihi attulit maxime insigne, quod

Præses mirifice adauxit, mihi met multas, & eas quidem rarissimas, demonstrando insectorum species, quas *D. D. Garden*, in provincia CAROLINA habitanti, nec non Domino Protribuno militum *Dahlberg*, SURINAMO reduci; Dom. *Nordgren*, in insula JAVA habitanti, cæteris, acceptas refert; ut taceam rarissima plurima insecta e PENNSYLVANIA Americes septentrionalis, missa ad Museum Nobil. *de Geer*. His naturæ deliciis blandius invitatus, petii, mihi ut concederetur optio, unicum eligendi centuriam, quam ad obrusam determinatam, perattento litterarum orbi proponerem, ut, *Tirocinium Academicum editurus*, hanc simul disciplinam aliquantulum augerem atque ornarem. Cujus voti spes me eo melior tenet, quo certius constat, centuriam insectorum rariorum, quam Dom. *Isaac Uddman*, eleganter elaboratam, Aboæ, sub Præsidio *D. D. Leche*, edidit, omnibus in amore atque in deliciis fuisse habitam. Verum enimvero, hæc dum molior, fatendum est, me, & temporis & chartæ angustiis, adeo fuisse præpeditum, ut descriptiōnem tam prolixam, tam ornatam, tam denique perspicuam, quam optasse, confidere haud potuerim. Mihi vero, quod habet verbum, prora & puppis ea fuit, ut hæcce nova a notioribus rite distinguerem, & distincta ab obliuione atque a silentio hominum vindicarem. Itaque Tibi, Benevolè Lector, centum species Insectorum, Indicorum & exoticorum, offero, quarum complures dignissimæ sunt, quæ ante oculos argutiores ponantur. Evidem vix credo, quod absque admiratione maxima quisquam visurus sit Cassidam *sp nificem* 7, Cassidam *bicornem* 9, Chrysomelam *gibbosam* 13, Gryllum *necydaloïden* 32, Gryllum *perspicillatum* 34, Cimicem *cristatum* 42, Thripem *paradoxam* 48, & Papilionem *eclipsin* 67.

COLEOPTERA.

1. SCARABÆUS *Tityus* thorace tricorni: intermedio maximo simplicissimo, capitis cornu recurvato simplicissimo.

Habitat in Pennsylvania. De Geer.

Similis Scarab. Herculi, totus lœvis, glaucus, magnitudine Scarab. nasicornis. Thoracis cornu maximum, absque dentibus lateralibus, simplicissimum, sed subtus pubescens. Capitis cornu adscendens, etiam simplicissimum.

2. SCARABÆUS *Molossus* thorace bicorni, capitis clypeo integerrimo, cornu erecto, elytris levibus.

Habitat in China.

Femina: *Magnitudo Scarab. Rhinocerotis*, ater. Capitis clypeus lunatus, integerrimus, margine elevato & stria elevata laterali utrinque. Cornu in medio clypei erecto. Thorax lœvis, retusus, antice glaber; cornu sive dens versus latera antrorsum adscendens, paulo brevior cornu capitis. Elytra non striata.

Similis Scarab. Lunari, sed major; nec clypeus marginatus; nec thorax supra linea exaratus, nec elytra striata.

3. SCARABÆUS *surinamus* muticus niger, thoracis incisurarumque marginibus flavis, sterno porrecto.

Habitat Surinami.

Magnitudo Scarab. Stercorarii; totus lœvis, niger. Caput ovatum, linea longitudinali flava. Thorax lœvis: marginibus lateralibus flavis. Scutellum medius. Sturnum antrorsum prominens, flavidum. Elytra lœvia. Abdominis segmenta nigra, margine flava; ultimum supra maculis IV, subtus vero tribus flavis. Pedes nigri. Femora lutea, nigro varia. Digihi invrati.

4. SCARABÆUS *Capreolus* maxillosus: maxilla exsertis apice tantum furcatis.

Habitat in America septentrionali.

Simillimus Scarab. Cervo Capite depresso truncato, sed maxillæ absque dente laterali. Pedes rufi sunt.

5. DERMESTES *Gleditsiæ subtomentosus pilaceus, antennis filiformibus, elytris striatis, femoribus posticis gibbosis.*

Habitat in seminibus Gleditsiæ Americes.

Facies Derm. Pisorum, sed duplo major. Femora postica valde crassa, non tamen vidi saltantem; sunt hæc mutica, dentata uti Derm. Pisorum.

6. DERMESTES *Bactridis, obsolete tomentosus subincanus, antennis filiformibus, elytris laeviusculis, femoribus posticis gibbosis. Facq. bist. t. 170.*

Habitat in semine Bactris Americes.

Simillimus Derm. Gleditsiæ, sed Elytra vix manifeste striata. Color totus glauco subincanus. Thorax absque punctis excavatis; cæterum simillimus. Femora colore corporis, nec ferruginea.

7. CASSIDA *spinifex ferruginea, elytris angulo antico spina porrecta.*

Habitat Surinami. Dahlberg.

Corpus fere triangulare, ferrugineum. Thorax longitudine capitinis, antice attenuatus, angulis posticis in spinam transversam productis. Elytra laevia, antice ad suturam angulata; angulis lateralibusque exsertis in spinam antrorsum porrectam, longitudine thoracis. Latera elytrorum utrinque foramine ovato pervia in femina; in mare vero elytra nec spina nec foramina gaudent.

8. CASSIDA *bipustulata viridis, elytra maculis lateralibus duabus sanguineis.*

Habitat Surinami. Dahlberg.

Corpus supra viride, subtus nigrum. Thorax parum emarginatus. Elytrorum margo lateralis maculis duabus sanguineis, etiam in pagina inferiori cærulea conspicuis.

9. CAS.

9. CASSIDA bicornis cyanea, elytris angulo antico spina truncata.

Habitat Surinami. Dahlberg.

Major; tota cyanea. Elytra excavato-punctata: angulo exteriore sive antico in spinam linearem truncatum producto. Thorax antice emarginatus.

10. CASSIDA leucophaea testacea margine punctisque flavis.

Habitat Surinami.

Minuta & reliquis nostratis minor. Margo hypoeum thoracem & elytra cingens, totus flavus. Diskus elytrorum thoracisque testaceus sive staphyleus: punctis majusculis, plurimis, luteis, elevatis. Elytra eam punctis excavatis, vix conspicuis, striata.

11. COCCINELLA sanguinea elytris sanguineis immaculatis, thorace maculis nigris.

Habitat Surinami.

Magnitudo ut minoribus nostratis. Thorax riger, marginibus pallidis. Punctum pallidum utrinque versus latera thoracis. Elytra verissime sanguinea. Pectus, abdomen, pedes, atri.

12. COCCINELLA surinamensis coleoptris rubris immaculatis, thorace capiteque nigris.

Habitat Surinami.

Magnitudo Coccin. 7-punctatae. Caput, Thorax, Scutellum, Pectus, Pedes, nigra. Elytra & abdomen rubra. Caput minus quam in Europaeis.

13. CHRYSOMELA gibbosa ovata nigra, elytris testaceis nigro punctatis: fascia media posticaque nigris.

Habitat Surinami.

Corpus magnum. Coleoptra medio versus futurum valde gibbosum.

14. CHRYSOMELA undulata ovata rufa, elytris fasciis tribus atro-ceruleis undulatis.

Habitat in Java.

Magnitudo *Chr. Tanaceti*: Thorax rufus, medio atro-cæruleus. Elytra rufa: fascia Prima latior undata, ad suturam antenorum porrecta; Secunda angustior, magis undulata; Tertia in apice, ad suturam coiens cum secunda. Antennæ, Pedes & antica Abdō minis atrō-cærulea.

15. **CHRYSOMELA castanea ovalis castanea**, elytris margine exteriore testaceo.

Habitat Surinami.

Media. Thorax linea longitudinali & margine exterio, uti etjam elytra, testacea.

16. **CHRYSOMELA Gortericæ subcylindrica atra glaberrima**, thorace elytrisque punctis IV flavescentibus.

Habita ad Cap. B. spei in Gorteria.

Magnitudo & statura Chrysomelæ vulgaris, tota atra, glabra. Elytra vix manifesta striato-punctata: puncta flavescentia IV, in singulis elytris majuscula; Quorum remota versus suturam interiorem; altero ad basin, altero ante apicem; Tertium ad marginem exteriorem versus basin, reniforme; Quartum ad apicem elytri. Thorax glaberrimus, nitidus: punctum ovatum ad singulum latus; tertium ad basin, rotundum; quartum ad scutellum, oblongum, minus, magis fulvum. Capitis frons puncto rotundo. Omnes maculæ luteæ; Pedes nigri & Antennæ corpore breviores.

17. **CHRYSOMELA octopunctata oblongiuscula nigra**, thorace testaceo, elytris punctis quatuor flavis.

Habitat Surinami. Dahlberg.

Media. Elytrorum maculæ quatuor, quorum I. parva; II. III. parvæ, pares; IV. major, ad apicem. Abdōmen testaceum.

18. **CHRYSOMELA punctatissima oblongiuscula viridi-aenea punctatissima**, pedibus ferrugineis.

Habitat Surinami.

Magni-

Magnitudo Cimicis, sericea, viridi-aenea, punctis eti atomis minimis confertis adspersa.

19. CURCULIO *Oryzae longirostris oblongus niger, elytris maculis quatuor ferrugineis, femoris muticis.*

Habitat in Oryzae seminibus, ab exteris regionibus latis.

Magnitudo grani oryzæ. Totus niger sive piceo-niger, punctis cavis scaber, oblongus, subitus piceus est. Elytra striata; in singulis maculae duæ ferrugineæ, quam prior ad basin elytri, posterior ante apicem elytri.

20. CURCULIO *surinamensis longirostris cyanus, elytrorum lateribus antice gibbis.*

Habitat Surinami.

Magnitudo Pisi. Elytra postice contractiora.

21. CANTHARIS *bicolor rubra, elytris postice violaceis.*

Habitat in Senegal.

Statura omnino Cantharidis rubra, sed dimidia elytrorum pars postica violacea nitidissima. Antennæ nigrae sunt.

22. CICINDELA *aequinoctialis flava, elytris fasciis duabus nigris latis.*

Habitat Surinami.

Media. Totum corpus flavum. Oculi nigri, minus prominuli. Thorax longitudinali linea excavata. Elytra obtusissima, singula striis decem elevatis acutis; fasciae duæ totam fere alam tegentes, undatæ.

23. CICINDELA *carolina cyanea nitida, elytrorum apicibus antennis pedibusque flavis.*

Habitat in Carolina. Garden.

Corpus magnitudine Cicind. campestris, viridi-caeruleum, aeneo nitens; at os, oculi, antennæ, palpi, pedes toti & elytrorum apices, flava. Elytrorum apices vix: macula sublunata laterali.

24. ELÄTER *ligneus ferrugineus, elytris munonatis.*

Habi-

Habitat Surinami. Dahlberg.

Corpus fere majus nostratisibus, colore subferrugineo & fere ligneo. Antennæ vix thorace longiores, nigræ, excepto primo articulo. Thorax oblongus admodum, medio longitudinaliter glabro. Elytra substriata, quasi costa distincta longitudinali pallidiore, & margine laterali simili; apices elytrorum pallidiores valde mucronati.

25. MELOE Chrysomeloides.

Habitat Surinami.

Corpus chrysomelæ, totum viridi-cærulescens, subtus nigro-violaceum. Antennæ nigræ. Palmæ nigrae.

26. TENEBRI^O Gigas alatus ater, elytris striatis, thorace lœvi.

Habitat Surinami.

Magnitudo Scar. Cervi. Thorax marginatus, non nitens. Elytra obtusa, striata satis profunde. Antennæ clavatae, longitudine thoracis.

HEMIPTERA.

27. GRYLLUS unicornis M. thorace lœvi, elytris viridibus, alis apice striatis, vertice subulato, antennis pectinatis.

Habitat in China.

Magnitudo & statura G. M. Religiosi. Vertex Capitis in spinam antice, capite longiore, prominens. Antennæ longitudine thoracis, utrinque pectinatae. Thorax linearis, lœvis, fere triquierter. Elytra viridia, oblique venis striata. Alæ virescentes, elytris paulo longiores: apice fusco striato. Abdomen plicatum. Tibiæ antice dilatatae, spinulis ciliatae, majoribus spinis interstinctæ. Palmæ his ciliato-spinulosa. Tibiæ 2:di & 3:ii paris sub apice lacinulam habent.

28. GRYLLUS carolinus M. thorace subciliato subcarinato, elytris albidis fusco-nebulosis.

Habitat in Carolina.

Statura G. M. religiosi. Thorax oblongus, fere triquierter: lateribus scabris. Elytra aläque abbreviata, albi-

tido fuscocque nebulosa. Pedes antice subtus dupliciti spinoso-ciliati.

29. *GRYLLUS irroratus* M. thorace lœvi scabrinato, elytris viridibus punctis ferrugineis angis.

Habitat in Carolina.

Similis G. M. religioso, sed elytra ♂ Alæ abdome breviora, 3. s. 4. punctis ferrugineis absque orbe digestis, apicibus flavescens. Femora & Tibiae a latere postico dupliciter spinoso-ciliata.

30. *GRYLLUS Lunus* T. thoracis segmento posteriore crista semiorbiculata, elytris nigris fasciis albis.

Habitat Surinami. Dahlberg.

Major. Caput ferrugineum. Thorax ferrugineus segmento postico carinato Crista compressa, valde elevata, semiorbiculari. Antennæ flavæ. Pedes lutescens, lœves. Elytra nigra, albo obscure reticulata: fasciis primis albis inæqualibus. Alæ nigrae.

31. *GRYLLUS Cinerarius* T. antennis longissimis, elytris deflexis.

Habitat in Brasilia. De Geer.

Antennæ longissimæ. Thorax cinerascens postice rotundato. Elytra lateralia, deflexa paginis verticalibus: Costa recta venis marginalibus; margine superiore dimidiato ovato: inferiore lanceolato. Pedes cinerascentes.

32. *GRYLLUS necydalooides* M. elytris ovatis rugulatis brevissimis, alis longitudine abdominis.

Habitat Surinami.

Corpus fuscoc-fuliginosum. Caput supra obscure rugineum. Thorax subelongatus, supra scaber, brevior quam in reliquis Mantis speciebus. Elytra brevissima omnium, ovata, obtusa, angulo humerali exstantia, supra cinerea, sub angulo ad latera nigra. Alæ obscure nebulosæ, convolutæ & plicatae, longæ. Nobilis elytris brevissimis.

33. *GRYL-*

33. *GRYLLUS javanus* T. *cinereus*, *elytris fuscō maculatis.*

Habitat in Java.

Antennæ corpore paulo breviores. Thorax compressus, dorso planus, postice rotundatus, lateribus fuscens. Abdomen ovatum. Alæ cinereæ ut totum corpus, superiores maculis aliquot lunatis, longitudinaliter digestis, aliisque paucis fuscis. Ensis abdomen fere brevior.

34. *GRYLLUS perspicillatus* L. *alarum rudimentis ocello atro, oculis aureis.*

Habitat in Indiis. De Geer.

Antennæ filiformes, corpore breviores. Corpus subtestaceum. Alarum elytrorumque loco laminula ova-ta, minima, ocello orbiculari atro. Utrum alas acquirat an larva sit, ignoro; ex facie perfecta esse videtur.

35. *GRYLLUS spinulosus* L. *thorace spinis muricato cinctoque, corpore aptero.*

Edw. av. 2. p. 161. t. 285. f. 3. 4. 5.

Habitat in Indiis.

Gryllos inter maximos numerandus. Antennæ filiformes, longitudine fere corporis. Thorax testaceus, spinis numerosis muricatus & postice margine spinoso cinctus. Abdomen supra nigrum maculis testaceis tessellatum. Alæ nullæ.

36. *GRYLLUS succinctus* L. *cinereus, thoracis carina marginaque postico elytrorumque margine dorsali flavis.*

Habitat in Java.

An Gryllus Elephas hujus larva?

Carina Thoracis partim elevata tribus incisuris, notabilis linea sulphurea a vertice ad caudam & transversa per marginem posticum thoracis.

37. *GRYLLUS brevicornis* A. *viridis capite prominulo, antennis compressis longitudine thoracis.*

Habitat in America septentrionali. De Geer.

Simi-

Similis Europæis, sed antennæ longitudine tan-
tem thoracis, compressæ. Caput antice subconicum, sed
ix manifeste.

38. *GRYLLUS convolutus* A. thorace rotun-
 dato, corpore nigro nebuloso, elytris convolutis
 ibidis.

Habitat Surinami.

Simillimus Gryllo campestri, sed triplo minor. Ely-
tra convoluta simul, ut fere subulata. Cauda setis
subus.

39. *CICADA flamnea* fronte rostrata adscen-
 dente tereti truncata.

Habitat - - - De Geer.

Minor Cic. Candelaria, tota superius sordide fer-
gineo-cinerascens. Elytra ad apices a pagina superio-
re punctis obscurioribus tota striæ obliquæ secant, ut in
spentum cute.

40. *CICADA truncata* viridi albicans, alis de-
 cisis compressis, postice truncatis.

Habitat in Java.

Magnitudo Perlæ. Tota viridi-albicans, Alis
flexis, valde compressis, reticulato striatis, postice
transverse truncatis.

41. *CIMEX ictericus* ovatus, supra incarnatus,
 subtus flavus, thorace acute spinoso.

Habitat in Carolina.

Medius. Caput, Thorax, Elytra incarnata. Ca-
put prominens. Thorax argute utrinque spinosus.
Oculi nigri, minutissimi. Elytra subtus sanguinea.
Pedæ hyalinæ. Totus subtus & Pedes flavi.

42. *CIMEX cristatus* rostro arcuato, antennis
 setaceis fusco-ferrugineis, scutello cristato.

Habitat in Carolina. Garden.

Major ullo Europæo. Antennæ rubræ, setacea,
longitudine corporis. Caput minimum, collo angusto;
rostro incurvato. Thorax rotundatus, utrinque an-
ti spinula prominens. Scutellum thorace triplo ma-
jus,

jus, nigrum, carinatum Crista elevata, octo-dentata; apice bidentatum; lateribus angulatum. Elytra ferruginea. Tibiae rufae. Abdomen dilatatum; sub angusta puncta aliquot coccinea, forte sexus nota.

43. CIMEX scaber oblongiusculus, testaceus, thorace angulato-spinoso, femoribus denticulatis, alis nigris.

Habitat in Java.

Corpus totum testaceum, scabrum. Alæ membranaceæ, nigrae. Antennæ corpore paulo breviores, IV articulis. Thorax utrinque angulo recto subspinosus, & spinis his elevatus. Femora omnia apice spinis instructa vix manifestis. Femora I, I, & 3, 3, subitus denticulata tribus denticulis.

44. CIMEX succinctus oblongus, thoracis elytrorumque margine exteriore femorumque basi sanguineis.

Habitat in Pennsylvania. De Geer.

45. CIMEX haemorrhous oblongus niger, thorace spinoso, abdomine rufo, elytris testaceis punctis linearibus quinque nigris.

Habitat in America. De Geer.

Totus niger, excepto abdomine rufo. Elytra testacea punctis five lineolis duabus & tribus nigris.

46. CIMEX nobilis scutatus viridi-auratus nigro-maculatus.

Habitat in Java.

Magnitudo Apis Bombylii, ovatus. Caput viridi-aeneum. Thorax viridi-aeneus: maculis 7 fusco-cærulescentibus. Scutellum viridi-aeneum, tegens totum dorsum, maculis trium parium cœruleis. Corpus subitus rufo-aeneum. Abdominis segmenta singula subitus utrinque maculis duabus cœruleis. Antennæ fuscae, corpore breviores. Femora omnia sanguinea. Tibiae cœruleæ. Alæ fuscescentes: superiores costa marginali viridi-aenea.

47. COCCUS *capensis ovalis subtomentosus*
conico - gibbus apice operculato.

Habitat ad Cap. B. spei in ramis Gnaphalii muricati.

Simillimus Cocco Adonidum, a quo differt, quod 1:0 minus orbiculatus, sed magis ovalis. 2:do dorso magis gibbo & fere conico. 3:o superficie non glabra, nitida, sed subtomentosa. Apex operculo nudo tectus; dum operulum discedit, foramen tomento repletur.

48. THRIPS *paradoxa fusca, elytris abbreviatis,*
antennis pectinatis fissilibus aliformibus.

Habitat in China. Oßbeck.

Magnitudo minoris Culicis. Tota fusca. Alæ fuscae, latiusculæ. Elytra lanceolata, dimidio breviora. Antennæ longitudine thoracis, obtusissimæ, fuscae, basi dilatæ, fissiles in 8 vel 9 partes membranaceas. Dubii generis & singulare insectum.

LEPIDOPTERA.

49. PAPILIO *Egithus E. T. alis fuscis vi-*
ridescenti - maculatus; subtus subincarnatus macu-
lis virescentibus rarioribus.

Habitat in China.

Magnitudo Pap. Apollinis. Alæ omnes supra vigrantes maculis numerosis luteo - virescentibus, quam corpori propiores magis longitudinales ad ductum corporis. Subtus omnes subincarnatae, maculis rarioribus, minoribus, virescentibus, quarum una alterave in alis posticis subocellata centro nigro. Similis Agamemnoni.

50. PAPILIO *Polydorus E. T. alis subcauda-*
tis nigris concoloribus; posticis macula alba futu-
ris sexfida lunulisque septem rubris.

Clerk. t. 33. f. 2.

Habitat in India.

Media. Alæ omnes nigre. Posticæ concolores,
vix caudatae, sed potius angulatae, margine lunulis se-
ptem nigris, subtus saturationibus; in medio macula al-
ba futuris nigris distincta in maculas sex, quarum an-
terior major bifida. Thoracis latera & abdominis

Tom. VI.

Cc

in-

incisuræ ferrugineæ. Differt a P. Polyte, quod margo alarum caret interstitiis albis; quod macula alba anterior reliquis major; quod corpus sanguinolentum; quod lunula posticæ fere reniformes, nec angusto lunares.

51. PAPILIO Orontes E. G. alis caudatis nigris albido-virescente fasciatis, caudis albis.

Clerk t. 26. f. 1.

Habitat in India.

Medius in hoc genere. Alæ superiores integerimæ: Supra nigræ fasciis duabus, virescentibus, interiore dilutiore latiore. Subtus nigræ fasciis tribus, albido-virescentibus, latioribus, quarum baseos maxima. Posticæ valde dentatae & breviores, caudatae: supra fascia lata dilute virescente, maculaque inter singulum dentem dilute virescente. Subtus dilute virescentes fasciis duabus saturate, virescentibus præter puncta aliqua virescentia ante fascias; caudæ albidae, obtusæ, valde distantes. Abdomen subtus luteum.

52. PAPILIO Phidippus E. G. alis subcaudatis fuscis, subtus fasciis albidis, ocellisque duobus; cauda ocellis geminis.

Habitat in Java.

Magnitudo 2. Antennæ filiformes, ferrugineæ. Alæ omnes supra fuscæ, immaculatae, versus marginem exteriorem obsoletiores; subtus omnes grisecentes, fasciis transversis albidis, postice fasciis transversis albidis. Posticæ subtus ocellis duobus: uno ad angulum exteriorem: altero versus angulum posticum; angulus posticus apice sere in caudam obtusam definit, in qua ocelli duo, parvi, approximati, cærulei.

53. PAPILIO Medon E. G. alis supra nigris: primoribus fascia lutea apiceque albo, posticis disco cærulecentibus. M. R.

Clerk t. 28. f. 1.

Habitat in Indiis.

Magnitudo 2. f. 3. Alæ primores supra atræ, apice albæ: fascia lutea. Posticæ nigræ, supra disco cæru-

terulescentes. Subtus omnes alæ cinerascentes, punctis tribus nigris ad basin. Primores fascia dimidiata alba, spiceaque albæ. Posticæ fascia dimidiata e lunulis 5 albis & alia posteriore e maculis 6 subfuscis.

54. PAPILIO *Mneme* H. alis oblongis integerimis nigris basi fulvis: primoribus fascia maculisque tribus flavis.

Habitat in China.

Alæ primores nigræ, concolorès, basi fulva maculis nigris; in medio fascia flava; ante apicem puncta 3 flava; Margo tenuior niger est. Posticæ alæ supra nigræ linea fulva a basi fere ad apicem excurrente. Subtus nigræ, antice flavæ nigro maculatæ, margine postico tenuissime albo punctatæ.

55. PAPILIO *Ædea* H. alis oblongis integerimis albo-maculatis: superioribus virescentibus; inferioribus fascia flava.

Clerk t. 4. f. 2.

Habitat in India. M. R.

Thorax cærulescens. Abdomen flavescens. Alæ superiores supra virescentes: fasciis tribus ex maculis albis, sparsis, inæqualibus. Subtus medio cærulescens, albo maculatæ, fascia flava. Posticæ concolores, nigro-cærulecentes maculis circiter 5 albis & lata fascia flava in medio.

56. PAPILIO *Melite* H. alis flavis: superioribus supra nigris, lineis duabus fasciaque flavis.

Clerk t. 44. f. 5.

Habitat in Indiis.

Magnitudo fere P. Urticæ. Alæ primores supra nigræ: Maculae duæ, oblongæ ad basin, quartum anterior lanceolata; posterior marginis interioris; fascia in medio alæ flava, quæ marginem interiore non tangit. Subtus alæ margine antico flavo. Posticæ supra flavæ margine postico nigro. Subtus flavæ strigis duabus, ijscis, obsoletis.

57. PAPILIO *Scylla* D. alis flavis: primoribus supra albis margine nigris, posticis margine nigro-punctatis.

Habitat in Java.

Media: Alæ primores supra albæ, margine exteriore nigro; subtus flavæ, fuscō irroratæ & puncto fuscō ocellari in medio. Posticæ supra flavæ, margine postico punctis 5 nigris. Subtus flavæ fuscō irroratæ marginē postico punctis 7 nigris, scilicet in alterna costa unico. Pedes flavi. Oculi brunei.

58. PAPILIO *Polybe* D. alis integerrimis: posticis dentatis: supra fuscō-virentibus, subtus viridi-sericeis, venis atris.

Habitat - - - -

Alæ primores supra fuscō-virescentes, sericeæ; in medio anteriore macula gemina undata nigra. Subtus parte denudata viridi-sericeæ venis nigrantibus; occulta vero cœruleo sericeæ. Posticæ supra disco virescentes, sericeæ; subtus virides, sericeæ venis atris ramosis; margo interior cœruleus & postice lobatus dentibusque cœruleis: maculis nigris. Abdomen subtus luteum. Antennæ nigrae, clavatae.

59. PAPILIO *Philea* D. alis integerrimis angulatis flavis; primoribus macula, posticis limbo luteis.

Roes. inf. 4. t. 3. f. 5.

Habitat in Indiis.

60. PAPILIO *Philomela* D. F. alis integerrimis fuscis: primoribus ocello uno, posticis ter duobus.

Habitat in Java.

Simillimus Pap. Hyperantho, sed triplo minor, s. Argi magnitudine. Alæ integerrimæ, concolores: supra fuscæ; subtus nebulosæ, strigis transversis, vix manifestis. Primores utrinque ocello majore ad angulum exteriorem. Posticæ ocellis sex sive potius ter duobus versus marginem posticum, quorum duo ultimi minutissimi;

tissimi; sed hi omnes in pagina superiore minus evidentes.

61. PAPILIO Electo D. alis integerrimis rotundatis luteis margine nigris; posticis subtus ocello sesquialtero albo.

Pet. gaz. t. 9. f. 11.

Habitat ad Cap. B. spei.

Magnitudo media. Alæ primores supra saturate luteæ puncto nigro in disco, & margine postico latissimo nigro. Subtus flavæ puncto nigro; limbo postico virescenti-luteo, cum maculis tribus nigris trigonis: secundariæ supra luteæ, limbo postico nigro. Subtus luteæ puncto in medio albo & adjecto minore, margine ferrugineo cinctis. Limbus posticus virescens. Antennæ & Pedes sanguinei.

62. PAPILIO Helcita D. alis integerrimis concoloribus luteis: limbo nigro punctis septem albis. Clerk t. 39. f. 4.

Habitat in Indiis. M. L. V.

Magnitudo Pap. Cardamines. Alæ luteæ, sed exteriore ambitu nigricantes, quæ nigredo undatim distinguitur suo margine a disco luteo; in singulæ alæ limbo nigro puncta majora circiter septem alba sunt, sed in primoribus fere confluent. Corpus supra nigrum dorso punctis albis; subtus luteum. Thorax punctis albis.

63. PAPILIO Idea D. alis integerrimis rotundatis albis venis maculisque nigris: primoribus margine nigro albo-punctato.

Clerk t. 38. f. 1.

Habitat in Indiis. M. L. V.

Major reliquis omnibus Danais. Alæ albæ venis alis nigris anastomosantibus. Anteriores alæ exterius a margine nigro, in quo series ex punctis albis; adnum 2. quasi palpi flavi.

64. PAPILIO Strilidore D. alis integerrimis nigris: primoribus albo maculatis, posticis basi subtusque albis.

Habitat in Pennsylvania. De Geer.

Magnitudo media. Alæ primores macula alba transversa in medio versus apicem. Alia ad marginem tenuiorem. Puncta alba 2. ad apicem; 2. fere in medio; nonnullæ ad marginem tenuiorem. Posticæ macula alba magna versus basin; at omnes subtus albæ venis nigris. Thorax albo punctatus.

65. PAPILIO *Eurydice* D. alis fuscis: subtus primoribus ocellis quatuor, posticis sex.

Habitat in Philadelphia. De Geer.

Similis Pap. *Hyperantho*. Alæ integerrimæ, supra fuscæ; posticæ obsoletius ocellatae. Primores subtus ad marginem posteriorem ocellis quatuor nigris pupilla alba. Posticæ ocellis quinque intra marginem posticum & sexto remotiori.

66. PAPILIO *Demophile* D. alis albidis: fasciis duabus margineque fuscis; posticis subtus subincarnatis.

Clerk t. 28. f. 4.

Habitat in Indiis.

Statura Pap. *Brassicae*. Alæ integræ vel parum repandæ. Superiores supra fasciis duabus albis, utroque apice attenuatis. Subtus pallidiores, fuscæ fasciis duabus albo virentibus, interiore lata. Posticæ supra fuscæ; disco albo inæquali. Subtus subincarnatæ angulo antico croceo.

67. PAPILIO *eclipsis* D. alis integerrimis angulatis flavis: primoribus punctis duobus maculaque nigris, posticis ocello cœruleo.

Pet. gaz. 16. t. 10. f. 6. bona.

Habitat in America Septentrionali. De Geer.

Facies exactissime Papil. *Rhamni*. Sed alæ primores in medio macula oblonga fusca, intra quam 2. puncta nigra. Posticæ puncta nigrae & ad marginem exteriorem ocellus cœruleus.

68. PAPILIO *Canace* N. alis angulatis supra cœruleis fascia dilutiori; subtus luteo viridique marmoratis.

Sta-

Statura Pap. *Atalantæ*. Alæ supra fuscocæruleæ, dentatæ, angulatæ, fascia communi cyanea sive dilute cœrulea: primores fascia bac interrupta & pone apicem puncto albo; Subtus marmoratæ luteo viridescente, nebulosæ. In medio omnium, subtus punctum angulum luteum.

69. PAPILIO *Hypermnestra* N. alis nigricantibus: subtus ferrugineo nebulosis; posticis postice ferrugineis puncto albo.

Habitat in Java.

Media. Alæ obsolete dentatæ, supra nigræ, sed posticæ limbo postico ferrugineo. Subtus omnes ferrugineo nebulosæ; posticæ in medio puncto niveo.

70. PAPILIO *Talaus* D. alis rotundatis fuscis: primoribus maculis albis basique sanguineis; posticis area. M. L. V.

Clerk t. 45. f. 1.

Habitat in Indiis.

Magnitudo & facies P. *Nelei* 187. Alæ subconcolores: macula baseos alarum anticarum tantum a latere superiore conspicua; area alba posticarum supra, in medio, ovata; subtus, magis ad basin, angulata.

An sexus tantum *Nelei*?

71. PAPILIO *Ariadne* N. alis supra subferrugineis strigis nigris undulatis; primoribus antice puncto niveo.

Habitat in Java.

Statura Pap. C. albi. Antennæ nigræ vix clavatæ. Alæ angulato-denticulatæ: supra testaceo-luteæ, s. f. 6. strigis nigris undulatis. Primores utrinque puncto albo ad marginem anticum, fere in medio. Omnes margine postico albæ, subtus concolores quidem, sed fasciis ferrugincis cinerascentibusque nebulosæ.

72. PAPILIO *Atlites* N. alis cinerascentibus; supra primoribus ocellis senis, posticis quinis: quibusdam cæcis.

Habitat in Asia. Clerk.

Corpus cinereum. Antennæ fuscæ. Pedes pallidi anticis mutatis. Alæ primores, supra cinerascentes: ad marginem anticum lineolæ transversæ, fuscæ, undatæ; intra marginem exteriorem ocelli 6, quorum 4 ♂ 6 cæci. Posticæ supra cinerascentes, intra marginem ocelli 5, quorum 3 ♂ 4 cæci; intra ocellos ♂ marginem lineæ 2 fuscæ, repandæ. Subtus omnes pallidæ linea fuscæ, transversa, repanda; intra priorem lineolæ fuscæ subundulatæ; extra lineam in singula alæ ocelli 2 ♂ puncta aliquot in eadem linea.

73. PAPILIO *Fatrophæ* N. alis angulatis pallidis lineis undatis maculisque: primoribus puncto unico: posticisque duobus nigricantibus.

Merian. Surin. 4. t. 4.

Habitat in Fatropha Americes.

74. PAPILIO *Dido* N. alis oblongis dentatis subconcoloribus nigris viridi maculatis; posticis fascia maculisque septem transversis.

Merian. Surin. 3. t. 3.

Clerk t. 30. f. 2.

Habitat in America Meridionali.

Statura alarum Pap. *Heliconiorum*, sed posticæ subdentatae. Primores basi macula longitudinali; Posticæ fascia lata baseos ♂ fascia e maculis, omnibus cæruleoscentibus.

75. PAPILIO *Hyperbius* N. alis dentatis luteis; primoribus extimo nigris: fascia alba; posticis subtus argentatis quinqueocellatis.

Habitat in China. Clerk.

Structura Pap. *Paphia*, sed duplo major. Alæ primores concolores, versus basin luteæ, versus apicem nigrae: nigra area versus apicem subtus pallidior maculata argentata. Fascia alba in area nigra utrinque, cum puncto albo. Area lutea utrinque, lituris 4 transversis ad costam ♂ postice punctis 4 nigris. Alæ posticæ supra luteæ punctis 15 s. 18 nigris; margo posticus lunulis duplicatis cæruleis. Subtus bæ alæ pallidiores

us sive virescenti griseæ, nigro argenteoque obsoleto nubiloſæ, cum ocellis quinque pupilla argentea: in disco postico intra marginem posticum linea repanda nigra.

76. PAPILIO *Cydiſſe* N. alis dentatis supra nigro cærulescentibus albo maculatis; area communis rubra; subtus marmoratis.

Clerk t. 36. f. 1.

Habitat in India.

Magnitudo Pap. Populi: Alæ supra omnes nigræ, nubileo resplendentes; ad marginem exteriorem lunulae meares, albæ, dupliſi ſerie. In anticis plaga transversa ex maculis albis. Area communis alarum omnium in medio ad basin rubra. Subtus omnes marmoratae testaceo maculis cærulescentibus & albis. In poſticis ſries duplex e maculis nigris albo margine.

77. PAPILIO *Peleus* P. alis integerrimis utrinque atris: primoribus fascia linearis rubra, exteriusque luteo maculatis.

Clerk t. 45. f. 5.

Habitat in Indiis.

Habitus & omnia Pap. Pherecli 155. sed extra ſciam rubram maculæ confluentes lutescentes.

An femina Pherecli?

78. PAPILIO *Aſtorion* P. alis subcaudatis fuscis: superioribus fascia lutescente exteriore maculique cærulea poſtica; subtus ocello.

Clerk t. 36. f. 2.

Habitat in Indiis.

Magnitudo media, vix P. Urticæ. Alæ marginem repandæ: ſupra fuligineæ. Primores fascia, versus apicem, testacea cum punctis duobus obſoletiſ in apice; nargo poſticus macula ovata cyanea. Poſticæ fuligineæ, subcaudatae. Subtus omnes testacea griseo-undulatae: Primores ocello ad apicem. Poſticæ macula rotunda, parva, pallida, intra marginem anticum.

79. PAPILIO *Arcius* alis caudatis nigris fasciis duabus hyalinis, caudis cæruleis.

Clerk t. 46. f. 6.

Habitat - - M. R.

Magnitudo *Sphingis Statices*. Alæ primores concolores, atræ, ovatæ, integerrimæ, fasciis duabus hyalinis: altera in medio; altera basin versus. Alæ posticæ atræ, desinentes in caudam ipsa ala longiore, azuream, medio fascia hyalina transverse longitudinali. Macula minima coccinea ad basin anteriorem alæ primoris & alia paulo major ad angulum ani. Antennæ clavatæ, atræ. Sub abdomine etiam rubedo appetet.

80. PAPILIO Augias P. alis integerrimis divaricatis fulvis; fascia obliqua margineque postico nigris.

Habitat in Java, China.

Simillimus Pap. Commati, sed paulo major. Antennæ capitatae terminatae spina curva. Alæ subconcolores; Primores luteæ, in medio fascia nigra, obliqua, quæ marginem exteriorem non tangit, & margine postico latius nigro ex maculis constructo. Posticæ nigricantes maculis duabus magis fulvis: anteriore minore. Subtus omnes flavæ nigro irroratae, nec subtus albis quadratis maculis adspersæ ut Comma.

81. SPHINX sexta alis integris: omnibus margine postico albo punctis; abdomine ocellis duodecim fulvis. Brown, jam. 438. t. 43. f. 17.

Habitat in Carolina, Jamaica.

Statura Sphing, convolvuli. Corpus cinereum. Alæ cinereæ margine postico septem punctis albis. In alis superioribus punctum album versus latus exterius. Abdomen cinereum ocellis 6 parium, fulvis, annulo nigro.

82. PHALÆNA gangis, alis superioribus subincarnatis litura longitudinali nigra postice abrupta, abdomine supra sanguineo.

Habitat in Java.

Magnitudo Pap. Plantaginis. Antennas non vidi. Caput rubrum. Alæ superiores supra pallide incarnata. Sutu-

tura longitudinalis nigra a vertice ad scutellum ducta. Tura in singula ala superiore nigra longitudinalis, sed rsum posteriora oblique interrupta. Alæ & corpus fuscum. Abdominis dorsum sanguineum, distin- sum a fusco punctis nigris.

83. PHALÆNA *Phalonia* N. spirilinguis, alis levibus; posticis concoloribus disco flavis lunula ambituque nigro.

Cerk t. 48.

Habitat in Indiis.

Media. Alæ patulæ flavæ. Superiores supra co- se vario modo in diversis variegato. Subtus medieta- exteriore nigricantes fascia alba. Inferiores concolo- res flavæ: limbo lato nigro margine quasi albo dentato, & medio lunula nigra.

84. PHALÆNA *heteroclita* N.? spirilinguis, alis superioribus angustioribus fuscis maculis 3 fla- sis, posticis flavis extimo fuscis.

Habitat in Indiis. M. L. V.

Magnitudo media. Antennæ desunt. Alæ su- periores lanceolatae, obtuse, fuscæ: fascia in medio fla- si, quæ non tangit marginem posticum; alia a basi ver- is transversalem lanceolata. Tertia a basi ad medium virginis postici. Subtus albæ excepto margine antico rivo. Inferiores latissimæ, flavæ margine postico fuso. Subtus flavæ. Thorax dorso nigricans.

NEUROPTERA.

85. LIBELLULA *carolina* alis hyalinis: posti- sis tota basi fuscis.

Habitat in Carolina. Garden.

Media. Alæ superiores lanceolatae: inferiores usus basin dilatatae; omnes hyalinæ, reticulatae vasis. Ante marginem anticum omnes macula fusca. Posticæ de tota basi, ab interiore ad posteriorem marginem & eidem ad $\frac{1}{3}$ totius fere alæ, sunt fuscae rufo reticulatae. Thorax griseus, immaculatus. Abdomen ferrugineum ictamento ultima nigro.

86. LIBELLULA *variegata* alis patentibus fuso - cærulescente flavoque variegatis apice hyalinis. M. L. V.

Habitat in Indiis.

Magnitudo *Libell. vulgate*. Oculi brunnei; Thorax viridis. Abdomen supra nigricans linea viridi. Alæ variegatae ex cæruleo & luteo; sed cæruleus color antice magis fuscus; apices hyalini magis in anticis quam posticis. Alæ posticæ multo latiores sunt. In primis versus apicem antice litura illa libellulis communis.

87. HEMEROBIUS pectinicornis antennis pectinatis, alis albidis signaturis nervisque fuscis albo articulatis.

Habitat in Pensylvania. De Geer.

Magnitudo inter maximos. Antennæ nigrae unum tantum latere pectinatae.

HYMENOPTERA.

88. SIREX columba abdome mucronato nigro fasciis testaceis.

Habitat in America. De Geer.

Affinis Sir. Giganti. Abdomen in apicem etiam exiens. Caput & antennæ testacea. Thorax subvillosus, testaceus & nigro varius. Pedes flavi.

89. SPHEX *pensylvanica* abdome plicato atro, alis subviolaceis.

Habitat in Pensylvania. De Geer.

Magnitudo *Crabronis*, totus niger. Thorax villosus. Abdomen thorace minus.

90. SPHEX cærulea cærulea, alis fuscis.

Catesb. Car. p. 5. t. 5.

Habitat in Philadelphia. De Geer.

Pedes atro - cærulei sunt. Simillimus figuræ Catesbei, sed absque punto nigro in apice alarum.

91. VESPA *maculata* nigra, thorace albo maculato, scutelloque quadrimaculato, abdome postice albo maculato.

Habitat in Pensylvania. De Geer.

Sta.

*Statura & magnitudo Crabronis. Frons maculis
cibis albis, maxillarum latera alba. Thorax ante
alis macula curva; sub alis puncto albo. Ad scutel-
lum 2 paria maculae albarum remota. Abdomen
rum, postice albo maculatum.*

92. VESPA quadridens atra, thorace quadri-
tentato, scutello primoque segmento abdominis
liveo.

Habitat in Pennsylvania. De Geer.

*Tota nigra. Thorax utrinque basi, supra, macula
ta. Scutelli loco alba macula. Thorax postice trun-
ctus, utrinque 2. dentibus notatus. Abdominis se-
mentum primum maxima ex parte album. Alæ atro-
violetaceæ.*

93. VESPA annularis fusca, genubus anten-
narum apicibus margineque primi segmenti abdo-
minis flavis.

Habitat in Pennsylvania. De Geer.

*Media. Alæ planæ. Thorax maculatus, ante
us magis ferrugineus. Tibiarum bases flavescentes.*

94. FORMICA binodis nigra, abdomine gla-
errimo: segmentis duobus primis subglobosis.

Habitat in Jamaica.

*Magnitudo Formicæ nigræ nostratis. Alæ hyalinae.
Corpus totum nigrum. Abdomen atrum, nitidum;
segmentis 2 primis angustioribus gibbosis. Antennæ
pice fuscae & crassiores.*

DIPTERA.

95. ASILUS æstuans cinereus, abdominis tri-
bus ultimis segmentis albis.

Habitat in Pennsylvania. De Geer.

*Genitale singulare, compressum, atrum caudæ ad-
iret, ut nostratis.*

APTERA.

96. CANCER Dormia brachyurus hirsutus,
thorace utrinque dentato, pedibus posticis ungu-
is geminis.

Rumph.

Rumph. Mus. t. 11. f. 1. Cancer lanosus.

Seb. Mus. 3. t. 18. f. 1.

Habitat in Indiis.

CANCER *Vocans* brachyurus, thorace subquadrato inermi, chela altera magna.

Syst. nat. 10. p. 626. n. 6.

Marcg. bras. 184. Maracoani.

Pis. bras. 77. t. 78.

Rumph. mus. 14. t. 10. f. 3.

Catesb. car. 2. t. 25. Carenarius.

Seb. mus. 3. t. 18. f. 8.

Habitat in utraque India.

Testa lœvis, inermis, ex quadrato antice lateribus dilatata. Discus quasi H. impresso; latera quasi 2 striis obliquis; inter oculos integra. Anguli anteriores prominuli. Chela dextra, interdum sinistra, semper altera, maxima, oblonga, albida, lœvis. Pollex mobilis, compressus, arcuatus, introrsum granulatus. Digitus compressus, rectus, apice subtridensatus, introrsum granulatus, medio denticulo notatus. Chela minor minuta digitis rectis ciliatis. Pedes variis pilis; unguibus acutis omnes.

97. CANCER *cordatus*, brachyurus thorace lœvi cordato integrerrimo, chelis subtus muricatis.

Habitat Surinami.

Majusculus. Testa cordata apice posteriora respiacente, lœvis, margine subcarinato; disco lateribus gibbo; in medio quasi H depresso. Inter oculos vix emarginata. Oculi cylindrici. Palpebra inferior crenulata. Chelæ lœves, sed subtus valde muricatae verrucis conicis nigris. Brachia triangula angulis muricatis. Pedes reliqui omnes subtus maxime barbati.

98. CANCER *epheliticus* brachyurus, thorace lœvi mutico maculato: margine crenulato, manibus cristatis.

Rumph. mus. t. 8. f. 5.

Habitat in Carolina. Garden.

Te.

Testa lator quam longa, convexa, subæqualis, stice angustata flava maculis variis fulvis, rubro marine picta; Margo crenulatus. Rostrum obtusum, integrum. Chelæ intus plænae; extus convexæ muricatae, margine superiore crissatae.

CANCER parasiticus brachyurus, thorace irregulari orbiculato ciliato, pedibus dorsalibus quadrator.

Habitat in America intra Chamam Lazarum D. D. jacquin.

Testa magnitudine dimidii imperialis. Thorax orbiculatus, integerrimus, convexus, cinereus, laevis, ibinæqualis tuberculis paucis minutissimis. In Dorso pedes 4 minores; unguibus duobus aduncis. Pedes altus 4 præter manus. Cauda inflexa brevis.

99. *CANCER filiformis linearis medio chelatus, pedibus quatuor.*

Habitat in Malacca. And. Grönberg.

Corpus lineare, teretiusculum, magnitudine culis. Antennæ longæ, articulis 3. ultimo ex innumeris minutissimis articulis fere setaceo. Palpi 2, incurvi, articulis. Thorax linearis 2 articulis, corpore $\frac{1}{2}$ brevis. Brachia setis 2, breviora. Manus ovatae, magna, parina uno altero ve denticulo. Corpus posterius articulis 2, longitudine thoracis, sub his 2. paria ovariorum. Caudæ corpus 2 parvis articulis; ad singulos hosc articulos par pedum breviorum articulis 3. s. 4. brevissimis & digito incurvo subhamoso; hi 4. pedes videntur quasi in cauda hærere. Cauda obtusissima.

100. *ONISCUS linearis cauda quadridentata.*

Habitat in Oceano Surinami.

Linearis, longitudine pollicari, utrinque quasi dentatus. Antennæ longitudine corporis, articulis 1, 2, 3. safforibus; reliquis in setam attenuatis. Cauda longior, emarginata dentibus duobus, cui foliola lateralia adnata, inde quadridentata fit.