

I.

Kritische Revisionen und Ergänzungen zu Schrank's „*Enumeratio Insectorum Austriae, Fauna boica u. s. w.*“

Aus dem bisher noch ungedruckten literarischen Nachlasse
des sel. Schrank mitgetheilt von Gistl. *)

3 — 4. *Scarabaeus fossor.* Lin. S. N. 548. 31. fn.
suec. 384. Göze Beitr. 1. 21. 31. Laichart. 1. 10. 4. —
Lectus mense Junio ad Gern in Bavaria.

Scarabaeus ovatus. Nos. *Scarabaeus dubius Scop.*
Varietas Sc. solstitialis. — *Arboreus.* — *Habitat in Bavaria.*

*) Mit diesen sind mehrere weit frühere, in Füssly's Magazin
für Liebhaber der Entomologie Bd. II. S. 313 abgedruckte
Bemerkungen nicht zu verwechseln. Die vorliegenden sind
theils Bemerkungen zur *Enumeratio Ins. Austr.*, in welchem
Werke sie auf dem Durchschusse von der Hand des Hrn.
Verfassers geschrieben stehen, theils auch Zusätze und
Beiträge zur Fauna boica; dazu kommen noch einige Diag-
nosen von exotischen Käfern, wie man aus der Mittheilung
ersehen wird. Die Nummern beziehen sich auf die *Enum.*
Ins. Austr. In eine Kritik dieser schätzenswerthen Frag-
mente, die ich der Vergessenheit entreisse, habe ich mich
nicht wagen wollen; denn dass sich seit Schrank's letztem
entomologischen Wirken Vieles geändert hat, ist zur Ge-
nüge bekannt; aber ich habe zugleich auch die innige Ver-
ehrung gegen meinen sel. Lehrer und seine Schriften an
den Tag legen wollen.

Dermestes piniperda. L. n. 11.

Hispa atra. Lin. S. N. sp. 1. *Fabr. S. E.* no. 7. — *Habitat* Ambergae, Burghusii.

Byrrhus minutus. Niger, viloso-hirtus; antennis palidis. Minutissimus, magnitudine seminis milii. — *Habitat* in Gern. Vix scio, an hujus generis.

Byrrhus verbasci. Lin. S. N. 2. 568. 2. *Anthrenus verbasci* *Fabr.* — *Habitat* in floribus.

Byrrhus pilula. Lin. S. N. 4. 1225.

Silpha aestiva. L. 32. — *Habitat* in floribus.

Coccinella 12 — *pustulata* *Fabr.* Göze. p. 242. n. 31. *Lecta* 20. Julii in Gern.

Chrysomela polita. — *Habitat* in salice.

132. *Chrysomela graminis*. L. F. *Lecta* copiose in *Mentha sylvestri*. 13. Aug. Synonymum *Geoffroyi* et *Scolpii* etiam *Fabricius* ad hunc locum; sed synonymum *Poda* ad *Chrys. haemopteram* rejicit. An recte. Haec ipsa apud *Laicharting* sub nomine *Chrys. haemopterae* describitur, quod nomen *Fabr.* ejus *Chrysomelae viridulae* tribuit.

Chr. marginella. *Fabr.* — *Habitat* Monachii.

Chr. vitellinae. — *Habitat* in salicibus. Burghusii n. 135. *descripta* alia est.

141 — 142. *Chrysomela viridula*. *Laich.* ins. 1. 147.

6. — *Habitat* in *Hyperico perforato* Bavariae.

149. Ist gewiss *Ch. marginata*. L. n. 39.

Chr. vittata. C. atra, thorace nitidissimo; elytris stramineis, lineis duabus longitudinalibus suturaque atris. — *Habitat* ad Gern. Junio M. *lecta*. Ad *Cryptocephalus* pertinet. *Cryptocephalus vittatus*. *Fabr.* Sp. ins. I. 144. 36.

168 — 169. *Chr. Moraei*. Lin. fn. su. n. 550. Lin. S. N. 2. 597. 82. Göze Beytr. coleopt. 284. 82. *Buprestis Moraei*. *Scop. carn.* 202. *Cryptocephalus* 5. *Geoffr.* 1. 234. *Cryptocephalus Moraei*. *Fabr. S. E.* 110. 25. *Ejnsd. Sp. ins.* 1. 144. 37. — *Lecta* in Gern Junio.

171. *Variat* elytris immaculatis.

Chr. speciosa. *Fabr. S. E.* 101. 37. — *Habitat* in pratis et agris Bavariae.

Chr. cerealis. Göze p. 257. *Lecta* Ambergae.

Chr. 4 — *maculata*. L. S. N. n. 77. Göze p. 283.

Chr. tristis. *Chrysomela oblonga*, antennis filiformibus longis; thorace plano marginato. Le lupere noir à corcelet et pattes rouges. *Geoff. ins. tom.* 1. p. 231. Le lupere noir à pattes rouges. id. ibid. — *Variat* 1. thorace pedibusque rufis; 2. thorace atro, pedibus rufis in eadem specie. — *Habitat* in abiete.

Curculio populi. Lin. — *Habitat* in salicibus.

Curc. Sanguisorbae. C. longirostris, femoribus simplicibus, ovatus aterrimus. — *Habitat* in capitulis *Sanguisorbae officinalis*.

Curc. bavarus. C. femoribus dentatis, longirostris, fuscus, elongatus; fasciis duabus obliquis ferrugineis ad apicem elytrorum. — *Habitat* in Bavaria.

Curc. Fagi. L. S. N. Sp. 44. C. longirostris, pedibus saltatoriis, corpore atro, elytris pallidioribus striatis, plantis rufis. — *Habitat* in fagi foliis subcutaneus, et sub corūm epidermide declaratur.

Curc. marmoreus. — *Habitat* in Bavaria.

Curc. ruficornis. Lin. S. N. sp. 78. fn. suec. 636. *Fabr. S. E.* 149. sp. 115. — *Obs.* In meo exemplari tantum utrinque tuberculum unicum. — *Habitat* Burghusii.

Curc. Salviae. Nos. — *Habitat* in *Salvia pratensi* Burghusii.

Cerambyx coriarius. *Scop. carn.* 161. Göze. Beitr. p. 428.

Cer. Portitor. *Schriften der Berl. Gesch.* 2. B.

Cer. Cердо. L. S. N. p. 629. n. 39. — *Habitat* in Bavaria.

Cer. nebulosus cum sequente (n. 247) plane idem, sola magnitudine diversus.

- Cer. cylindricus.* L. 59. — *Habitat* Burghusii.
Cer. striatus L. S. N. n. 73. — *Habitat* Burghusii.
Leptura melanura. L. S. N. n. 2.
Leptura chrysomeloides variat pedibus nigris.
Cantharis nigra. Göze Beitr. I. Th. S. 541. — *Habitat* in Bavaria.
Canth. fasciata. L. p. 648. — *Habitat* Ambergae,
 Burghusii, Gernae. — *Lecta* 28. Maji.
 337. Est *Elater virescens*. Nos. Berl. Schr. II. Bd.
Elater castaneus. L. Nos. Berl. Schr. II. Bd. — *Habitat* Burghusii.
 341. Est *Elater sanguineus*. Fabr. et Linnaei, quos
 vide. Missus a D. Herbst sub nomine E. balteati.
Elater cruciatus. Fabr. Sp. ins. I. 268. 21. D. Herbst
 misit. — *Obs.* In meo exemplari antennae nigrae.
Elater tessellatus. Fabr. Sp. ins. I. 167. 16. D. Herbst
 misit.
Elater striatus. Fabr. Sp. ins. I. 272. 40. D. Herbst
 misit.
Elater aeneoniger. Göze Beitr. I. Thl. S. 570. n.
 46. — *Habitat* in Bavaria.
Elater balteatus. Lin. S. N. p. 654. n. 22. — *Habitat* Burghusii.
 360. *Carabus 6* — *punctatus*. Müller.
Buprestis serraticornis. B. nigroaenea, thorace ely-
 trisque cupreis. — *Habitat* in Gern. — *Lectus* in Cratae-
 go oxyacantha bis.
Bupr. octoguttata. L. — *Habitat* Burghusi.
Bupr. serrulata. — *Habitat* in Bavaria.
Dytiscus marginalis. Fabr. Spec. ins. p. 299. 3. —
Habitat Burghusii.
*** *Antennis clavatis.* (Ante Dytiscos).

- Dytiscus hastatus.* Herbst Beschäft. IV. B. S. 317.
 tab. 7. f. 2. — *Habitat* Berolini.
Dytiscus dubius. Ist weder ein Dytiscus, noch ein
 Carabus, sondern eine eigene Gattung; er kann nicht
 schwimmen und wohnt allein am feuchten Ufer eines Teichs.
Herbst in Epist.
Carabus bipunctatus. Sulz. D. Herbst.
 397. *Car. ruficornis.* Fabr. S. E. p. 241. n. 27. de-
 leantur Synonyma, non mensurae. — *Habitat* in Austria.
 397. *Car. latus?* Lin. S. N. gen. 213. sp. 24. Huc
 pertinent Synonyma. — *Habitat* in terra Austriae.
Carc. crux minor. Lin. S. N. n. 39. Fabr. S. E. n.
 55. Spec. ins. n. 67. — *Habitat* in terra.
Car. biguttatus. Carabus bimaculatus. Seop. n. 274. —
Habitat in Bavaria.
Car. crepitans. Lin. S. N. n. 18. Fabr. Spec. ins. n.
 44. — *Habitat* in Bavaria.
Car. Sulzeri. Apterous; elytra connata. — *Habitat* pas-
 sim in Bavaria.
Car. Degeeri. Niger; elytris basi macula, antennis,
 abdomine pedibusque testaceis. Carabus bimaculatus. Göze
 Beitr. I. 653. 2.? Ceterum nec Müller, nec Scopolinum
 Synonymum hoc pertinet. — *Habitat* ad Gern.
Tenebrio holosericeus. T. niger, thorace elytrisque
 brevi villo tomentosis, pedibus testaceis. — *Lectus* in
 Gern. M. Junio.
Tenebrio arboreus est T. lanipes Geoffr.
Meloe Intybi; alatus niger, thorace hirsuto fasciis dua-
 bus, punctisque quatuor baseos rubris. D. Herbst misit.
Cicada Lineola. C. elytris griseis, nervis fuscis, basi
 pallidioribus, lineola communi alba. — *Descr.* Vultu pale-
 griseo, ad basin antennarum lineolis duabus obliquis
 punctisque totidem minutis nigris. Frons albicans, punctis
 duobus nigris. Thorax elytraque grisea; haec basi albida:
 venae fuscae; ad suturam prope medium lineola communis

alba basi apiceque nigro terminata. — *Lecta* M. Junio in Gern.

Cicada leucocephala Fabr. Sp. ins. II. 325. 23. Subtus tota flava. — *Lecta* in Gern. 1. Julii.

Cicada hyalina. Göze Beitr. II. 162. 40. — *Lecta* in Gern. M. Julio.

Cimex scarabaeoides. Fabr. Sp. ins. II. 342. 25. D. Herbst misit.

Cimex quadratus. Fabr. Sp. ins. II. 350. 73. D. Herbst misit.

Cimex marginatus. Fabr. Sp. ins. II. 349. 70. — *Habitat* ad Gern. — *Lectus* medio Junio.

Cimex Janus. Fabr. Sp. ins. II. 357. 118. D. Herbst misit.

Cimex leucocephalus. L. n. 60. — *Habitat* Burghusii.

Cimex trimaculatus. Nos. — *Habitat* Burghusii.

Cimex ater. Fabr. Sp. ins. II. 371. 197. — *Habitat* in Bavaria.

545—546. *Cimex seticornis*. Fabr. Sp. ins. 2. 372. 204. — *Habitat* in Austria.

547—548. *Cimex variegatus*. Göze Beitr. 2. 263. 54. Müller Zool. dan. prod. 108. 1242. — *Habitat* in Bavaria.

Cimex fulvipes. Scop. carn. n. 388. — *Lectus* in Gern. M. Junio.

Cimex flavicollis. Fabr. Spec. ins. II. 371. 201. In meo specimine femora tota nigra; antennarum seta pallidissime rufa; pectus rufum. — *Lectus* in Gern. 1. Julii.

554. 555. *Cimex coryli*. Göze Beitr. II. 229. 121. Fabr. Spec. ins. II. 309. 188. Ater totus, sed rostrum, antennae, pedesque flava; figura ovata cimici, antennae setaceae; elytra fusca, cum macula apicis cruxoris concreti colore. Long. 2. lin. — *Habitat* ad Gern. — *Lectus* M. Junio.

Cimex fulvomaculatus. Degeer. ins. 3. 294. 53. Mag-

nitudo cimicis agilis; antennarum articulus primus ater; alter rufus apice „(oblongo clavato)“ atro; tertius quartusque toti pallidi. Rostrum basi nigrum, dein rufum. Corpus atrum; pedes rufi, articulorum apices nigri, femora antica fuscescentia, postica punetis nigris punctulata. Elytra nigra, ad lentem tomento raro urseo, maculaque seu in medio pallide testacea, apice ante appendicem alaeformem macula griseorubra. — *Habitat* frequens in rube. — *Lectus* ad Gern. Medio Junio.

Cimex cordiger. Göze Beitr. II. 266. 70. — *Habitat* passim.

Libellula aenea: Lin. S. N. XIII. 902. 8. Fabr. S. E. 423. 21. Fabr. S. Ins. 2. 524. 27. Geoffr. 2. 226. 10. — *Habitat* in Bavaria.

Lib. 4 — *maculata*. Lin. S. N. XIII. 901. 1. Lin. fn. su. 1459. Fabr. S. E. 420. 1. *Ejusd.* S. ins. 510. 1. La francoise Geoffr. 2. 224. 6. — *Habitat* in Bavaria.

Lib. sanguinea. L. alis basi luteis, corpore rubro, subtus pedibusque nigris. Minima Libellarum alis patentibus; nempe a capite ad anum 14 lin. alae longitudi 13 lin. Tibiae omnes extus stria ferruginea longitudinali. — *Habitat* Burghusii.

604. *Ephemera speciosa*. Est ephemera horaria Lin. 605. *Ephemera bioculata* Lin. et Fabr.

618. *Phryganea reticulata*, nostra. Est Hemerob. lutiarius Lin.

Phryganea bilineata Lin. — *Lecta* in Gern. 2. Aug. 1782.

615—616. *Phryg. grandis*. Lin. S. N. XIII. 909. 7. *Ejus*. fn. suec. n. 1485. Fabr. S. E. 306. 6. *Ejus*. Sp. ins. I. 389. 8. — *Habitat* in Austria, Bavaria.

Phryg. nigra. Lin. S. N. Sp. 11. Eadem cum *tinciformi*. n. 620.

620—621. *Phryg. trifasciata*. Ph. antennis longissimis, nigra albo trifasciata. Simillima Ph. nigrae, sed palpi

et fasciae alarum anticarum (ex punctis transversalibus?) nivea, antennae albo nigroque variae. — *Habitat* ad Gern in der Roth. M. Junio.

Hemerobius fulvicephalus est Hem. *Chrysops*. Lin. *Hemer. Chrysops* est var. *Hemerob. Perlæ*. L.

651. *M. descriptum* est Linnaei M. formicalynx. Sed antennae sataceae sunt, datur tum etiam M. formicarium, cuius larvam vidimus.

Cynips quercus ramuli. Fabr. Sp. ins. 2. 404. 8. — *Habitat* in Bavaria.

Cynips quercus baccarum. Lin. fn. su. n. 1522. — *Habitat* in quercu.

Cynips quercus petioli. Lin. fn. suec. n. 1523.

Leucospis coelogaster. Coelogaster: Schrift. naturf. Freund. I. B. *Leucospis dorsigera*. Fabr. Sp. ins. 1. 457. 1. — *Habitat* Passavii.

Serphus brachypterus. Schrift. naturf. Freund. z. Berl. I. B. — *Habitat* Passavii.

650—651. *Tenthredo sericea*. Fabr. Spec. ins. II. 407. 9. — *Habitat* Burghusii. In Gern. 22. Julii.

649. *Tenth. marginata*. L. Roes. Vesp. tab. XI. egregiam habet iconem, quam Linnaeus non adserit.

Tenth. eques. T. fusca, antennis pectinatis; pectore, margine thoracis loborum, abdominis cingulis, pedibusque sordide flavis.

Tenth. ciliaris. Lin. S. N. 922. 12. — *Habitat* ad Gern. In Rosa? — *Lecta* M. Junio. — *Obs. Tota*, etiam pedibus posticis; atra.

Tenth. germanica. Fabr. — *Habitat* ad Gern.

Tenth. blanda. Fabr. S. E. 323. 30.? *Geoffr.* 2. 285. 20. — *Habitat* Burghusii. Affinis *T. abietis*.

Tenth. vaga. Fabr. Spec. ins. 1. 415. 40. T. *mesomela*. Lin. fn. su. n. 1549. — *Habitat* Burghusii.

Tenth. fasciata. Scop. carn. n. 727. La rouche à

scie à deux bandes jaunes. *Geoffr.* 2. 270. n. 9. — *Habitat* Burghusii.

Tenth. diversipes. *Tenthredo nigra*, pedibus quatuor anticus flavis; femoribus posticis rubris. *Geoffr.* 2. 285. n. 28. — *Habitat* Burghusii.

Tenth. Morio. Fabr. I. 414. 41. — *Habitat* in Gern.

689—690. *Tenth. affinis*. T. antennis setariis; corpore nigro: antennis, pedibus, abdomineque rufis. — *Habitat* Burghusii. *Affinis* sequenti, et forte tantum sexu diversa.

689—690. *Tenth. sylvatica* Lin. faun. suec. n. 1561. — *Habitat* Burghusii.

Ichneumon bipunctatus. Ich. antennis alboannulatis, scutello albo, ater, pedibus rufis; abdominis segmento tertio punctis duobus albis. — *Habitat* in Gern. — *Lectus* M. Junio. — *Obs. Ipsissimus* I. *sugillatorius*. Enum. 695. sed verus.

Ichn. Sugillatorius. Fabr. Sp. ins. I. 420. 1. — *Lectus* in Gern. 24. Julii. Segmenta abdominis 4, 5, 6 fascia, 7mum puncto albo. Aculeus brevis, vix 1 lin. quo pungens acutum dolorem causat.

Ichn. culpatorius. Fabr. Sp. ins. I. 421. 6. — *Lectus* 21. Jul.

Ichn. molitorius. Fabr. Spec. ins. 2. 422. 12. — *Habitat* in Austria. Linnaeanum Synonymum non quadrat.

Ichn. bicingulatus. Scutello flavicante, antennis nigris totis; ater, pedibus, segmentorumque sesundi tertiique margine ferrugineis. — *Lectus* in Gern medio Junio.

Ichn. vaginatorius. Fabr. Sp. ins. I. 423. 19. — *Lectus* 22. Julii.

Ichn. fusorius. Lin. fn. su. n. 1598. Fabr. Spec. ins. 1. 424. 27. — *Descr. differt. ab Ich. fusorio a Linnaeo in fauna descripto; idem tamen est.*

Ichn. reluctator. Fabr. Spec. ins. I. 426. 35. — *Lectus* M. Junio in Gern.

Ichn. profligator. Fabr. Sp. ins. I. 427. 44. — *Lec-*
tus 26. Jul. in Gern.

417. *Ichn. incubitor.* L. an etiam sq? in Gern.

Ichn. polyzonius. I. antennis nigris setaceis, scutello
thoraci concolore, niger; abdomine petiolato segmentis om-
nibus margine albis; pedibus testaceis. — *Habitat* in Gern.
M. Junio.

Ichn. variegatus. Corpore atro immaculato, abdomine
cylindrico; pedibus rufis, tarsis tibiisque posticis albo ni-
groque annulatis. — *Habitat* in Bavaria. Ich. compuncta-
tori adfinis. Antennae subtis pallidiores. Fortasse varietas
minor *compunctatoris*.

Ichn. rosaceus. Ich. totus niger, alis ferruginescenti-
bus, pedibus rufis, tarsis posticis nigris; abdomine lanceo-
lato. — *Habitat* in Gern. M. Jul. — Obs. Odorem rosae
etiam mortuus longo tempore spargit.

732—733. *Ichn. falcator.* Fabr. S. E. 330. 69. —
Variat femoribus totis rufis, defectaque puncti parvi flavi
ante alas. Aculeus brevissimus. — *Habitat* in Bavaria.

Ichn. affectatus. Fabr. Sp. ins. I. 435. 93. — *Habi-*
tat in Bavaria. — *Lectus* M. Junio.

740—746. *Ichn. fuscatus.* Fabr. Spec. ins. 2. 437.
108. — *Habitat* in Bavaria.

Ichn. testaceus. Ichn. niger, abdomine pedibusque
saturate setaceis, antennis albo-annulatis. — *Habitat* ad Gern.

Ichn. Lanio. Antennis fascia annulatis, niger, thora-
ce, abdominalisque basi rubris. — *Descr.* Inter minores; vix
3 lineas longus. Antennae nigrae fascia alba; caput nigrum,
thorax ruber; abdomen petiolatum, petiolo cum duobus se-
quentibus segmentis (quae ampliora sunt, et dimidium ab-
domen efficiunt) rubris, reliquis nigris. Pedes nigri, tibiis
rufis. — *Habitat* in Gern.

Ichn. fuscicornis. Ichn. ferrugineus, antennis fusce-
scentibus, oculis, stemmatibus, pedumque pulvillis, solis

nigris. — *Lectus* 30. Julii in Gern. Totus tomento sub-
tilissimo tectus. Vivus odorem rosae spargit.

Ichn. agilis. Fabr. Sp. ins. I. 441. 126. — *Habitat*
in Bavaria, Palatinatu superiore ad Ambergam.

Sphex sisipes. Fabr. Sp. ins. I. 446. 21. — *Habitat*
in Gern. — *Lecta* M. Junio 1782.

Sphex figulus. Fabr. Sp. ins. I. 444. 10. — *Habitat*
in Bavaria.

Sphex Tiphia. Nos. — *Habitat* in Bavaria.

Sphex formicaroides. Nos. — *Habitat* in Bavaria.

Sphex —. *Habitat* ad Gern.

Sphex vaga. Lin. S. N. 2. 946. 36. — *Habitat* ad
Gern in umbellis Spondylii. — *Lecta* 22. Julii.

Sphex uniglumis. Crabro uniglumis. Fabr. Sp. ins.
I. 472. 16. — *Lecta* in floribus Spondylii.

Chrysis edentula. Vespa thorace viridi coeruleo, ab-
domine aurato cupreo pone inermi. Geoffr. Paris II. 383.
21. — *Lecta* in Gern. 21. Jul. in floribus Spondylii.

Chrysis cyanea. Fabr. Sp. ins. 2. 456. 18. — *Habi-*
tat in Bavaria. — Obs. Deleatur Citatum Scopolinum, quod
nusquam invenitur.

Vespa parietum. Fabr. — *Habitat* in Bavaria.

Vespa campestris. Fabr. Sp. ins. 2. 465. 41. — *Ha-*
bitat in Bavaria.

Vespa sexfasciata. Fabr. Sp. ins. 2. 465. 42. — Obs.
Antennae subtus tantum basi, s. articulo primo flavae; fe-
mora tantum supra nigra, sed inferiori parte flava. Segmen-
tum abdominis secundum maximum, hinc fascia abdominis
prima remotissima. — *Habitat* in Bavaria.

Apis Sylvarum. Fabr.?

Apis subterranea. Fabr. S. E. 383, 22. — *Habitat*
in Bavaria.

Apis longicornis. Fabr. Sp. ins. I. 486. 80. D. Herbst
misit. — *Habitat* etiam in Bavaria.

Apis linguaria. Fabr. Sp. ins. I. 487. 82. — *Habitat* ad Burghusium.

Apis maxillosa. Fabr. Sp. ins. I. 486. 75. — *Habitat* ad Gern.

Apis maculata. Fabr. Spec. ins. I. 482. 48. — *Habitat* in Bavaria ad Gern. Amat praecipue flores Marrubii vulgaris.

**Apis malabarica*. A. nuda atra, ventre testaceo basi nigra, alis coeruleis, antennis rufis. Herbst misit. — *Habitat* in India orientali.

Apis annulata. Fabr. Sp. ins. I. 486. 77. — *Habitat* Burghusii.

Apis rufiventris. — *Habitat* in Bavaria.

**Formica malabarica*. F. pallide livida, oculis solis nigris; abdomine globoso depresso. — *Habitat* in India orientali. D. Herbst misit.

Tipula idriensis. Scop. carn. n. 840. — *Habitat* in Gern.

Tipula Johannis. Fabr. Sp. ins. II. 409. 51. — *Habitat* in Gern. — *Lecta* M. Majo exeunte.

881 — 882. *Tipula acetosae*. Antennis moniliformibus nigra, alis albis, corpore longioribus. — *Descr.* Pulicis majoris magnitudinem non adaequat. Tota nigra; sed aliae albae fere lacteae sine nervo nigro. Caeterum Tipulae Scathopse simillima, nisi quod minor. Pedum anticum femora compressa. — *Habitat* ita gregaria in floribus rumicis acetosae, ut eos totos obtegat. Adest circa foeniceum, quando nuptias celebrat.

Musca plebeja. Bibio plebeja. Fabr. Sp. ins. II. 415. 5. Diversa a M. plebeja hujus Enumerationis. — *Habitat* in Bavaria.

Musca strigata. Stratiomys strigata. Fabr. Sp. ins. II. 417. 4. — *Descr.* *in vivo specimine*. Antennae filatae extus ampliores, fere ut in Sphingibus, 2 lin. longae, basi minime connatae. Frons cano — argenteo vellere pubescit.

Oculi fusci fascia dupli obsolete viridi. Thorax fulvescens: pectus cano vellere pubescit. Abdomen nigrum, subtus fasciis tribus albidis angustis, prima latiori. Alae leviter fuliginosae, apice hyalina. Long. a cap. ad an. 7 lin. alae 5 lin. lat. abd. 3½ lin. — *Lecta* in Gern. M. Junio.

Musca hottentota. Lin. S. N. Sp. 13. — *Bibio hottentota*. Fabr. S. E. 11.

Musca grandis. M. antennis filatis, scutello bidentato, corporeque ferrugineo, abdominis basi nigra, articulo secundo tertioque latere albomarginatis. — *Habitat* Burghusii. Ad Stratiom. Fabr. pertinet.

Musca jejuna. M. antennis filatis, scutello bidentato, nigra, abdomine pellucido pedibusque lividis. — *Lecta* in Gern. M. Junio.

Musca bombylans. Lin. — *Habitat* in Gern. *Lecta* mense Junio.

Musca bombinatrix. Musca bombylans. Lin. fn. suec., descriptio, non nomen. — *Habitat* in Gern. — *Lecta* M. Junio. Ova nivea, longitudinaliter striata. Ab Fabricio describitur haec Musca nomine triviali *Syrphus apiarius*.

Syrphus podagricus. Fabr. Sp. ins. 2. 430. 30. — *Habitat* in Austria.

910. *Musca Mellina*. Fabr. male adduxit synonymum suum ex Geoffroyo, quod longe aliam muscam denotat.

Musca bicincta. Syrphus bicinctus. Fabr. Sp. ins. I. 426. 30. A. M. bifasciata certe diversissima, abdomine non ovato, basi angustato, sed aequabiliter elliptico, adhuc deorsum marginato, lato margine corneo. — *Lecta* ad Gern. 27. Jul. 1782.

921. *M. zonaria*. Reaum. mem. IV. 2. 254. Fabr. 33. f. 15. 19., sed thoracem nigrum dicit. Larva in nidis apum bombinaticum, harum larvas depositas.

Musca tremula. Fabr. Sp. ins. II. 442. 32. — *Habitat* passim.

Musca lurida. Fabr. S. E. 778. 26. — *Habitat* in Austria.

Musca polita. Fabr. Spec. ins. 2. 446. 53. — *Habitat* ad Gern. Junio.

Musca nobilitata. Fabr. Sp. ins. II. 447. 63. Alas gerit parallelas. — *Habitat* ad aquas.

Musca umbelliferarum. Scop. carn. n. 945. — *Habitat* in Gern. — Lecta M. Junio.

Musca hyoscyami. Lin. — Lecta 2. Aug. Diversa nonnihil ab ea, quae in *Enum.* describitur.

Musca Spondylii. M. antennis setariis, nuda, supra nigra, scutello abdominalisque apice rufis. — *Habitat* in umbellis Heraclei Spondylii.

908. *Musca miliaria* est *Musca Arnicae* Lin. *Musca* vero *Arnicae* Scop. et hujus *Enumerat.* nova est species. etiam in Bavaria obvia.

Musca variolosa. Antennis setariis nigra, alis fuscis albo irroratis, thorace nigro albomaculato nigroque punctato. — *Descr.* Statura prorsus muscae domesticae, sed nigra, pedes fuscii; thorax niger, albo velut mucore leviter obductus, in qua albedine lynceo puncta minutissime nigra videntur. Alae nudo oculo adparent hyalinae, nigro maculae punctataeque, reipsa sunt fuscae punctis albis, saepe confluentibus copiosissime irroratae. Abdomen nigrum albo velut mucore obsitum. — *Habitat* in Bavaria. Est *Musca fulviventris* En. 953. Misit etiam e Borussia amicissimus Herbst. Videtur esse *Musca graminum* Fabr.

Musca lucida. Scop. carn. 956. — *Habitat* ad aquas prope Burghusium prata interfluentes, plantas visitans prope nascentes.

Tabanus autumnalis. Fabr. Sp. ins. 2. 456. 5. — *Habitat* frequens in Gern, tota aestate.

Tabanus pellucens. Fabr. Sp. ins. 2. 457. 12. — *Habitat* in Gern. — Lectus medio Junio. Antennae porrectae filiformes, longae, nigrae (2 lin.). Caput nigrum, fronte villosa

albo villo (ad lentem fulvo). Oculi fusti, fasciis quatuor viridibus. Abdomen atrum, primo segmento utrinque alba macula, subtus pellucido, reliquis omnibus supra immaculatis, subtus utrinque macula cana, punctis (ad lentem) 2 parvis nigris insculptis singulae maculae. Thorax et pectus villo rufo raro fugitivo. Pedes nigri, tibiis albis. Long. a cap. ad an 6 lin. Alae 5 lin.

979. *Tabanus maritimus.* Oculis viridiauratis, fascia postica, punctisque 4 purpureis, quorum duo confluent.

Empis perversa. E. cinerea, pedibus ferrugineis, femoribus primi secundique paris subclavatis, tertii simplificibus. — *Habitat* ad aquas in Gern. — Lecta M. Junio. Alae simplices hyalinae, halteres feruginei.

Empis clauda. Empis atra, thorace gibbo, femoribus posticis incrassatis longis, tharsorum articulo primo crassiori. — *Empis pennipes* β. Lin. fn. suec. 2. 1896. — Lecta circa Burghusium.

Empis livida. Lin. fn. su. n. 1897. — *Habitat* passim

Asilus flavus. L. S. N. n. 8. — *Habitat* in Bavaria.

Asilus germanicus. Lin. S. N. n. — *Habitat* in Bavaria.

**Asilus exoticus.* A. hirtus cinreeus; abdomine supra nigro, segmentorum margine omni et subtus cinreeo; pedibus rufis. Amicissimus Herbst misit.

Hippobosca avicularia. Lin. S. N. 2. 1010. 2. Fabr. Spec. ins. 2. 475. 2. — *Habitat* Burghusii.

Aranea audax Nos. 397.

Aranea quinquerontata Nos. 396.

Aranea Marggravii Scop. 398.

Aranea palustris. L. S. N. 1153.

**Cancer Diogenes.* L. S. n. p. 1049. n. 58.

**Oniscus Ceti.* Lin. S. N. p. 1060. n. 6. Pallas Spic. fasc. 9. p. 76. — *Habitat* in Balaenis. Herbst misit.

**Oniscus Psora.* Lin. S. N. p. 1060. n. 3. — *Habitat* in mari norwegico. Herbst.