

ТРУДЫ  
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ  
при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Казанскомъ Университетѣ.  
Томъ XL, вып. 4.

МУРАВЬИ РОССИИ  
(*Formicariae Imperij Rossici*).

Систематика, географія и данные по біологии  
русскихъ муравьевъ.

*M. Рузского.*

Часть вторая.

КАЗАНЬ  
Типо-литографія Императорскаго Университета  
1907.

ТРУДЫ  
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ  
при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Казанскомъ Университетѣ.  
Томъ XL, вып. 4.

МУРАВЬИ РОССИИ  
(*Formicariae Imperij Rossici*).

Систематика, географія и данные по біологии  
русскихъ муравьевъ.

*M. Рузского.*

Часть вторая.



КАЗАНЬ.  
Типо-литографія Императорскаго Университета  
1907.

Печатано по определению Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Президентъ Б. Польновъ.

## **ЧАСТЬ ВТОРАЯ**

Предисловіе. Третье и четвертое дополненія къ списку литературы по муравьямъ. Общій обзоръ мирмекологической фауны Россіи съ біогеографической точки зрењія.

Изучение какой-либо группы животных въ систематическомъ (морфоматическомъ) и біолого-географическомъ отношеніи на пространствѣ всей Россіи, при крайней обширности ея территории, представляетъ очень большой и сложный трудъ, осуществимый только годами, въ особенности когда изучаемая группа животныхъ принадлежитъ къ мало изслѣдованнымъ. Все это я испыталъ на себѣ, когда началъ заниматься изучениемъ русскихъ муравьевъ. Несмотря на значительные трудности мнѣ всетаки въ теченіе болѣе 10 лѣтъ удалось частью на основаніи личныхъ изслѣдований, частью благодаря дорогому для меня содѣйствію и помощи нѣкоторыхъ лицъ, сочувственно относящихся къ такого рода работамъ, собрать известный, сравнительно еще небольшой материалъ по фаунѣ муравьевъ нашего отечества. Результаты морфоматической обработки этого материала, равно какъ и специальные данные, касающіяся географіи и эко-этологіи отдѣльныхъ формъ, изложены мной въ первой части работы, изданной въ 1905 году (см. М. Рузскій, Муравьи Россіи и пр., Тр. Каз. Общ. Ест.-Испыт. т. XXXVIII, вып. 4—6, 1905 г.).

Настоящій трудъ, представляющій продолженіе первого въ видѣ 2-й части, далеко неравной ему по объему, я имѣю въ виду посвятить главнымъ образомъ сводѣ того материала, который въ необобщенномъ видѣ изложенъ въ первой части. Такимъ образомъ эта 2-я часть есть ничто иное какъ заключительная глава первой. Она содѣржитъ въ себѣ дополнительный списокъ литературы по муравьямъ, вышедшей главнымъ образомъ въ теченіе послѣднихъ двухъ лѣтъ, и общій біолого-географический очеркъ мирмекологической фауны Россіи.

Этотъ послѣдній, состоящій главнымъ образомъ изъ обзора общаго географическаго распространенія русскихъ муравьевъ и распределенія ихъ по характернымъ мѣстностямъ обитанія или т. наз. стаціямъ, въ сожалѣнію оказался слишкомъ краткимъ, во многихъ мѣстахъ даже неполнымъ и отрывочнымъ. Обстоятельство это оправдывается недостаткомъ соотвѣтствующаго матеріала, имѣющагося въ моихъ рукахъ и основаннаго почти исключительно на личныхъ изслѣдованіяхъ, причемъ я конечно всегда принималъ во вниманіе также данные, добытыя другими лицами. По той-же причинѣ я принужденъ былъ отказаться отъ мысли выяснить вопросъ о происхожденіи мирмекологической фауны Россіи, считая такую задачу пока преждевременной.

Въ заключеніе я долженъ замѣтить, что выпускомъ въ свѣтъ настоящей части я не думаю ограничить свою работу по русскимъ муравьямъ; напротивъ, въ недалекомъ будущемъ надѣюсь выпустить и третью часть, которая будетъ заключать въ себѣ какъ дополненія двухъ первыхъ, такъ и обработку моихъ собственно біологическихъ наблюденій.

12 февраля 1907 г.

Казань.

---

## Третье дополнение къ списку литературы по муравьямъ.

916. André, Ernest. Description d'un genre nouveau et de deux espèces nouvelles de Fourmis d'Australie. *Revue d'Entomologie*, 1905, p. 205—208.
917. Ashmead, W. H. Classification of the Ichneumon-flies of the Superfamily Ichneumonoidea. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, XXIII, 1901, pp. 1—220.
918. — A skeleton of a new arrangement of the families, subfamilies, tribes and genera of the Ants, or the superfamily Formicoidea. *Canadian Entomologist*, XXXVII, Novemb. 1905, p. 381—384<sup>1)</sup>.
919. — Report upon the Aculeatae Hymenoptera of the Islands of St. Vincent and Grenada, with additions to the Parasitic Hymenoptera and a List of the described Hymenoptera of the West—Indies. *Trans. Entom. Soc. London*, 1900, P. II, (2, pp. 299—367; Formicoidea: № 368—491).

---

<sup>1)</sup> Въ этой и предыдущей статьяхъ А sh m e a d предложилъ новую классификацию муравьевъ. Онъ выдѣляетъ ихъ въ отдельное надсемейство (Supersfamilia) *Formicoidea*, распадающееся на слѣдующія 7 семействъ: *Dorylidae*, *Poneridae*, *Myrmicidae*, *Cryptoceridae*, *Odontomachidae*, *Dolichoderidae* и *Formicidae*. См. обѣ этомъ критический замѣчанія К. Э м е р и (925); также у Н. Я. Кузнецова въ его переводѣ Шарпа (963), где приведена и характеристика этихъ семействъ на русскомъ языке. Важнымъ нововведеніемъ въ классификациіи A sh m e a d'a является главнымъ образомъ установление самой группы *Formicoidea* въ качествѣ надсемейства (или *Formicodea*, какъ удобнѣе предлагаетъ его называть Н. Я. Кузнецовъ). Раздѣленіе же на семейства, равно какъ и самая характеристика ихъ мало измѣняетъ положеніе дѣла, такъ какъ чего-либо особенно нового въ эту характеристику A sh m e a d не вноситъ.

920. Berlese, A. Illustrazione iconografica degli Acari mirmecofili. Firenze, 1904.
921. Богдановъ, Т. Въ муравьиномъ царствѣ (Очерки жизни и нравовъ муравьевъ). Природа и люди, 1892—93 г. №№ 6—10.
922. Cook, O. F. The social organisation and breeding habits, of the Cattonprotecting Kelep of Guatemala. U. S. Departm. Agriculture, Bureau of entomology. Techn. Ser. № 10. Washingt. 1905. p. 38.
923. Doflein, F. Beobachtungen an den Weberameisen. Biolog. Centralbl., Bd. XXV, 1905, pp. 497—507.
924. Emery, C. Note sur Prenolepis vividula Nyl. et sur la classification des espèces du genre Prenolepis. Ann de la Soc. Entomolog. de Belgique, T. L, 1906, p. 130.
925. — Über W. H. Ashmeads neues System der Ameisen. Zoolog. Anzeiger, Bd. XXIX, Nr. 24. 1906.
926. — Rassegna critica delle specie paleartiche del genere Myrmecocystus. R. Accademia delle Scienze dell Inst. di Bologna, Sess. 28 Genn. 1906. T. III (Serie VI), p. 173—187.
927. — Deux Fourmis de l'Ambre de la Baltique. Bull. Soc. Entom. France, 1905, № 13, p. 189.
928. Escherich, K. Die Ameise. Schilderung ihrer Lebensweise. Braunschweig, 1906.
929. Фаусекъ, В. Біологіческія ізслѣдованія въ Закаспійской области. Зап. по Общ. Геогр. И. Р. Геогр. Общ. т. XXVII, 1906 (стр. 142—145).
930. Field, A. Tenacity of life in Ants. Biol. Bull. of the Marine Biolog. Laboratory Woods Holl, VII, 1904, pp. 300—309.
931. — Cause of feud between Ants of the same species living in different communitis. Ibid., V, 1903, p. 327.
932. Forel, A. Ameisen aus Java (gesamm. von Prof. K. Kraepelin 1904). Mltheilung. aus dem Naturhistor. Mnseum. Hamburg, XXII, 1905 (p. 1—26).

933. Forel, A. Dimorphisme du mal chez les Fourmis et quelques autres notices myrmécologiques. *Ibid.*, T. XLVIII, 1904, p.p. 421—425.
934. — *Miscellanea myrmécologiques* II (1905). *Ibid.*, T. XLIX, 1905, pp. 155—185.
935. — A revision of the species of the Formicidae (Ants) of New Zealand. From *Transactions of the New Zealand Institute*, Vol. XXXVII, 1904, p.p. 353—355.
936. — Fourmis d'Asie mineure et de la Dobrudscha. *Ann. Soc. Entomolog. de Belgique*, T. L. 1906, p. 187—190.
937. — Fourmis néotropiques nouvelles ou peu connues. *Ibid.*, p. 225—249.
938. — Mœurs des Fourmis parasites des genres Wheeleria et Bothriomyrmex. *Revue Suisse de Zoologie Ann. de la Soc. Zool. Suisse*, T. 14, Fasc. 1, 1906. (Extr. T. 13, 1905), p. 51—69.
939. — Les Fourmis de l'Himalaya. *Bull. de la Soc. Vaudoise d. Sc. nat.* V. XLII (5-e Ser.), № 155, 1906, p. 79—94.
940. Huber, I. Ueber die Koloniengründung bei *Atta sexdens*. *Biolog. Centralbl.*, Bd. XXV, 1905, pp. 606—619, 625—635.
941. Janet, Ch. Anatomie de la tête du *Lasius niger* reine. *Limoges*, 1905, p. 1—40.
942. Караваевъ, Вл. Дополненіе къ предварительному отчету о поездкѣ на островъ Яву. Зап. Киевск. Общ. Ест., 1901 (отд. отт., стр. 1—43), стр. 41—42.
943. — Муравьи и ихъ жизнь. Вѣстн. и Библіотека Самообразованія, 1905 г. № 28, 29 и 30.
944. — Дальнѣйшія наблюденія надъ видами рода *Antennophorus*. Отт. изъ XX т. Зап. Киевск. Общ. Ест., 1906, стр. 1—22 (209—230).
945. Karawaiew, W. Versuche über die internationalen Beziehungen einiger *Antennophorus*-Arten nebst einigen systematischen Bemerkungen. *Zeitschr. für wissenschaftl. Insektenbiologie*, Bd. I (1 Folge Bd. X Allg. Zeitschr. für Biologie), 1905, Heft 12, p. 485—493.

946. Karawaew, W. Systematisch-Biologisches über drei Ameisen aus Buitenzorg. *Ibid.* Bd. II (1. Folge Bd. XI), 1906, Heft 12, p. 369—376.
947. — Versuch an Ameisen in bezug auf das Übertragen der Larven in die Dunkelheit. *Ibid.* Bd. I (1. Folge Bd. X) 1905, Heft 5, p. 215—224; Heft 6, p. 257—267.
948. Ruzsky, M. Über *Tetramorium striativentre* Mayr und *Tetraschneideri* Emery. *Zoolog. Anzeiger*, Bd. XXIX, № 16, 1905.
949. Santschi, F. A propos des moeurs parasitiques temporaires des Fourmis du genre *Bothriomyrmex*. *Annales de la Soc. entomol. France*, T. LXXV, 1906, p. 363—392.
950. Strand, Embr. Nye bidrag til Norges hymenopteren- og diptera-fauna. *Nyt Mag. f. Naturvidensk.* B. 44, H. 2. Kristiania, 1906 (pp. 95—104).
951. Wasmann, E. Die phylogenetische Umbildung ostindischer Ameisengäste in Termitengäste. *Mittheil. d. schweiz. entom. Gesellsch.* Bd. XI, Heft 2, 1905, pp. 66—70.
952. — Beobachtungen über *Polyrhachis dives* auf Java, die ihre Larven zum Spinnen der Nester benutzt. *Notes from the Leyden Museum*, vol. XXV, 1905, p.p. 133—140.
653. — Versuche mit einem brasilianischen Ameisennest in Holland. (150 Beitrag zur Kenntniss der Myrmekophilen). Mit Taf. 8. *Tijdschrift voor Entomologie*, Deel XLVIII. 1905, p.p. 1—5.
954. — Zur Myrmecophagie des Gruenspechts. *Ibid.*, p.p. 6—12.
955. — Zur Lebensweise einiger in—und ausländischen Ameisengäste (148 Beitrag z. Kenntn. d. Myrmecoph. u. Termitoph.) *Zeitschr. für wissenschaftl. Insektenbiologie*, Bd. I (1. Folge Bd. X) 1905, Heft 8, p.p. 329—336; Heft 9, p.p. 384—390.

956. Wasmann, E. Die phylogenetische Umbildung ostindischer Ameisengäste in Termitengäste (145 Beitrag zur Kenntn. d. Myrmecoph. u. Termitoph.). Comptes rendus du 6-me Congrès intern. de Zoologie, Session de Berne 1904, p.p. 436—447. Mit 1 Taf.
957. — Ursprung und Entwickelung der Sklaverei bei den Ameisen (146 Beitrag zur Kenntn. d. Myrmekoph.). Biolog. Centralbl. Bd. XXV, Nr. 4—9, 1905.
958. — Nochmals zur Frage über die temporär gemischten Kolonien und den Ursprung der Sklaverei bei den Ameisen. Biolog. Centralbl., Bd. XXV, Nr. 19, 1905.
959. Wheeler, W. M. The Polymorphism of Ants, with an Account of Some Singular Abnormalities Due to Parasitism. Bull. of the Americ. Museum of Nat. History, Vol. XXIII, art. 1, p.p. 1—93, 1907. New-York.
960. — Extraordinary Femals in Three Species of Formica, with Remarks on Mutation in the Formicidae. Bulletin of the American Museum of Nat. Hist., XIX, 1903, p.p. 639—651.
961. — A new Type of social Parasitism among Ants. Ibid., XX, 1904, p.p. 347—375.
962. — An Interpretation of Slavenmaking Instikcts in Ants. Ibid., XXI, Art. 1, 1905, p.p. 1—16.
963. — Some remarks on Temporary Social Parasitism and the Phylogeny of Slavery among Ants. Biolog. Centralbl., Bd. XXV, 1905, p.p. 937—644.
964. Шарпъ, Давидъ. Насѣкомыя. Перев. съ англійск., съ обработкой и дополненіями Н. Я. Кузнецова. Библіотека естествознанія подъ ред. Броунова и Фаусека, изд. Брокгаузъ-Ефронъ. Вып. 1—3 (4-й печатается). СПБ., 1902—1907.



## Общий обзоръ мирмекологической фауны Россіи.

1. Количественный составъ мирмекологической фауны Россіи. Число родовъ, видовъ, расъ и разновидностей. Сравненіе мирмекофауны Россіи съ европейской, съверо-американской и другими соседними.

Число видовъ и расъ муравьевъ, до сихъ поръ найденныхъ въ предѣлахъ Россійской имперіи, достигаетъ 160; вмѣстѣ же съ разновидностями составъ ея мирмекологической фауны опредѣляется всего 254 формами<sup>1)</sup>. Изъ указанного числа на долю *Camponotinae* приходится 108, *Dolichoderinae* — 7, *Myrmicinae*—136 и *Ponerinae*—3.

По систематическимъ категоріямъ эти формы распредѣляются такимъ образомъ:

### I. Camponotinae:

<i>Camponotus</i> . . . .	35	формъ (18 вид. и расъ, 17 разнов.)
<i>Colobopsis</i> (subg.) .	1	" (1 видъ)
<i>Prenolepis</i> . . . .	2	" (1 видъ и 1 разнов.)

<sup>1)</sup> См. М. Рузскій, Муравьи Россіи, ч. I. Тр. Каз. Общ. Ест., т. XXXVIII, вып. 4—6, 1905 г. Въ этой работѣ описано всего 258 формъ, но въ данномъ случаѣ 4 исключаются какъ не принадлежащи къ фаунѣ Россіи. Въ числѣ указанныхъ 160 видовъ и расъ 12 представлены въ нашей фаунѣ только разновидностями. Одна разновидность вновь описывается въ данной работѣ.

<i>Lasius</i> . . . . .	22	"	(14 видовъ и расъ, 8 разн.)
<i>Formica</i> . . . . .	25	"	(13 видовъ и расъ, 12 разн.)
<i>Proformica</i> . . . . .	3	"	(2 вида и 1 разнов.).
<i>Myrmecocystus</i> . . . .	12	"	(5 вид. и расъ, 7 разнов.)
<i>Polyergus</i> . . . . .	1	"	(1 видъ)
<i>Acantholepis</i> . . . .	4	"	(1 видъ и 3 разнов.)
<i>Plagiolepis</i> . . . . .	2	"	(1 видъ и 1 разнов.).

### II. Dolichoderinae:

<i>Dolichoderus</i> . . . . .	2	"	(1 видъ и 1 раса)
<i>Tapinoma</i> . . . . .	3	"	(2 вида и 1 раса)
<i>Liometopum</i> . . . . .	1	"	(1 видъ)
<i>Bothriomyrmex</i> . . . .	1	"	(1 видъ).

### III. Myrmicinae:

<i>Cremastogaster</i> . . . . .	13	"	(6 вид. и расъ, 7 разн.)
<i>Solenopsis</i> . . . . .	5	"	(3 вид. и расы, 2 разн.)
<i>Tetramorium</i> . . . . .	12	"	(5 вид. и расъ, 7 разн.)
<i>Strongylognathus</i> . . . .	3	"	(2 вида, 1 разнов.)
<i>Myrmecina</i> . . . . .	1	"	(1 видъ)
<i>Formicoxenus</i> . . . . .	1	"	(1 видъ)
<i>Anergates</i> . . . . .	1	"	(1 видъ)
<i>Tomognathus</i> . . . . .	1	"	(1 видъ)
<i>Myrmoxenus</i> . . . . .	1	"	(1 видъ)
<i>Leptothorax</i> . . . . .	25	"	(18 вид. и расъ, 7 разн.)
<i>Temnothorax</i> (subg.)	2	"	(2 вида)
<i>Myrchothorax</i> (subg.)	8	"	(3 вида и расы, 5 разнов.)
<i>Cardiocondyla</i> . . . . .	5	"	(3 вида и 2 разнов.)
<i>Monomorium</i> . . . . .	5	"	(5 видовъ)
<i>Pheidole</i> . . . . .	4	"	(3 вида и расы, 1 разнов.)
<i>Myrmica</i> . . . . .	26	"	(15 вид. и расъ, 11 разн.)
<i>Stenamma</i> . . . . .	3	"	(1 видъ и 1 раса, 1 разн.)
<i>Ischnomyrmex</i> . . . . .	1	"	(1 видъ)
<i>Aphaenogaster</i> . . . .	7	"	(3 вида и 4 разнов.)
<i>Messor</i> (subg.) . . . .	13	"	(6 вид. и расъ, 7 разнов.).

#### IV. Ponerinae:

Ponera . . . . . 3 „ (2 вида и 1 разнов.).

Всего 35 родовъ и подродовъ, въ количествѣ 254 формъ (148 видовъ и расъ и 106 разновидностей). Хотя на эти числа и нельзя смотрѣть какъ на окончательныя въ виду крайней недостаточности изслѣдований многихъ мѣстностей Россіи, о чёмъ уже было говорено въ первой части работы (т. с., стр. 11), тѣмъ не менѣе всетаки можно считать, что на основаніи имѣющихся давнихъ общій составъ и характеръ мирмекологической фауны въ предѣлахъ Россіи выяснился болѣе или менѣе удовлетворительно.

Самыми многочисленными, какъ теперь оказывается, по числу формъ родами являются *Camponotus*, *Myrmica*, *Formica*, *Leptothorax* и *Lasius*; затѣмъ слѣдуютъ *Cremastogaster*, *Messor*, *Myrmecocystus* и *Tetramorium*; остальные, за исключеніемъ *Myrmothorax* и *Aphaenogaster*, представлены крайне незначительнымъ количествомъ формъ.

Сравнивая нашу мирмекологическую фауну въ отношеніи количества и состава родовъ съ западной Европой и Сѣверной Америкой, какъ мѣстностями болѣе близкими къ Россіи по физико-географическимъ условіямъ, а также съ сосѣдними областями южной Азіи, мы видимъ, что эта фауна во 1-хъ) отличается вообще отъ вышенназванныхъ странъ бѣдностью по количеству родовъ, и должна быть въ этомъ отношеніи представлена на послѣднее мѣсто, во 2-хъ) наиболѣе тѣсное отношеніе она имѣеть прежде всего къ фаунѣ Европы, а затѣмъ уже къ Сѣверной Америкѣ. Близкая, родственная связь нашей мирмекофауны съ европейской вытекаетъ уже изъ того, что послѣдняя, т. е. фауна Европы (13, 222, 511), содержитъ въ себѣ все тѣ же роды, что и Россія, за исключеніемъ только двухъ—*Ischnotomutrix*, свойственного вообще болѣе южнымъ частямъ старого свѣта, и *Myrmoxenus*, пока найденного въ Азіи,—оба, имѣющіе лишь по 1 представителю въ фаунѣ Россіи; далѣе большинство родовъ, общихъ обѣимъ странамъ, имѣютъ приблизительно одинаковый или весьма сходный ви-

довой составъ. Но фауна Европы въ тоже время значительно богаче нашей, такъ какъ въ ней мы находимъ 10 родовъ, именно *Brachymyrmex*, *Anochetus*, *Sysphingta*, *Stigmatomma*, *Dorylus*, *Phacota*, *Leptanilla*, *Goniotoma*, *Strumigenys* и *Epirrititus*, совершенно пока неизвѣстныхъ въ Россіи,—обстоятельство вполнѣ удовлетворительно объясняющееся болѣе благопріятными и разнообразными физико-географическими условіями тѣхъ районовъ Европы, главнымъ образомъ острововъ и побережій средиземного моря, на долю которыхъ приходятся вышеназванные роды. Суровый же климатъ и скудныя, однобразныя жизненныя условія, наблюдаемыя на громадахъ широтныхъ протяженіяхъ Россіи, въ особенности ея сѣверной половины, отнюдь не могутъ способствовать богатству и роскошному развитію такой фауны какъ мирмекологическая, достигающая наибольшаго расцвѣта въ тропическихъ стражахъ и постепенно убывающая отъ экватора къ полюсамъ, какъ это еще доказалъ Майръ.

Съ Сѣв. Америкой (159, 160) наша фауна также имѣетъ много общаго, будучи притомъ связана съ ней и генетически, но отличается отъ нея всетаки гораздо больше, чѣмъ отъ европейской. Такъ въ фаунѣ Сѣв. Америки имѣется 22 рода чуждыхъ Россіи, но при этомъ и отсутствуютъ 9 родовъ (и подродовъ), принадлежащихъ послѣдней. Затѣмъ и видовой составъ родовыхъ группъ уже иной. Впрочемъ это различие до извѣстной степени сглаживается, благодаря нахожденію въ обѣихъ фаунахъ родовъ и видовъ близкихъ между собой, но успѣвшихъ уже уклониться другъ отъ друга (вслѣдствіе давности разъединенія и различія въ характерѣ мѣстообитаній), сдѣлавшихся *екарными*. Такими, наприм., замѣняющими группами являются: *Eroecus* и *Anergates*, subg. *Dichothonax* и *Tetnothonax*; тоже отчасти можно сказать и относительно *Xenomyrmex*, который въ нѣкоторомъ родѣ можетъ быть противупоставленъ *Cardiocondyla*.

Присутствіе большаго количества родовъ въ фаунѣ Сѣв. Америки объясняется главнымъ образомъ ея болѣе выгоднымъ географическимъ положеніемъ, именно тѣмъ,

что она выгнута съ С къ Ю, достигая своей южной оконечностью тропиковъ, тогда какъ обширная территорія Россіи растянута въ широтномъ направлениі, имѣя почти на всемъ своемъ протяженіи южной границей лишь 40° с. ш.; вслѣдствіе этого въ составѣ мирмекофауны Сѣв. Америки имѣется извѣстное количество специально тропическихъ, южно- и центрально-американскихъ родовъ (*Eciton*, *Pseudomyrta*, *Pachycondyla*, *Pogonotymex*, *Dorytymex*, *Atta*, *Forelius*, *Cryptocerus*, *Proceratium*), которые всѣ свойственны южнымъ мѣстностямъ названного материка, будучи заимствованы ими изъ тропиковъ; въ фаунѣ же Россіи южные роды почти отсутствуютъ. По той-же повидимому причинѣ въ Сѣв. Америкѣ мы встрѣчаемъ и такие роды, которые свойственны также и Европѣ, но лишь южной ея полосѣ, островамъ Средиземного моря и сѣверной Африкѣ, а именно: *Brachymyrta*, *Stigmatomma*, *Sysphingta* и *Strumigenys*; въ Россіи же этихъ родовъ нѣтъ, да и едва-ли всѣ они найдутся. Все это говорить за то, что при сравненіи двухъ мирмекофаунъ, русской и сѣвероамериканской, мы должны исключить почти всю южную треть Сѣв. Америки и принимать во вниманіе только ея среднюю и сѣверную части, имѣющія приблизительно одинаковыя съ Россіей климатическая и біологическая условія. При такой постановкѣ вопроса и результатъ сравненія будетъ иной; тогда и аналогія между двумя рассматриваемыми фаунами окажется болѣе полной, въ особенности если мы примемъ во вниманіе тѣ замѣщающіе и тропические роды, о которыхъ говорили выше. Въ самомъ дѣлѣ, исключивъ изъ состава сѣвероамериканской фауны вышеупомянутые роды южно- и центральноамериканскіе (всего 9 родовъ), затѣмъ два рода хотя и широкораспространенныхъ, но свойственныхъ преимущественно тропическому поясу, каковы *Leptogenys* и *Odontomachus*, наконецъ 3 викарныхъ рода и 4 общихъ Сѣверной Америкѣ и южной Европѣ, мы увидимъ, что фауна сѣверной и средней частей Сѣв. Америки окажется такой же бѣдной какъ и Россія и почти столь-же близкой къ ней какъ и европейская; все различіе ихъ будетъ

заключаться только въ 3 родахъ, присущихъ Сѣв. Америкѣ (*Trachymyrmex*, *Discothyrea* и subg. *Acanthomyops*), и 9, или 6 (если исключить 3 викарныхъ рода) ей не свойственныхъ, но встречающихся въ Россіи, т. е. здѣсь отношеніе Америки къ Россіи, по сравненію съ Европой будетъ обратнымъ.

Соотношеніе нашей фауны съ южнѣе лежащими областями Азіи, съ Персидской, Остъ-Індской и Китайско-манчжурской, сейчасъ невозможно установить въ точности по недостатку изслѣдованій. Относительно Остъ-Індіи мирмекафауна которой сравнительно лучше изслѣдована (58, 300, 346, 349, 939), можно сказать, что тамъ имѣется 25 родовъ, общихъ съ Россіей, большая часть коихъ принадлежитъ главнымъ образомъ сѣвернымъ районамъ Индостана (Гималаи, Кашмиръ), и 55 такихъ, которыхъ нѣтъ въ Россіи, причемъ эти послѣдние свойственны преимущественно опять таки южнымъ тропическимъ частямъ Индостана и прилежащимъ къ нему островамъ. Такимъ образомъ, наиболѣе тѣсное соотношеніе имѣетъ наша мирмекологическая фауна только съ сѣверными мѣстностями Индіи, непосредственно прилежащими къ ея южной границѣ, отъ прочихъ же болѣе южныхъ индійскихъ областей, имѣющихъ совсѣмъ другія условія, отличается рѣзко.

Наѣснѣцъ, несомнѣнно, сродство фауны Приморской области въ Сибири съ Манчжуріей должно быть очень тѣснымъ, какъ это уже язвствуетъ изъ извѣстныхъ намъ ботанико-географическихъ данныхъ, но по отсутствію изслѣдованій вопросъ этотъ остается совершенно не выясненнымъ.

Что же касается связи съ пустынями высокаго центрально-азіатскаго нагорья, т. е. главнымъ образомъ съ Монголіей и Тибетомъ, то таковая совершенно очевидна изъ присутствія въ русской мирмекологической фаунѣ характерныхъ представителей этого нагорья, каковы, наприм., *Myrmica smythiesi* For., *Messor lobuliferus* Em. и нѣк. др., но она проявляется только на самыхъ южныхъ и юго-восточныхъ окраинахъ Сибири и Русскаго Туркестана, не простираясь далѣе южно-сибирскихъ горныхъ цѣпей, отдѣляющихъ отъ Сибири

Монголію въ качествѣ крупныхъ преградъ, за которыми уже лежатъ области съ другими біографическими условиями. Особенno хорошо обнаруживается связь съ центрально-азіатскимъ нагорьемъ въ мирмекофаунѣ Памира и Семирѣчья, какъ это было уже раньше доказано, въ особенности относительно ихтіофауны, проф. А. М. Никольскимъ<sup>1)</sup>. Накопецъ, существуетъ также известная, хотя и болѣе отдаленная связь нашей мирмекологической фауны, обнаруживаемая именно въ Закаспійской области и частью въ Закавказье, съ африканской и аравійской черезъ Мезопотамію и Персію, что подтверждается и на характерѣ другихъ фаунъ названныхъ мѣстностей.

2. Раздѣленіе муравьевъ Россіи по областямъ распространенія.

Разматриваемыя съ точки зрењія географического распространенія муравьи Россіи могутъ быть раздѣлены на слѣдующія группы:

- а) формы *палеарктическія* (исключительно принадлежащія Палеарктической области);
- б) формы *циркумбореальные* или *голарктическія* (свойственные какъ материку европейско-азіатскому, такъ и Сѣверной Америкѣ);
- в) — *космополиты*, имѣющія весьма обширный кругъ географического распространенія;
- г) формы *палеогейскія*, т. е. обитающія на пространствѣ большей части Старого Свѣта.

Среди представителей первой группы мы можемъ различить слѣдующія категоріи: 1) муравьевъ по преимуществу

---

<sup>1)</sup> А. М. Никольскій, О фаунѣ позвоночныхъ животныхъ дна Балхашской котловины, 1887. Отд. отд. изъ Труд. С.-Петербургск. Общ. Естествоиспытателей.

европейскихъ; 2) по преимуществу сибирскихъ; 3)—принадлежащихъ Средиземноморской подобласти, которые у насъ распространены въ Крыму, на Кавказѣ и въ Среднеазиатскихъ владѣніяхъ; 4)—широкораспространенныхъ вообще въ Палеарктической области, свойственныхъ какъ Европѣ, такъ и Азіи; и 5)—центрально-азиатскихъ, принадлежащихъ высокому центрально-азиатскому нагорью.

а) Представители палеарктической области

1. Изъ представителей Палеарктики къ формамъ по преимуществу европейскимъ, т. е. главнымъ образомъ принадлежащимъ сѣверной и средней Евроцѣ и характеризующимъ западную часть палеарктической области, относятся:

**Prenolepis imparis v. ni-	**Myrmecina graminicola
tens	Tomognathus sublaevis
*Camp. marginatus kamensis	Leptoth. tuberum v. nig-
Camp. manginatus s. str.	riceps
*Camp. herculeanus v. shi-	**L. corticalis
tkovi	L. unifasciatus
**Lasius bicornis	*L. melnikovi
**L. emarginatus	*L. kirillovi
? L. brunneus v. pallidus	*L. volgensis
Formica rufa v. meridio-	*Tetramor. caespitum v.
nalis	ferox
Form. exsecta v. rubens	**Myrmica rubida
*Form. fusca v. gagatoides	*M. scabrinodis bessarabica
**Polyergus rufescens	**Stenamma westwoodi
**Dolichoderus quadripun-	*Messor tataricus
catus	*Messor structor v. clivo-
**Liometop. microcephalum	rum
**Solenopsis fugax	Ponera coarctata
**Strongylogn. testaceus	

Всего 30 формъ, что составить ок. 11,7% для всей мирмекологической фауны Россіи.

Формы, отмѣченныя звѣздочкой, найдены пока только въ Европѣ. Россіи и можетъ быть вѣкоторыя окажутся характерными для нея. Минѣ думается, что таковыми можно считать и теперь *Leptoth. volgensis*, *L. melnikovi*, *Camp. marginatus kamensis*, *L. kirillovi*, *Form. rufa* var. *meridionalis*, *Messor structor* var. *clivorum*, такъ какъ они не найдены ни въ одной изъ тѣхъ мѣстностей средней Европы, которыхъ можно считать сравнительно хорошо изслѣдованными, какъ-то въ Австро-рии и Венгрии (Майръ 507, 508, 509), Швейцаріи (Форель 257), Великобританіи (Смитъ 706, 707; Сандерсъ 670), Германіи (Шиллингъ 689; Форстеръ 252, 253), Даніи (Майнертъ 564), Швеціи (Адлерцъ 2; Столльпе 636), Франціи (Андрэ 13 и Брюянъ 74). Возможно также, что вѣкоторыя найдутся и въ Сибири, напр. *C. herculeus* var. *shitkovi*, *Form. fusca* var. *gagatoides*, *Lept. kirillovi*, *Myrm. rubida*; другие въ своемъ распространеніи не ограничиваются и посейчасъ предѣлами Европы, а заходятъ въ западную или югозападную части Азіи (напр. *Leptoth. unifasciatus*) или въ Средиземноморскую подобласть (*Solen. fugax*, *Dolich. 4-punctatus*, *Pon. coarctata*, *Liomet. microcephalum*). Большую же часть изъ приведенныхъ въ таблицѣ формъ нужно считать характерными для Западной Европы; онѣ отмѣчены двумя звѣздочками (\*\*).

2. Формы по преимуществу *сибирскія* (т. е. характеризующія восточная части Палеарктической области):

<i>Camponotus saxatilis</i>	† <i>F. sanguinea</i> v. <i>mollessonae</i>
<i>C. herculeanus</i> v. <i>sachalinensis</i>	† <i>Dolichoderus sibiricus</i>
† <i>C. aterrimus</i>	<i>Myrmoxenus gordjagini</i>
† <i>C. quadrinotatus</i>	<i>Leptothorax nassonovi</i>
<i>Formica uralensis</i>	<i>Lept. stipaceus</i>
<i>F. truncicola</i> v. <i>yessensis</i>	† <i>Mycothorax hirticornis</i> v. <i>sibiricus</i>
<i>F. transcaucasica</i>	<i>Myrmica kasczenkoi</i>
<i>F. rufibarbis</i> v. <i>glauca</i>	

† <i>M. commarginata</i>	<i>M. scabrin.</i> v. <i>salina</i>
<i>M. scabrinodis</i> v. <i>lacustris</i>	<i>M. angulinodis</i>

Всѣхъ 20 формъ или ок. 7,87% всѣхъ русскихъ муравьевъ. Число это безъ сомнѣнія слишкомъ мало и въ будущемъ должно значительно увеличиться. Нѣкоторыя изъ перечисленныхъ формъ, будучи широко распространены въ Сибири, какъ *Camp. saxatilis*, *Form. uralensis*, *Lept. stipiceus*, *L. nassonovi*, постепенно двигаются на западъ; они уже перешли Уралъ и, дойдя пока до Волги, заняли почти всю восточную Евр. Россію, гдѣ распространены спорадически, а *Form. uralensis* проникъ даже до Москвы, представляя здѣсь случайный, совершенно изолированный, крайній форпостъ своего распространенія къ западу. Знакомъ (†) отмѣчены формы, принадлежащія восточной Сибири, которыя вѣроятно также всѣ найдутся и въ Манчжурии.

3. Формы *средиземноморскія*, т. е. свойственные южнымъ частямъ Палеарктической области:

* <i>Camp. turkestanicus</i>	<i>T. caesp.</i> v. <i>forte</i>
* <i>C. dichrous</i> v. <i>ferganensis</i>	<i>T. caesp.</i> v. <i>punicum</i>
* <i>C. diehr.</i> v. <i>flavonitidus</i>	† <i>T. semilaeve</i>
* <i>C. fedtschenkoi</i>	<i>T. semil.</i> v. <i>schmidti</i>
* <i>C. xerxes</i>	* <i>T. inerme</i>
* <i>C. turkestanus</i>	† <i>Leptocephalus exilis</i>
† <i>C. silvaticus</i>	* <i>L. satunini</i>
* <i>C. aethiops</i> s. str.	† <i>L. affinis</i>
<i>C. aeth.</i> v. <i>glaber</i>	† <i>L. nylanderi</i>
† <i>C. lateralis</i> v. <i>bicolor</i>	† <i>Colobopsis truncata</i>
* <i>C. later.</i> v. <i>atricolor</i>	<i>Myrmecocystus albicans</i>
<i>C. lat.</i> v. <i>merula</i>	* <i>M. viaticus setipes</i>
* <i>C. interjectus</i>	* <i>M. altisquamis</i> v. <i>jakobsoni</i>
* <i>C. marginatus ruzskii</i>	* <i>M. foreli</i>
<i>C. marg.</i> lameerei	* <i>M. caspius</i> ( <i>aenescens</i> )
* <i>Tetramorium schneideri</i>	* <i>M. pallidus</i>
* <i>T. caesp.</i> v. <i>reticuliventre</i>	<i>Proformica nasuta</i>
† <i>T. caesp.</i> v. <i>meridionale</i>	* <i>Prof. aberrans</i>

<i>Acantholepis frauenfeldii</i>	† <i>Cardiocondyla elegans</i>
<i>Plagiolepis pygmaea</i>	* <i>C. eleg. v. uljanini</i>
<i>Pl. pygm. v. pallescens</i>	* <i>C. bogdanovi</i>
<i>Tapinoma nigerrimum</i>	* <i>C. stambulovi</i>
<i>Bothriomyrmex meridionalis</i>	* <i>C. stamb. v. koshevnikovi</i>
† <i>Cremastogaster scutellaris</i>	* <i>Monomorium salomonis</i>
† <i>Cr. scutell. v. schmidti</i>	* <i>M. barbatulum</i>
<i>Cr. auberti v. sorokini</i>	* <i>M. venustum</i>
† <i>Cr. laestrygon</i>	<i>Pheidole pallidula</i>
<i>Cr. karawaevi</i>	† <i>Aphaenogaster subterranea</i>
* <i>Ischnomyrm. raphidiiceps</i>	† <i>Aph. testaceopilosa</i>
* <i>Stenamma asiaticum</i>	† <i>Aph. testac. v. semipolita</i>
† <i>Solenopsis orbula v. latroides</i>	† <i>Aph. gibbosa</i>
* <i>Sol. deserticola</i>	<i>Messor structor</i>
* <i>Myrmica bergi</i>	<i>M. barbarus</i>
* <i>M. strangeana</i>	* <i>M. caducus</i>
* <i>Tetramorium striativentre</i>	<i>M. capitatus</i>
† <i>Leptothorax nigritus</i>	<i>M. aegyptiacus (v. incor-</i>
* <i>L. semenovi</i>	<i>ruptus)</i>
† <i>Temnothorax recedens</i>	<i>M. striaticeps</i>
† <i>T. rogeri</i>	† <i>Ponera ochracea</i>

Это довольно обширная группа, достигающая 77 формъ, составляющихъ около 30,31% всего количества найденныхъ въ Россіи муравьевъ.

Одни изъ представителей Средиземноморской подобласти, отмѣченные знакомъ (†), характеризуютъ западную часть этой подобласти и доходятъ на востокъ до Крыма и Кавказа. Другие, отмѣченные звѣздочкой (\*), принадлежатъ восточной части Средиземноморской подобласти и распространены въ Туркестанѣ, Киргизской степи, Закаспійской области и по Западному побережью Каспійского моря; большую часть изъ нихъ можно считать характерными для Туранской провинціи; нѣкоторые же распространены дальше ея, встрѣчаясь въ Персіи, Аравіи, Малой Азіи (наприм. *Myrm. pallidus*). Затѣмъ, имѣются формы, проходящія черезъ всю область отъ Порту-

гали и Атласскихъ горъ до Туркестана включительно (*Plagiopelis rugosa*, *Myrmec. albicans*, *Pheidole pallidula*).

Нѣкоторые средиземноморскіе виды распались на подвиды и разновидности, характеризующіе различные районы области Средиземного моря, являясь такимъ образомъ для западной и восточной частей этой области замѣняющими формами. Таковы виды: *Campon. maculatus*, *Myrmecocystus cursor*, *Myrmec. viaticus*, *Myrm. altisquamis*, *Messor structor*.

Изъ цикла полиморфнаго вида *Campon. maculatus* нужно, въ качествѣ примѣра, указать на *C. aethiops*, который образовалъ четыре формы, характеризующія разныя области, именем: 1) *cashmirensis* на крайнемъ востокѣ распространенія этой расы, въ Кашмирѣ; 2) *glaber* — на Кавказѣ; 3) *concavus* — на Кавказѣ, въ Крыму и на Балканскомъ полуостровѣ; 4) *angustatus* — на западѣ, во Франціи.

*Myrmecocystus cursor* даль 2 основныхъ формы: западную *M. cursor* i. sp. (*M. cursor cursor* Em.), распространенную отъ Португалии до Альпъ, и восточную — *caspicus* [*M. cursor aenescens* (Nyl.) Em.], занимающую Венгрію, южную Евр. Россію и среднюю Азію до Тибета. Въ Италіи отъ него отдѣлилась вѣтвь *M. cursor italicus* Em. Въ Малой Азіи, Сиріи и Персіи его замѣняетъ близкій видъ *Myrm. frigidus* (And.) Em.

*Myrmecocystus cursor* var. *caspicus* Ruz. по всей вѣроятности, какъ это показалъ Эмери въ своей недавно вышедшей монографіи родѣ Муравьевъ (**925**), тождественъ съ *Myrm. cursor aenescens* Nyl. изъ южной Россіи (*Formica aenescens* Nylander **596**, стр. 37, ♀, ♂ и ♀). На основаніи не только морфоматическихъ, но главнымъ образомъ и географическихъ признаковъ его нужно считать за расу *Myrm. cursor* (Fonsc.); тогда *Myrmec. tancrei* For. долженъ представлять крайнюю восточную разновидность *Myrm. cursor aenescens*, характерную для центрально-азіатского нагорья.

*Myrmecocystus altisquamis* распадается также на двѣ расы: 1) малоазіатско-персидскую типичную — *altisquamis* i. sp.

[*M. altisquamis* — *altisquamis* (E. And.) Em.], дающую 3 болѣе сѣверныхъ разновидности — *bucharicus* For., *jukobsoni* Ruz. и *gracilens* Ruz. и 2) средне-азіатскую, пустынную — *foreli*, достигающую на сѣверъ до Сарепты (925).

*Myrmecocystus viaticus* образуетъ цѣлый рядъ формъ. Въ Западной Европѣ живутъ: *M. viaticus* i. sp. и *hispanicus*; въ Алжирѣ — *diehlii*; въ восточной Европѣ (Венгрия, Балканск. пол.), сѣверо-восточной Африкѣ, Закавказье и Закаспійской области — *desertorum*, и на крайнемъ востокѣ области, въ центральной Азіи и сѣверной Индіи — *setipes*, разновидность которого *turcomanicus* представляетъ переходъ между нимъ и *desertorum*.

*Messor structor* на довольно обширной области своего обитания, кромѣ типичной формы, живущей во Франціи, образовалъ 4 разновидности: а) *tyrrenus*, западную форму, населяющую Испанію и Италію; б) *miticus* — главнымъ образомъ характеризующую восточную Европу, Малую Азію и Кавказъ; в) *orientalis*, принадлежащую преимущественно Турану и не идущую на западъ далѣе Малой Азіи и юговосточной Евр. Россіи, и г) *clivorum*, свойственную сѣверо-востоку Европ. Россіи и идущую здѣсь на сѣверъ такъ далеко какъ нигдѣ въ Европѣ.

Большинство средиземноморскихъ формъ являются характерными для пустыни и каменистой степи.

4. Формы европейско-азіатскія (характеризующіяся весьма широкимъ распространениемъ, принадлежащія по преимуществу сѣвернымъ частямъ Палеарктической области):

<i>Camponotus ligniperdus</i>	<i>F. pressilabris</i>
<i>Camp. vagus</i>	<i>F. fusca</i> s. str.
<i>Lasius fuliginosus</i>	<i>F. gagates</i> s. str.
<i>L. carniolicus</i>	<i>F. rufibarbis</i> s. str.
<i>L. umbratus</i>	<i>F. rufib. v. glauca</i>
<i>Formica rufa</i> s. str.	<i>F. rufib. v. subpilosa</i>
<i>F. truncicola</i>	<i>F. cinerea</i> s. str.
<i>F. exsecta</i>	<i>F. cin. v. imitans</i>

<i>F. sanguinea</i>	<i>Myrmica ruginodis</i>
<i>Tapinoma erraticum</i>	<i>M. rugulosa</i>
<i>Anergates atratulus</i>	<i>M. sulcinodis</i>
<i>Leptothorax tuberum</i> (s. str)	<i>Strongylognathus christophi</i>
<i>Mycothorax acervorum</i>	

Всего 25 формъ или ок. 9,84%. Почти все эти формы, принадлежащія умѣренному климату, являются по преимуществу обитателями лѣсовъ или степей.

Нѣкоторыя изъ нихъ были указаны прежними авторами для Сѣв. Америки, но показанія эти потомъ не подтвердились<sup>1)</sup>. Оказалось при ближайшемъ изслѣдованіи, которымъ мы обязаны главнымъ образомъ К. Эмери, что многіе изъ европейско-азіатскихъ муравьевъ имѣютъ въ фаунѣ Сѣверной Америки весьма близкихъ сородичей, которые ихъ тамъ и замѣняютъ. Для наглядности представимъ такія *викарныя* формы въ видѣ параллельной таблицы.

*Евразія:*

<i>Formica truncicola</i> . . . . .	{	<i>Formica integra</i> (?)
		<i>F. obscuriventris</i>
<i>F. rufa</i> . . . . .	{	<i>F. dakotensis</i>
		<i>T. diffcilis</i>
<i>F. cinerea</i> . . . . .	{	<i>F. pilicornis</i>
<i>F. rufibarbis</i> . . . . .	{	<i>F. neorufibarbis</i> (var.)
<i>F. clara</i> . . . . .	{	<i>F. neoclara</i> (var.)
<i>F. gagates</i> . . . . .	{	<i>F. subpolita</i>
<i>F. fuscit</i> . . . . .	{	<i>F. subsericea</i> (var.)
		<i>T. subaenescens</i> (var.)
		<i>F. rubicunda</i>
<i>F. sanguinea</i> . . . . .	{	<i>F. puberula</i>
		<i>F. obtusopilosa</i>
<i>F. exsecta</i> . . . . .	{	<i>E. exsectoides</i>
<i>F. pressilabris</i> . . . . .	{	<i>F. ulkei</i>

<sup>1)</sup> Относительно *Myrm. sulcinodis* вопросъ еще не вполнѣ выяснился, и можетъ-быть ее слѣдовало бы включить въ группу циркумбореальныхъ формъ.

<i>Proformica nasuta</i> . . . . .	<i>Prof. lasioides</i> (?)
<i>Lasius bicornis</i> . . . . .	<i>L. minutus</i>
<i>Prenolepis imparis</i> v. <i>nitens</i> . .	<i>Pr. imparis</i> s. str.
<i>Polyergus rufescens</i> . . . . .	{ <i>Pol. lucidus</i> <i>Pol. breviceps</i>
<i>Camp. saxatilis</i> . . . . .	{ <i>C. pennsylvanicus</i> s. tr. — <i>japonicus</i> . . . . .
<i>C. ligniperdus</i> . . . . .	<i>C. lign.</i> v. <i>pictus</i>
<i>C. herculeanus</i> v. <i>montanus</i> . .	<i>C. herculeanus</i> v. <i>whimperi</i>
<i>C. marginatus</i> i. sp. . . . .	<i>C. nearcticus</i>
<i>C. ruzskyi</i> . . . . .	<i>C. minutus</i>
<i>Colobopsis truncata</i> . . . . .	<i>Col. impressa</i>
<i>Liometopum microcephalum</i> i. sp.	<i>L. microceph.</i> v. <i>occidentale</i>
<i>Myrmecina graminicola</i> . . . .	<i>Myrm. americana</i>
<i>Tomognathus sublaevis</i> . . . .	<i>T. americanus</i>
<i>Cremastogaster scutellaris</i> . . .	<i>Cr. lineolata</i> (?)
<i>Stenamma westwoodi</i> . . . . .	<i>St. nearcticum</i>
<i>Aphaenogaster gibbosa</i> . . . .	<i>Aph. fulva</i>
<i>Aph. subterranea</i> i. sp. . . . .	<i>Aph. occidentale</i>
<i>Myrmica rubida</i> . . . . .	<i>M. mutica</i>
<i>M. ruginodis</i> . . . . .	<i>M. brevinodis</i>
<i>M. sulcinodis</i> . . . . .	<i>M. sulcinodooides</i>
<i>Mychothorax acervorum</i> . . .	<i>Mych. canadensis</i>
<i>Mych. hirticornis</i> v. <i>sibiricus</i> .	<i>M. hirticornis</i> i. sp.
<i>Leptothorax oxianus</i> . . . . .	<i>L. nitens</i>
<i>Ponera coarctata</i> . . . . .	<i>P. pennsylvanica</i>
<i>Tapinoma erraticum</i> . . . . .	<i>T. sessile</i>

Мы видимъ, что число этихъ формъ довольно значительно. У нѣкоторыхъ, аналогія которыхъ недостаточно разъяснена, поставленъ знакъ (?).

5. Къ формамъ центрально-азіатскимъ, которыхъ подобно дикому яку, аргали или улару можно считать характерными для пустынь и высокихъ плоскогорій Памира, Тибета и Монголії, мы должны причислить слѣдующихъ:

<i>Camponotus tichomirovi</i>	<i>C. fedtschenkoi</i> v. <i>mayri</i>
<i>C. buddhae</i>	<i>Lasius flavescens</i>

Las. emeryi	Myrmica smythiesi
Formica clara	M. smythiesi v. fortior
Cremastogaster subdentata	M. dshungarica
Cremastog. bogojawlenskii	M. laevinodis v. minuta
Leptothorax bulgaricus v. melleus	— v. tenuispina
Lept. pamiricus	Myrmica saposhnikovi
Lept. oxianus	Messor lobuliferus v. excur- sionis
Pheidole koshewnikovi	

Всего 19 формъ или ок. 7,4%, которые вѣдь свойственны только окраинамъ нашихъ Среднеазіатскихъ владѣній и Сибири. Несомнѣнно число это со временемъ должно будеть значительно увеличиться, когда будутъ произведены подробныя мирмекологическія изслѣдованія Семирѣчья, Тянъ-Шаня, Тарбогата и Памира, вообще нашего восточного Туркестана, равно какъ и южныхъ, граничащихъ съ Монголіей окраинъ Сибири; тогда сюда-же по всей вѣроятности придется причислить и такія формы какъ *Formica transcaucasica*, *Prof. aber-  
rans* и var. *nitidior*, *Myrmecocystus setipes*, *Myrm. foreli* var. *bucharicus*, *Tetramorium schneideri*, распространеніе которыхъ недостаточно еще выяснилось и которая пока условно отнесены мною въ другія группы.

б) Къ формамъ циркумбореальнымъ или голарктическимъ, принадлежащимъ какъ Евразіи, такъ и Сѣверной Америкѣ, относятся слѣдующія:

Camponotus herculeanus	? Formica pratensis
C. hercul. v. whimperi	Tapinoma sessile
Lasius flavus	Tetramorium caespitum
L. myops	Formicoxenus nitidulus
L. affinis	Myrmica scabrinodis
L. myxtus	? M. lobicornis
L. niger	— var. schencki
L. alienus	? M. laevinodis
? L. brunneus	Myrmecothorax muscorum

Такимъ образомъ число общихъ съ Сѣв. Америкой формъ сравнительно небольшое, составляющее всего около 7% всѣхъ муравьевъ Россіи; но при этомъ пужно принять во вниманіе во первыхъ, очень малое изслѣдованіе восточной Сибири, гдѣ найдется вѣроятно много формъ муравьевъ, общихъ съ Сѣверной Америкой, во вторыхъ значительное количество викарныхъ формъ, о которыхъ было говорено выше (стр. 21).

Всѣ эти формы, за исключепіемъ только *Tapin. sessile* и *Catpr. hercul. v. whitperi*, отличаются обширнымъ распространеніемъ и въ стационарномъ отношеніи различны: однѣ характеризуютъ степи (*Las. alienus*, *Myrm. lobicornis*), другія свойственны лѣсамъ (*C. herculeanus* и *vag. whitperi*, *Formicoxenus nitidulus*), треты—горамъ (*Lasius myops*). Относительно *Tetramorium caespitum* можно думать, что онъ завезенъ въ Сѣверную Америку въ позѣйшее время человѣкомъ черезъ торговлю. Знакомъ вопроса отмѣчены формы, нахожденіе которыхъ въ Сѣв. Америкѣ пужно считать пока нѣсколько сомнительнымъ.

в) *Муравьи—космополиты* составляютъ минимальный процентъ состава мирмекофауны Россійской имперіи. Ихъ только три вида—*Monomorium pharaonis*<sup>1)</sup>, *Pheidole megacephala* и *Prenolepis vividula*<sup>2)</sup>. Своимъ космополитизмомъ они обязаны дѣятельности человѣка: благодаря ему и его торговымъ спошненіямъ они, подобно многимъ другимъ животнымъ, слѣдующимъ за человѣкомъ въ качествѣ его захребетниковъ, постепенно распространялись почти по всему свѣту и продолжаютъ распространяться. Ихъ родиной служатъ тропики, гдѣ они и носейчасъ живутъ въ естественной обстановкѣ, въ болѣе

<sup>1)</sup> Родина *Monomorium pharaonis* по всей вѣроятности находится въ южной Азіи, всего вѣрище на Зондскихъ островахъ.

<sup>2)</sup> Недавно К. Эмери (924) на основаніи сравнительного изслѣдованія видовъ *Prenolepis* раздѣлилъ этотъ родъ на три группы, установивъ два новыхъ подрода: *Prenolepis* s. str., *Nylanderia* (n. subg) и *Euprenolepis* (n. subg). *Pren. vividula* отнесенна имъ къ подр. *Nylanderia*. Вѣроятнымъ отечествомъ этого вида онъ считаетъ Америку, именно Мексику, откуда очевидно онъ и былъ развезенъ по разнымъ странамъ съ живыми растеніями.

же низкихъ широтахъ, будучи не приспособленными къ умѣренному и холодному климатамъ, они поселяются исключительно около человѣка, въ его домахъ, въ оранжереяхъ, теплицахъ.

Возможно, что такими же космополитами сдѣлаются *Lasius niger* и *Tetramorium caespitum*. Оба эти вида замѣчательны тѣмъ, что при обширномъ распространеніи отличаются способностью жить при разнообразныхъ условіяхъ мѣстообитанія. Мы встрѣчаемъ ихъ какъ въ различныхъ лѣсахъ, такъ и въ рѣчныхъ долинахъ, на лугахъ, по склонамъ овраговъ и балокъ среди степей, на солонцахъ, въ жилищахъ человѣка, наконецъ и въ альпійской области горъ, словомъ вообще на разныхъ почвахъ и среди различной растительности. При такихъ условіяхъ существованія названныхъ видовъ на весьма большихъ расстояніяхъ вполнѣ естественно ожидать, что одинъ изъ нихъ именно *Tetramorium caespitum* подвергся значительной степени измѣнчивости, распавшись на многія разновидности и расы, изъ коихъ пѣкоторые сдѣлались видами. Что же касается *Lasius niger*, то онъ, напротивъ, отличается стойкостью своихъ признаковъ, съ замѣчательнымъ постоянствомъ удерживая свой видовой типъ.

Различные формы *Tetram. caespitum* образуютъ цѣлый рядъ модификацій, пріобрѣтая различные признаки и измѣняясь въ различныхъ направленіяхъ собственно съ характеромъ областей, гдѣ онѣ распространялись. Такъ, формы пустынь, которымъ приходится жить подъ палящими лучами солнца на голой, почти лишенной растительности почвѣ, отличаются склажевной, блестящей поверхностью хитина, отсутствиемъ волосковъ, свѣтлой окраской—таковы: *Tetram. caespitum inerme*, var. *meridionale*, var. *ruficinctum*, *semilaeve*, v. *schmidtii* и др.; формы же болѣе сѣверныхъ мѣстностей и болѣе холодныхъ климатовъ, живущія на темноцвѣтныхъ почвахъ луговъ или лѣсовъ среди густой травянистой растительности, имѣютъ темную, почти черную окраску, довольно обильную волосистость и сильно выраженную скелѣтуру съ рѣзкими, грубыми морщинками на головѣ и груди (*caespitum* i. sp., var. *forte*, *ferox*). Въ го-

рахъ же мы встрѣчаемъ формы хотя тоже темно окрашенныя, но съ гладко блестящей головой, въ чемъ всетаки сказалось влияніе яркаго горячаго солнца и вѣтра (var. *splendens*). Другія же формы тетраморіума уклонились въ томъ отношеніи, что приобрѣли поверхность брюшка не гладкую и блестящую, какъ у всѣхъ прочихъ тетраморіумовъ и вообще у громаднаго большинства представителей *Myrmicinae*, а скѣльтированную, покрытую продольно-штриховатыми или сѣтчатыми морщинками—это формы, явившіяся вѣроятно выходцами изъ высокихъ горныхъ областей центральной Азіи, а потомъ постепенно распространившіяся по арабо-каспійской пустынѣ и дальше (*Tetram. schneideri*, *striativentre*, *sericeiventre*, *reticuliventre*).

Постоянство же въ признакахъ *Lasius niger* я думаю нужно объяснить тѣмъ обстоятельствомъ, что этотъ муравей при разнообразіи мѣстожительствъ, всегда выбираетъ себѣ такія мѣста, которыя отличаются болѣе или менѣе значительной влажностью; присутствіе извѣстнаго количества воды въ почвѣ для него необходимо условіе; на сухихъ почвахъ онъ не живеть. Вотъ почему опять особенно проявляется среди луговъ рѣчныхъ долинъ, на солонцахъ, въ огородахъ и садахъ, въ тѣнистыхъ сырыхъ лѣсахъ (гдѣ гнѣздится не только въ землѣ, но и въ пняхъ) и т. д. А вода, вообще влажность, какъ мы знаемъ, уравниваетъ климаты, дѣлая болѣе однообразными условія существованія и тѣмъ способствуя сохраненію типа, что и сказалось, въ миньятюрѣ конечно, па *Lasius niger*. Только въ борахъ живеть особая форма *Lasius niger*, вѣроятно болѣе древняя чѣмъ онъ самъ.

г) Въ фаунѣ Россіи имѣются еще два вида широкораспространенные, принадлежащіе почти всему Старому Свѣту или т. назыв. *палеогейскіе*, если слѣдовать терминологіи Склетера. Это—*Monomorium gracillimum* и *Cremastogaster sordidula*. Первый, будучи распространенъ въ Азіи, въ Африкѣ и въ южной Европѣ, былъ найденъ также и на островахъ Полинезіи. Второй видъ, оказавшійся довольно полиморфнымъ, образуетъ цѣлый рядъ формъ, свойственныхъ не только восточному континенту, но и Австраліи.

Такимъ образомъ преобладающими въ мирмекологической фаунѣ Россіи формами являются южно-палеарктическія или иначе средиземноморскія: ихъ громадное большинство. Затѣмъ слѣдуютъ европейскія и европейско-азіатскія, далѣе—сибирскія. Сравнительно небольшое число циркумбореальныхъ формъ компенсируется значительнымъ количествомъ викарныхъ формъ.

### Обзоръ распределенія русскихъ муравьевъ по стациямъ.

1. Значеніе среды въ жизни животныхъ. Три условія, опредѣляющія отношеніе животнаго къ средѣ. Стациі и ихъ подраздѣленія.

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію распределенія муравьевъ Россіи по тѣмъ біологическимъ группамъ, которыхъ мы называемъ *стациями*. Каждая стация заключаетъ въ себѣ определенный комплексъ формъ, связанныхъ общностью мѣстообитанія. Мы знаемъ, что всякий видъ животнаго, всякая форма пріурочены къ извѣстному мѣстообитанію, причемъ большая часть формъ обыкновенно придерживаются строго какого-либо определенного мѣстообитанія, но есть и такія, которыхъ могутъ жить на различныхъ мѣстообитаніяхъ.

Характеръ мѣстообитанія каждой животной формы, какъ извѣстно, вытекаетъ изъ тѣхъ сложныхъ, слагающихся исторически, соотношеній, которыхъ существуютъ между этой формой и окружающими ее условіями существованія. Всякое животное тѣсно связано съ этими окружающими его условіями, находится во взаимодѣйствіи съ окружающей его средой. Условія этой среды сопровождаютъ животное въ теченіи всей его жизни, отъ момента рожденія и до смерти, могущественнымъ образомъ вліяя на его жизнь. Но и само животное не относится пассивно къ воздействиію среды; оно такъ или иначе реагируетъ на это воздействиѣ всѣмъ существомъ своей организаціи. Жизнь животнаго, такимъ образомъ, слагается изъ от-

дѣльныхъ моментовъ разнообразныхъ вліяній на него окружавшихъ его условій и реакцій на нихъ его организма.

Жизнь каждого животнаго зависитъ:

1) какъ отдѣльного индивидуума—отъ окружающихъ его физико-географическихъ условій;

2) какъ отдѣльного бионта, т. е. члена окружающаго его міра живыхъ существъ,—отъ взаимныхъ отношеній съ другими организмами,

и 3) какъ представителя известной фауны, какъ жителя известной страны—отъ географического положенія относительно центра его происхожденія и отъ путей, по которымъ шло его распространеніе на земной поверхности.

Значитъ, три условія опредѣляютъ жизнь животнаго въ каждой данной мѣстности: одни—физіологическіе, вызываемыя воздействиѳмъ факторовъ неорганической среды, каковы вода, воздухъ, температура, пища, давленіе атмосферы и свѣтъ, другіе—чисто біологическія, третьи—географическія. Чтобы, поэтомъ, понять жизнь животнаго, выяснить всеяя проявленія и связь съ ними его организаціи, что и составляетъ одну изъ основныхъ задачъ біогеографіи, для этого нужно определить вліяніе всѣхъ этихъ трехъ условій на жизнь и организацію животнаго, и сделать надлежащую оценку ихъ значенія въ прошломъ и настоящемъ для данного животнаго. Задача эта крайне трудная и въ высшей степени сложная, требующая съ одной стороны тщательныхъ, продолжительныхъ наблюдений ихъ на мѣстѣ, непосредственно въ природѣ, съ другой—известной, возможной проверки ихъ опытнымъ путемъ.

Изъ указанныхъ условій сравнительно легче познаются первыя, т. е. чисто физіологическія условія существованія. Они болѣе доступны наблюденію и опыту. Изучая ихъ, мы можемъ повторять ихъ, видоизмѣня и комбинируя различнымъ образомъ. Вторыя, т. е. біологическія условія существованія, гораздо сложнѣе и труднѣй для изученія. Они вытекаютъ изъ потребностей животнаго къ питанію и размноженію, т. е. прежде всего изъ заботъ его о самомъ себѣ, о своемъ я, затѣмъ основываются на любви животнаго къ своему потом-

ству и попеченіяхъ его о немъ и, наконецъ, на стремлениі его къ общенню съ другими существами, т. е. къ общественности. Въ силу этихъ потребностей и желанія удовлетворить имъ и проис текаютъ всѣ тѣ сложныя соотношенія, которые существуютъ у всякаго животнаго съ другими представителями органическаго міра. Регулируются-же эти соотношенія главнымъ образомъ борьбой за существованіе. Трети условія существованія опредѣляются историческими причинами, подъ вліяніемъ которыхъ во времени и пространствѣ развивалась жизнь на землѣ. Каждый видъ животнаго долженъ быть возникнуть на какомъ нибудь пунктѣ земной поверхности, въ какомъ нибудь центрѣ, отъ которого онъ и началъ распространяться въ извѣстномъ направлениі. Блуждая и странствуя по земной поверхности, виды животныхъ должны были испытывать на себѣ всѣ тѣ измѣненія, которымъ эта поверхность подвергалась, измѣнялись сами, приспособляясь къ новымъ условіямъ существованія. Изучая переселенія животныхъ, движение ихъ по земной поверхности, мы убѣждаемся, что ни одинъ видъ не находится въ состояніи абсолютнаго покоя; онъ всѣмъ существомъ своимъ существуетъ во всеобщемъ движеніи, совершающемся вокругъ него и въ немъ самомъ, существуетъ въ непрерывномъ измѣненіи земной поверхности. Условія жизни и переселеній однихъ видовъ животныхъ сложились такимъ образомъ, что они въ данный моментъ занимаютъ болѣе или менѣе цѣльную, непрерывную область распространенія. Другие же виды оказываются распространенными не сплошь, а спорадически, это виды прерывчатаго или разобщеннаго распространенія; ихъ мы почти всѣхъ можемъ считать *реликтовыми*, такъ какъ въ большинствѣ случаевъ это очень древніе типы, остатки прежнихъ фаунъ. Имѣются и такие еще виды, которые, занимая сплошную область распространенія, въ тоже время встрѣчаются и виѣ ея на отдѣльныхъ, разбросанныхъ пунктахъ обитанія съ опредѣленными условіями, имѣющими тѣсную связь или съ ихъ прошлымъ распространениемъ, или съ нормальнымъ характеромъ мѣстообитанія,—это виды *экзокихескаго* распространенія. Такое экзокихеское рас-

пространение съ одной стороны можетъ указывать на прежнюю болѣе обширную область, когда-то бывшую занятой видомъ, а съ другой стороны можетъ быть вызвано и позднѣйшимъ распространениемъ вида, т. е. следовательно въ этомъ послѣднемъ случаѣ будетъ обозначать тенденцію вида къ дальнѣйшему распространенію области своего нормального обитанія. Наконецъ, нужно имѣть въ виду и такие виды, которые изъ предѣловъ области своего нормального распространенія занесены пассивно въ другія, иногда очень отдаленныя, мѣстности человѣкомъ или черезъ посредство другихъ факторовъ, являя примѣръ *апоклическаго*<sup>1)</sup> распространенія. Такіе виды отличаются разнохарактерностью мѣстобитанія и мѣста ихъ вторичнаго поселенія не имѣютъ никакого отношенія къ области ихъ прежняго, нормального распространенія. Это виды „сорные“, обыкновенно обширно распространенные, отличающіеся громадной приспособляемостью.

Подъ вліяніемъ всѣхъ вышеуказанныхъ условій въ теченіе извѣстнаго периода времени на землѣ сложились опредѣленныя біологическія группы, выработались особые зооботаническіе типы или формациі—это такія комбинаціи животныхъ и растительныхъ формъ, напряженіе жизненныхъ силъ и явленій которыхъ находится въ нѣкоторомъ устойчивомъ равновѣсії. Они представляютъ собою совокупность условій, вызывающихъ извѣстную группировку видовъ растеній и животныхъ, опредѣляющихъ распространеніе каждого вида и регулирующихъ его образъ жизни. Такихъ основныхъ типовъ мы различаемъ въ предѣлахъ Россіи четыре: лѣсъ, степь, пустыня и горная области. Каждый изъ этихъ типовъ въ свою очередь раздѣляется на *стациіи* (*stationes*)<sup>2)</sup>. Стациіи же могутъ быть

<sup>1)</sup> Оба послѣдніе термина введены были впервые въ ботаникѣ покойнымъ академикомъ С. И. Коржинскимъ (см. Прилож. къ проток. засѣд. Казанск. Общ. Ест., № 87). Они вполнѣ примѣнимы и въ зоогеографіи.

<sup>2)</sup> Терминъ этотъ, предложенный недавно нашимъ энтомологомъ А. П. Семеновымъ-Таинъ-Шанскимъ (См. Русск. Энтом. Обозрѣніе, 1916 г., № 1—2, Отд. критико-библіогр., стр. 108) вмѣсто прежнаго «станція», мнѣ кажется, долженъ быть принятъ какъ несомнѣнно болѣе удачный и правильный.

подразделены на болѣе мелкія категоріи, на стації 2-го порядка или *подстациі* (substationes), а эти въ свою очередь распадаются на еще меньшія единицы, на *мѣстонахожденія* и т. д.

Лѣсная формација распадается на слѣдующія стації: тайгу или елово-пихтовый лѣсъ, лиственій лѣсъ и сосновый боръ. Формација степи заключаеть въ себѣ стації: черноземную (ковыльную и луговую) степь, каменистую степь, солончаковую и степь кустарниковую. Формација пустыни состоять изъ стацій: песчаная пустыня, глинисто-полынная и каменистая. Горная область, по моему мнѣнію, содержитъ главнымъ образомъ двѣ характерныя стації: *алпійскіе луга*, простирающіеся отъ верхней границы лѣсовъ до подножія ледниковыхъ, и *горную степь* на каменистомъ грунтѣ съ слабо развитымъ почвеннымъ покровомъ и съ сравнительно бѣдной травянистой и кустарниковой растительностью. Эту именно стацію,— высокую нагорную степь, я считаю древнѣе равнинной степи, въ особенности черноземной, и думаю, что фауна послѣдней ведеть свое происхожденіе отъ первой. Точно также и фауна пустыни очевидно болѣе позднаго происхожденія, чѣмъ горная, по все-же древнѣе черноземной степи. Далѣе, мнѣ кажется, что фауна сосновыхъ боровъ древнѣе, чѣмъ лиственныхъ лѣсовъ, а эта послѣдняя старше тайги, являющейся вообще повидимому наиболѣе новой среди всѣхъ лѣсныхъ стацій.

*Рѣчные долины* также должны быть разматриваемы какъ отдельная стація, хотя онѣ такого цѣльного характера какъ вышеуказанные не имѣютъ. Рѣчные долины, проходя черезъ другія стаціи, обыкновенно заимствуютъ нѣкоторые элементы ихъ фауны, и потому стационарное значеніе въ истинномъ смыслѣ слова онѣ имѣютъ только для водныхъ обитателей.

Подстациями тайги могутъ быть чистый елово-пихтовый лѣсъ и смѣшанный;—лиственія лѣса: дубовый лѣсъ съ примѣсью другихъ широколиственныхъ породъ на югѣ, буковый на югѣ и западѣ, и березовой лѣсъ. Сосновые боры распадаются на слѣдующія substationes: сухой сосновый боръ,

милистый боръ, смѣшанный боръ. Сюда же въ качествѣ *sub-statio* можно причислить и лиственничный боръ въ общемъ очень сходный по своимъ биологическимъ условіямъ съ сосновымъ боромъ, равно какъ и боръ, развитый на скалахъ и утесахъ. Черноземную степь мы можемъ подраздѣлить на *ковыльную* съ преобладаніемъ рѣдко растущихъ дерновинъ злаковъ, въ особенности типчака и ковылей, и *луовую*, разнотравную съ сплошнымъ травянистымъ покровомъ, среди которого ковыля совсѣмъ можетъ и не быть; *каменистая степь* также будетъ отличаться характеромъ растительности и фауны, смотря потому будетъ-ли она развита на мѣлу, на грубыхъ известнякахъ, на мергель или на скалахъ и т. д.

Распредѣленіе муравьевъ по всѣмъ этимъ стаціямъ и болѣе мелкимъ ихъ подраздѣленіямъ представляетъ различныя характерныя особенности, благодаря которымъ каждая стація имѣть свой спеціальный мирмекологическій обликъ.

2. Таблица распредѣленія муравьевъ по главнымъ типамъ и стаціямъ, равно какъ и по географическимъ участкамъ Россіи.

Прежде чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію распредѣленія муравьевъ по стаціямъ и составленію списковъ формъ, характерныхъ для той или другой стаціи, мы выразимъ это для ясности въ видѣ слѣдующей таблицы, которая представить собою списокъ всѣхъ формъ муравьевъ, до сихъ поръ найденныхъ въ предѣлахъ Россіи. Въ ней-же отмѣчено распространеніе отдельныхъ формъ въ Россіи по слѣдующимъ крупнымъ участкамъ, на которые мы дѣлимъ территорію Россійской имперіи: Европейская Россія, Крымъ, Кавказъ, Сибирь и Туранъ. Знакъ + указываетъ на принадлежность формы къ извѣстной стаціи и нахожденіе въ томъ или другомъ участкѣ. Знакъ × обозначаетъ, что та или другая форма встрѣчается изрѣдка въ извѣстной стаціи, не будучи однако характерной для нея.

№	НАЗВАНИЕ ВИДОВЪ, РАСЪ И РАЗНОВИДНОСТЕЙ	Тайга	Листв. лѣсъ	Сосн. боръ	Степь	Пустыня	Рѣч. долина	Горы	Вост. Россія	Крайнъ	Кавказъ	Сибирь	Туранъ	
1	<i>Camponotus tichomirevi</i> . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
2	— <i>buddhae</i> . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
3	— <i>fedtschenkoi</i> . . . . .	—	?+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
4	— <i>v. obliquipilosus</i> . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
5	— <i>v. mayri</i> . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
6	— <i>turkestanus</i> . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
7	— <i>dichrous v. ferganensis</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
8	— <i>v. flavenitidus</i> . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
9	— <i>turkestanicus</i> . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
10	— <i>silvaticus</i> . . . . .	—	?+	—	—	—	?	X	?	—	—	—	—	—
11	— <i>cognatus</i> . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
12	— <i>xerxes</i> . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
13	— <i>aethiops</i> . . . . .	—	—	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	— <i>v. silvatico-aethiops</i> . .	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	— <i>v. concavus</i> . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	— <i>v. silvaticoides</i> . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	— <i>v. glaber</i> . . . . .	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	— <i>herculeanus</i> . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
19	— <i>v. montanus</i> . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
20	— <i>v. shitkovi</i> . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	— <i>v. whymperi</i> . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	— <i>v. sachalinensis</i> . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
23	— <i>ligniperdus</i> . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	— <i>saxatilis</i> . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
25	— <i>aterrimus</i> . . . . .	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
26	— <i>vagus</i> . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



№	НАЗВАНИЕ ВИДОВЪ, РАСЪ И РАЗНОВИДНОСТЕЙ	Тайга	Лист. лѣсъ		Сосн. боръ	Степь	Пустыня	Рѣчк. долина	Горы	Европ. Россія	Крымъ	Кавказъ	Сибирь	Туранъ
			+	-										
53	— v. odoratus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	— myops . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	— v. flavoides . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	— umbratus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	— exacutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	— mixtus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	— bicornis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	— v. affinis. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Formica rufa . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	— v. meridionalis . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	— truncicola . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	— v. yessensis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	— pratensis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	— uralensis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	— exsecta . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	— v. rubens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	— pressilabris . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	— v. rufomaculata . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	— fusca . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	— v. gagatoides . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	— gagates . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	— v. muralewieczi . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	— transcaucasica . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	— rufibarbis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	— v. glauca . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	— v. subpilosa . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№	НАЗВАНИЕ ВИДОВЪ, РАСЪ И РАЗНОВИДНОСТЕЙ	ПРИЧИНЫ ПОДСЧЕТА											
		Тайга	Листв.лѣсъ	Сосн. боръ	Степь	Пустыня	Рѣчн. долина	Горы	Европ. Россия	Крымъ	Кавказъ	Средн. Азия	Туркъ
79	— clara . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	— v. caucasica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
81	— cinerea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82	— v. imitans . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	— v. armenica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	— sanguinea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	— v. mollesonae . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Proformica aberrans . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	— v. nitidior . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	— nasuta . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Myrmecocystus bicolor <sup>1)</sup> . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—
90	— setipes . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—
91	— v. turcomanicus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—
92	— v. lucidus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
93	— altysquamis v. jakobsoni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	— foreli . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	— v. bucharicus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
96	— v. gracilens . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	— albicans . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	— pallidus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	— tancrei . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	— aenescens . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	Polyergus rufescens . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102	Acantholepis frauenfeldi . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	— v. nigra . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	— v. semenovi . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<sup>1)</sup> Myrmec. bicolor F.=Myrm. viaticus v. desertorum. For.











№	НАЗВАНИЕ ВИДОВЪ, РАСЪ И РАЗНОВИДНОСТЕЙ	Тайга	Листв. лѣсъ	Сосн. боръ	Степь	Пустыня	Рѣчи. долины		Горы	Европ. Россия	Крымъ	Кавказъ	Сибирь	Туранъ
							Горы	Край.						
235	— <i>v. subterraneoides</i> . . . . .	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—
236	— <i>testaceopilosa</i> . . . . .	—	—	—	+	+	—	—	—	—	—	+	—	—
237	— <i>v. semipolita</i> . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—
238	— <i>obsidiana</i> . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—
239	<i>Messor structor</i> . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	X	—	?	+	—
240	— <i>v. clivorum</i> . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
241	— <i>tataricus</i> . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
242	— <i>lobnliferus v. excursionis</i>	—	—	?X	—	—	—	?+	—	—	—	—	—	—
243	— <i>barbarus</i> . . . . .	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
244	— <i>capitatus</i> . . . . .	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
245	— <i>v. aralocaspicus</i> . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
246	— <i>v. meridionalis</i> . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
247	— <i>v. jakowlevi</i> . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
248	— <i>v. semirufus</i> . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
249	— <i>aegyptiacus v. incorruptus</i>	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
250	— <i>striaticeps</i> . . . . .	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—
251	— <i>caducus</i> . . . . .	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	?
252	<i>Ponera coaretata</i> . . . . .	—	—	+	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—
253	— <i>v. lucida</i> . . . . .	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
254	— <i>ochracea</i> . . . . .	—	—	?+	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—

Изъ этой таблицы видно, что наибольшее количество формъ приходится на долю Кавказа, именно ок. 135. Въ области Турана, въ предѣлы котораго я ввлючаю также Закас-

шайбскую, Тургайскую и Семиреченскую области и Киргизскую степь до Сарепты и Ергеней, констатировано до сих порь 119 формъ; затѣмъ въ Европейской Россіи—105, въ Сибири—80 и въ Крыму—52<sup>1)</sup>.

Въ экологическомъ отношеніи въ данной таблицѣ выдѣлены только наиболѣе крупныя группы, именно формы, принаадлежащія лѣсамъ (тайгѣ, сосновому бору и чернолѣсью), далѣе степи, пустынѣ, рѣчнымъ долинамъ и горамъ; при этомъ оказалось, что лѣсныя формы въ мирмекологической фаунѣ Россіи преобладаютъ: ихъ насчитывается 197, изъ коихъ тайгѣ принадлежать 26 формъ, сосновому бору—72 и лиственными лѣсами—99. Степямъ свойственно 119 формъ, пустынямъ—95, рѣчнымъ долинамъ—36. Въ высокой области горъ обитаетъ 74 формы.

### 3. Общая характеристика стацій и группировка въ нихъ формъ муравьевъ.

Мною было уже указано, что мирмекологическая фауна Россіи соотвѣтственно основнымъ зооботаническимъ типамъ ея распадается на четыре главныя группы: лѣсную, степную, пустынную и горную. Переходимъ теперь къ детальному разсмотрѣнію этихъ группъ.

Лѣсная фауна занимаетъ полосу тайги, лиственныхъ лѣсовъ и сосновыхъ боровъ Палеарктической области, т. е. слѣдовательно всю сѣверную половину Европейской Россіи и значительную часть Сибири до Тихаго океана, ограничиваясь на сѣверѣ тундрой, на югѣ степями; затѣмъ она хорошо выражена на Кавказѣ съ его огромными лѣсами, частью въ Крыму и въ соотвѣтствующихъ мѣстностяхъ Туркестана. Фауна степная занимаетъ всю полосу степей на югѣ Европейской Россіи, въ Западной и южной Сибири, значительную часть

1) Числа эти иѣсколько не совпадаютъ съ тѣми, которыхъ приведены въ первой части моего труда (loc. cit., стр. 770); объясняется это чисто случайными ошибками, допущенными тогда отчасти при подсчетѣ формъ, главнымъ же образомъ при корректурѣ.

Крыма и съверное Предкавказье. Пустынная фауна охватываетъ полосу пустынь Палеарктической области въ предѣлахъ Россіи, т. е. большую часть Турана. Наконецъ, горная фауна принадлежитъ горнымъ областямъ Крыма, Кавказа, Урала, Сибири, Туркестана и Памира; кромѣ того ея представители встречаются еще мѣстами на западѣ Европ. Россіи по отрогамъ Карпатъ и въ Финляндіи.

*Лѣсная фауна*, существование которой тѣсно связано съ лѣсомъ, у насъ въ Россіи, странѣ обильной лѣсами, развита очень хорошо и полно. Сообразно характеру нашихъ лѣсовъ, образующихъ лѣвѣ полосы—*съверную* сплошную и *южную* прерывчатую или точнѣе сказать: полосу лѣсовъ съверныхъ, идущихъ въ видѣ непрерывной, широкой полосы, и полосу лѣсовъ южныхъ, раздѣленныхъ степями и пустынями, и лѣсная мирмекологическая фауна распадается на *съверную* и *южную*. Первая вообще довольно бѣдна представителями и однообразна, вторая—сравнительно богата ими и болѣе разнобразна. Съверная лѣсная фауна образуетъ: 1) фауну сплошного хвойнаго лѣса или тайги; 2)—съверныхъ лиственныхъ лѣсовъ, развитыхъ преимущественно на суглинистой почвѣ; 3)—сосновыхъ боровъ на пескахъ и утесахъ. Южная фауна свойственна лѣсамъ, развитымъ на югѣ Европ. Россіи, въ Крыму, на Кавказѣ, въ Туркестанѣ и въ Восточной Сибири (Уссурійскій край). Между двумя этими фаунами имѣется рядъ постепенныхъ переходовъ, благодаря которымъ сглаживается различие въ ихъ характерѣ и составѣ. Южный типъ лиственныхъ лѣсовъ Евр. Россіи представленъ въ видѣ широколиственныхъ лѣсовъ съ букомъ и грабомъ, развитыхъ на З и ЮЗ, или въ видѣ небольшихъ степныхъ (байрачныхъ) лѣсовъ, преимущественно дубовыхъ и вязовыхъ, въ южной половинѣ Евр. Россіи, далеко выдающихся островками и полосами въ степную область, и образующихъ такъ называемую лѣсостепь или предстепіе. Лѣса эти переходнаго типа.

Фауна тайги и съверныхъ лиственныхъ лѣсовъ бѣдна формами; фауна сосновыхъ боровъ очень своеобразна. Про фауну южныхъ лѣсовъ, наиболѣе богатую представителями и

разнообразную, нужно сказать, что она еще очень мало изслѣдована, а въ Восточной Сибири и въ Туркестанѣ почти вовсе не извѣстна. Между всѣми этими типами есть много общаго, они имѣютъ много одинаковыхъ формъ, тѣмъ не менѣе есть и различіе какъ въ отношеніи группировки видовъ, ихъ обитающихъ, такъ и присутствіи въ каждой изъ нихъ особыхъ имъ только свойственныхъ формъ. Эти то именно во формы, являющіяся характерными для той или другой стації, заслуживаютъ особаго вниманія, такъ какъ придаются тѣтъ особый отпечатокъ, ту особую физіономію какъ каждой стації вообще, такъ и ея болѣе мелкимъ подраздѣленіямъ въ частности.

### Тайга.

*Тайга*, какъ извѣстно, представляется широкую, цѣльную полосу хвойнаго лѣса, состоящаго главнымъ образомъ изъ ели, пихты, сосны, а въ Сибири еще кедра и лиственницы, съ примѣсью мѣстами березы и осины, протянувшуюся южнѣе тундры отъ Скандинавіи по Евр. Россіи и Сибири, и захватывающую большую часть Урала, гдѣ она спускается почти до 53° с. шир. къ югу. На съверѣ тайга незамѣтно черезъ цоясь криволѣсъя переходитъ въ тундру. На югѣ она граничитъ съ полями и лиственными лѣсами, т. е. такъ наз. полосой островныхъ лѣсовъ; ея южной границей въ средней Россіи служать нижнее теченіе Камы и верхнее Волги; на западѣ же тайга достигаетъ почти до бассейна Припети. Тайга имѣетъ типъ дремучаго, мѣстами трудно проходимаго вслѣдствіе буреломовъ и валежника лѣса, перемежающагося съ обширными моховыми и травянистыми болотами. Вслѣдствіе рубки и пожаровъ она во многихъ мѣстахъ, особенно на своей южной границѣ, носить характеръ смѣшаннаго лѣса, чредуясь съ участками пахатныхъ полей и лиственныхъ лѣсовъ, вдающихся далеко въ тайгу и постепенно распространяющихся въ ней по гарямъ и долинамъ рѣкъ. Тѣмъ не менѣе нельзя сказать, чтобы тайга отступала; напротивъ, скорѣе надо допустить, что она медленнодвигается къ югу и западу.

Зоологический типъ ея молодой, повидимому не вполнѣ еще сформировавшійся.

Мирмекологическая фауна тайги состоитъ изъ слѣдующихъ формъ:

*Camp. herculeanus* (и var. *shitkovi*)

— <i>ligniperdus</i>	— <i>muscorum</i>
— <i>saxatilis</i>	<i>Myrmica laevinodis</i>
<i>Lasius flavus</i>	— <i>ruginodis</i>
— <i>niger</i>	— <i>angulinodis</i> (Сиб.)
<i>Form. rufa</i>	— <i>kasczenkoi</i> (Сиб.)
* — <i>pratensis</i> ( <i>rufo-pratensis</i> )	— <i>saposhnikovi</i> (Сем.)
* — <i>exsecta</i>	— <i>rugulosa</i>
* — <i>pressilabris</i>	<i>Formicoxenus nitidulus</i>
— <i>fusca</i> (и v. <i>gagatoides</i> )	* <i>Tetramorium caespitum</i>
— <i>sanguinea</i>	* <i>Formica rufibarbis</i>
<i>Mychothorax acervorum</i> (и v. <i>nigrescens</i> )	* <i>Myrm. lobicornis</i>

Курсивомъ въ спискѣ отмѣчены формы, особенно характерныя для тайги; къ нимъ же по всей вѣроятности придется причислить *Myrm. angulinodis* и *kasczenkoi*. Звѣздочка поставлена передъ такими формами, которая собственно не принадлежатъ тайгѣ, но успѣли далеко распространиться на сѣверъ главнымъ образомъ по сосновымъ борамъ, по просвѣкамъ и гарямъ, по склонамъ рѣчныхъ долинъ. *Lasius niger* и *flavus* придерживаются болыше культурныхъ районовъ и долинъ рѣкъ, хотя встрѣчаются и въ лѣсу.

Нѣкоторыя формы интересны тѣмъ, что доходятъ до самой сѣверной окраины тайги, до границы ея съ тундрой, это — *Camp. herculeanus* v. *shitkovi*, *Form. fusca* v. *gagatoides*, *Mych. acervorum*, *Myrm. ruginodis*. Но вопросъ о томъ, живутъ-ли они въ самой тундрѣ, и вообще встрѣчаются-ли тамъ какіенибудь муравьи, пока остается открытымъ. Экспедиція И. Академіи Наукъ на Новую Землю (въ 1896 г.) не нашла тамъ муравьевъ; пе известны они изъ Шпицбергена, ни съ Медвѣжихъ острововъ. Правда, была разъ указана одна мирмекика подъ именемъ *Myrm. rubra* L. (Curtis) для крайня-

го съвера Америки, именно съ арктическихъ острововъ, лежащихъ въ западной части Баффинова моря<sup>1</sup>), но какая это именно была форма и при какихъ условіяхъ найдена — не извѣстно (можеть быть *Myrm. scabrinodis* var. *glacialis* For.). Относительно двухъ первыхъ вышеуказанныхъ формъ нужно замѣтить, что *F. fusca* v. *gagatoides* очень близокъ къ *F. gagates* и *transcaucasica*, свойственныхъ главн. образомъ горамъ и высокимъ каменистымъ степямъ; а *C. herculeanus* v. *shitkovi* до извѣстной степени аналогиченъ съ горнымъ *C. herculeanus* v. *tontanis*; — здѣсь еще разъ подтверждается фактъ сходства извѣстныхъ животныхъ крайняго съвера съ обитателями горъ.

Большая часть муравьевъ, живущихъ въ тайгѣ и характерныхъ для нея, не исключительно ей свойственны; они являются общедѣсными формами, ибо встречаются и въ лиственныхъ лѣсахъ, будучи тамъ мѣстами столь-же обычновенны какъ и въ тайгѣ<sup>2</sup>). И это показываетъ, что рѣзкаго различія между тайгой и лиственнымъ лѣсомъ вообще нѣть и отдалять ихъ строго нельзя. Тайга въ своемъ первобытномъ состояніи, т. е. глухой елово-пихтовой лѣсъ, вообще поразительно бѣдна формами сравнительно съ лиственнымъ лѣсомъ; это между прочимъ объясняется тѣмъ, что многія животныя лиственныхъ лѣсовъ при однообразіи жизни въ тайгѣ не находять въ ней необходимыхъ условій для существованія и потому не встречаются тамъ. Слабое освѣщеніе, обилие влаги, бѣдность травянистаго покрова, въ особенности злаковъ и многихъ двудольныхъ растеній, дающихъ пріютъ тлямъ, являются обстоятельствомъ, мѣшающимъ многимъ видамъ муравьевъ поселяться въ тайгѣ. Такъ, напр., *Formica sanguinea* любить мѣста

<sup>1)</sup> См. Отчетъ обѣ экспедиціи И. Ак. Н. на Новую Землю лѣтомъ 1896 г. Г. Якобсонъ, Зоологич. исследованія на Нов. Землѣ въ 1896 г. Науково-исследовательская комиссія Нов. Земли, стр. 219. Зап. И. Ак. Наукъ по Физ.-мат. отд. от. VII, № 1, 1899.

<sup>2)</sup> Тоже нужно сказать и про многихъ другихъ животныхъ тайги; такъ, наприм., такія типичныя формы, какъ глухарь, рабчикъ, черный дятелъ, чижикъ, лѣсная куница, бѣлка, черная гадюка, *Lacerta vivipara* и др., встречаются обычно и въ старыхъ лиственныхъ лѣсахъ.

свѣтлыя, хорошо освѣщенныя солнцемъ; для *Form. exsecta* необходимы злаки и открытыя травянистыя пространства. Типичные-же жители тайги, напротивъ, любятъ влагу и тѣнь, даже очевидно нуждаются въ нихъ. Вотъ почему, поселяясь виѣ тайги, такія формы ея какъ *Formica fusca*, *Myrmica laevinodis* и *ruginodis* всегда занимаютъ своими гнѣздами мѣста сырыя, влажныя, какъ-то луга рѣчныхъ долинъ, окраины и кочки болотъ, солонцы, тѣнистые берега рѣчекъ и озеръ.

Въ живомъ деревѣ жители тайги рѣдко поселяются; они предпочитаютъ сухіе, отмирающіе стволы деревьевъ или пни, въ которыхъ протачиваютъ ходы; также селятся подъ корой, натаскивая сюда землю и растительную труху. Мелкія формы, какъ *Mychothorax acervorum*, живутъ въ толщѣ коры пней и основаній деревьевъ.

При близкомъ соприкосновеніи лиственныхъ лѣсовъ съ тайгой формы послѣдней непосредственно проникали въ нихъ и постепенно распространялись дальше на югъ. Такъ, напр., *Form. rufa*, *F. fusca*, *Myrm. laevinodis* теперь дошли до крайняго предѣла лѣсовъ на югѣ Европ. Россіи (именно до Сарепты); еще южнѣе, послѣ перерыва, образуемаго степью, они вмѣстѣ съ *Camp. herculeanus* и *Mychoth. acervorum* встрѣчаются на Кавказѣ, но какъ проникли туда, или можетъ быть яѣкоторые существовали уже тамъ раньше развитія тайги на сѣверѣ, ибо живутъ тамъ даже въ альпійской области, остается не объясненнымъ.

Изъ полосы лиственныхъ лѣсовъ въ тайгу проникли *Formica exsecta*, *F. sanguinea*, *Camponotus ligniperdus*, *Myrmica rugulosa*. Изъ нихъ кровавый муравей (*Form. sanguinea*), какъ типичный рабовладѣлецъ, нашелъ тамъ для себя очень удобнаго и покладистаго раба въ лицѣ чернобураго лѣсного муравья (*Form. fusca*). *Formica exsecta*, какъ я думаю, произошелъ отъ степнаго *Form. pressilabris*, также постепенно проникавшаго къ С по борамъ и склонамъ рѣчныхъ долинъ въ лѣсную область. На происхожденіе *F. exsecta* именно отъ *pressilabris* намекаетъ во 1) существованіе переходовъ между двумя этими формами; во 2) характеръ

мѣстообитаній *Form. exsecta*, всегда поселяющагося не въ чащѣ лѣса, а на опушкахъ, полянахъ, по просвѣкамъ, среди рѣлколѣсъя или мелколѣсъя, на гаряхъ, порубкахъ, вообще на мѣстахъ съ хорошо развитымъ травянистымъ покровомъ. Такой-же преобладающій характеръ мѣстообитанія и у *F. sanguinea*, *Myrm. rugulosa*, *Las. niger* и *flavus*, тогда какъ *Catop. herculeanus*, *Form. rufa* и *Myrm. ruginodis*, какъ типичные лѣсники, живутъ въ самомъ лѣсу и быстро исчезаютъ послѣ его рубки. Наконецъ характерная особенность *Form. exsecta* образовывать колоніальные муравейники, размѣщенные на большой площади, указываетъ на свойство, присущее главнымъ образомъ формамъ, обитающимъ на открытыхъ пространствахъ, а не жителямъ лѣса; кромѣ того и материалы для гнѣзда у *exsecta* всегда травянистые. *Form. pratensis* проникъ въ тайгу изъ степей черезъ сосновые боры и тамъ образовалъ многочисленныя помѣси съ близко родственнымъ ему *F. rufa*. Затѣмъ всѣ формы, отмѣченныя звѣздочкой въ спискѣ, равно какъ и *Catoponotus saxatilis*, *Mychothorax muscorum* и *Las. flavus*, преимущественно свойственны сосновымъ или лиственничнымъ борамъ. Такимъ образомъ мирмекологическая фауна тайги, взятая въ цѣломъ, представляетъ довольно сложную комбинацію формъ различного происхожденія, различной давности относительно ихъ поселенія въ тайгѣ и разнаго характера своего основного мѣстообитанія. Болѣе подробное разсмотрѣніе ея пока придется оставить за недостаткомъ наблюдений.

### Лиственные лѣса

*Лиственные лѣса*, лежащіе за тайгой и занимающіе главнымъ образомъ центральную часть Евр. Россіи, когда-то были сплошными, а теперь благодаря рубкѣ утратили сплошной характеръ и разбиты на различной величины участки самыхъ неправильныхъ очертаній, окруженныя культурными районами. Везде гдѣ въ нихъ преобладаетъ дубъ, вязъ, кленъ, липа и другіе широколистственные виды деревьевъ, они носятъ типичный лѣсной характеръ, особенно хорошо выраженный на

съверъ въ суглинистой полосѣ, гдѣ чернолѣсъ образуетъ еще и по сие время крупные участки (напр. въ Казанской губ., Вятской, Нижегородской, Тульской, Владимірской и др.); на югѣ-же, тамъ, гдѣ лиственные лѣса граничатъ со степью, они распадаются на мелкіе острова и полосы (на холмахъ, по оврагамъ и балкамъ), тѣсно граничащіе съ пахатными полями и степными участками, изобилуяющіе полянами и широкими опушками, заросшими въ изобилии степными кустарниками и травами (дикая вишня, бобовникъ, ковыль и др.); здѣсь вслѣдствіе постоянного соприкосновенія со степью и борьбы съ ней у нихъ сложился особый обликъ, выработалась особая своеобразная фауна. Такимъ образомъ эти *южные степные лѣса*, образующіе т. наз. лѣсостепь или предстепье, нужно отдѣлять отъ настоящихъ съверныхъ лиственныхъ лѣсовъ, хотя они и связаны съ ними переходами. Далѣе, нѣсколько особый типъ представляютъ *березовые лѣса*, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ имѣющіе преобладающее развитіе, наприм. въ Западной Сибири, на Уралѣ и въ разныхъ мѣстахъ Европ. Россіи. Часто березовые лѣса совмѣстно съ осиной возникаютъ на мѣстѣ елово-пихтоваго лѣса или сосноваго бора. Фауна березовыхъ лѣсовъ полулуѣсная и полустепная, т. е. слѣдовательно смѣшанная, притомъ близкая къ фаунѣ кустарниковъ и опушекъ. Формъ, специально имѣ свойственныхъ, мало, а изъ муравьевъ почти нѣтъ. Наконецъ, на западѣ и юго-западѣ Европ. Россіи лежать широко-лиственные лѣса западно-европейского характера съ букомъ и грабомъ; ихъ фауна, къ сожалѣнію еще мало изслѣдованная, нѣсколько должна отличаться отъ фауны нашихъ дубовыхъ лѣсовъ центра и востока Евр. Россіи; она богаче формами и болѣе близка къ фаунѣ лѣсовъ, развитыхъ въ западной Европѣ и у насъ на Кавказѣ.

Въ лиственныхъ лѣсахъ Евр. Россіи вообще живутъ слѣдующіе муравьи:

Camp. herculeanus	Polyergus rufescens
— <i>ligniperdus</i>	<i>Dolichoderus 4-punctatus</i>
— <i>saxatilis</i>	<i>Tapinoma erraticum</i>
— <i>vagus</i>	<i>Liometopum microcephalum</i>

— <i>marginatus</i> (typ., ka-	<i>Tetramorium caespitum</i>
mensis, ruzskyi)	<i>Leptothorax tuberum</i> (и v. nigri-
— <i>aethiops</i>	ceps)
<i>Lasius fuliginosus</i>	— <i>kirillovi</i>
— <i>flavus</i>	— <i>unifasciatus</i>
— <i>umbratus</i>	— <i>nylanderi</i>
— <i>mixtus</i>	— <i>melnikovi</i>
— <i>niger</i>	<i>Temnothorax recedens</i>
<i>Formica rufa</i>	<i>Mychothorax acervorum</i>
— var. <i>meridionalis</i>	— <i>muscorum</i>
— <i>pratensis</i>	<i>M. musc. v. fagi</i>
— <i>truncicola</i>	<i>Myrmica laevinodis</i>
— <i>exsecta</i>	— <i>ruginodis</i>
— <i>pressilabris</i> v. <i>rufomac-</i>	— <i>scabrinodis</i>
<i>culata</i>	— <i>rugulosa</i>
— <i>fusca</i>	<i>Formicoxenus nitidulus</i>
— <i>rufibarbis</i>	<i>Stenamma westwoodi</i>
— <i>sanguinea</i>	<i>Ponera coarctata</i>
<i>Solenopsis fugax</i> (orientalis)	<i>Myrmecina graminicola</i>

Курсивомъ отмѣчены характерные формы.

Среди перечисленныхъ формъ прежде всего нужно указать на такія, которые отличаются вообще широкимъ распространениемъ и встречаются во всѣхъ лиственныхъ лѣсахъ независимо отъ ихъ географического положенія и биологического характера. Таковы, наприм., *Lasius fuliginosus*, *Form. rufa*, *fusca*, *Myrmica ruginodis*, *laevinodis*, *Las. flavus*, *Las. niger*. Затѣмъ необходимо выдѣлить еще двѣ группы формъ, изъ коихъ однѣ свойственны по преимуществу сѣвернымъ дубовымъ лѣсамъ въ глинистой полосѣ Европ. Россіи, другія принадлежать лѣсамъ южнымъ, степнымъ. Къ первымъ принадлежать: *Camp. marginatus*. var. *kamensis*, *Leptoth. melnikovi*, *Mychoth. acervorum*, *Myrm. ruginodis*, *Form. exsecta*. Вторая группа болѣе многочисленна; къ ней нужно причислить: *Camp. vagus*, *Camp. marginatus* var. *ruzskyi*, *Liomet. microcephalum*, *Dolichod. 4-punctatus*, *Leptoth. unifasciatus*, *Lept. nylanderi*, *Mychoth. muscorum* var. *fagi*, *Lasius umbratus*, *Myrmica scabrinodis*.

Чтобы точнѣе опредѣлить различіе въ мирмекологической фаунѣ нашихъ сѣверныхъ листьевыхъ лѣсовъ отъ южныхъ, приведемъ списки муравьевъ, найденныхъ въ тѣхъ и другихъ.

Такъ въ листьевыхъ лѣсахъ Казанской губ., которые могутъ служить типомъ нашихъ сѣверныхъ лѣсовъ, мною найдены слѣдующія формы:

<i>Camp. marginatus</i> var. <i>ka-</i>	<i>Lasius fuliginosus</i>
<i>mensis</i>	<i>Tetramorium caespitum</i>
— <i>herculeanus</i>	<i>Myrmica laevinodis</i>
<i>Formica rufa</i> i. sp.	— <i>ruginodis</i>
— var. <i>rufo-truncicola</i>	— <i>scabrinodis</i>
— <i>fusca</i>	— <i>lobicornis</i> (на опушкѣ)
— <i>sanguinea</i>	<i>Leptothorax melnikovi</i>
— <i>exsecta</i>	<i>Mycothorax acervorum</i>
<i>Lasius flavus</i>	<i>Formicoxenus nitidulus</i>
— <i>niger</i>	

Типомъ южныхъ степныхъ лѣсовъ могутъ служить т. наз. байрачные лѣса, которые мнѣ пришлось изслѣдоватъ въ 1905 г. на югѣ Саратовской губ.; изъ нихъ самымъ крупнымъ является листственный лѣсъ около Сарепты, известный подъ именемъ „Чепурники“. Тамъ я нашелъ слѣдующихъ муравьевъ:

<i>Camponotus vagus</i>	— <i>flavus</i>
— <i>lateralis</i>	— <i>fuliginosus</i>
— <i>marginatus</i> var. <i>ruzskii</i>	<i>Myrmecocystus caspius</i>
— <i>aethiops</i>	<i>Liometopum microcephalum</i>
<i>Formica rufa</i>	<i>Tapinoma erraticum</i>
— <i>pratensis</i>	<i>Dolichoderus 4-punctatus</i>
— <i>sanguinea</i>	<i>Tetramorium caespitum</i>
— <i>fusca</i>	<i>Strongylognathus christophi</i>
— <i>rufibarbis</i>	<i>Mycothorax muscorum</i> v. <i>fagi</i>
<i>Lasius alienus</i>	<i>Leptoth. unifasciatus</i>
— <i>niger</i>	— <i>nylanderi</i>

— tuberum i. sp.	— scabrinodis
Mymica laevinodis	— lobicornis

Въ мелкихъ-же лѣсахъ, ютащихся по балкамъ и впадинамъ на склонахъ Ергеней, фауна еще болѣе степного характера; тамъ нѣтъ ни *Formica rufa*, ни *fusca*.

Такимъ образомъ мирмекологическая фауна съверныхъ дубовыхъ лѣсовъ глинистой полосы наиболѣе бѣдна и однобразна, но болѣе типична, чѣмъ фауна степныхъ лѣсовъ, отличающихся примѣсью формъ кустарниковыхъ и степныхъ.

Лиственные лѣса въ Уфимской, Самарской и въ южной части Симбирской губ. богаче формами, чѣмъ лѣса Казанской; они приближаются болѣе къ южнымъ лѣсамъ. Въ нихъ сильно выраженъ степной элементъ, который развитъ преимущественно на полянахъ и опушкахъ. Тамъ между прочимъ встречаются: *Camp. saxatilis*, *Form. pressilabris* var. *rufomaculata*, *Lasius umbratus*, *L. alienus*, *Dolichod. quadripunctatus*, *Form. truncicola*; очень обыкновенны *Mymica scabrinodis* и *Tetr. caespitum*. Большая часть изъ послѣднихъ перечисленныхъ формъ собственно хатастерны для кустарниковъ и опушекъ, или для степи, только *Dalichoderus quadripunctatus* принадлежитъ лѣсу и гнѣздится всегда въ деревѣ.

Особенно характерными для лиственныхъ лѣсовъ нужно считать *Camp. marginatus*, *Las. fuliginosus*, *Liometopum microcephalum*, *Dolichod. 4-punctatus*, жизнь которыхъ тѣсно связана съ некоторыми видами деревьевъ, особенно съ дубомъ; они живутъ въ симбиозѣ и съ нимъ и съ тлями, на немъ живущими. Гнѣзда этихъ муравьевъ всегда помѣщаются въ живомъ деревѣ. Характернымъ также для южныхъ лѣсовъ является *Form. rufa* var. *meridionalis*, найденный въ Волынской, Харьковской, Саратовской губ. и въ западной Сибири.

Лиственные лѣса западной и юго-западной Евр. Россіи повидимому не отличаются по своей фаунѣ отъ лѣсовъ западной Европы, продолженіе которыхъ они составляютъ. Въ нихъ между прочимъ встречается характерный для южной Европы *Temnothorax recedens*, найденный также и на Кавказѣ; затѣмъ

— *Myrmecina graminicola* и *Ponera coarctata*, не найденные ни въ центральной, ни въ восточной Евр. Россіи, ни въ Сибири. Въ нихъ весомѣрно обыкновены такія формы, какъ *Camponotus ligniperdus* (typ.) и *vagus*, которыя весьма распространены въ Европѣ, но на востокѣ, въ Сибири, постепенно рѣдѣютъ и исчезаютъ, встрѣчаясь тамъ какъ формы екзотической. *Campr. vagus* на востокѣ Евр. Россіи уже рѣдковатъ и спорадиченъ, на Уралѣ и въ западной Сибири отсутствуетъ и сюда встречается, послѣ большого перерыва, въ Енисейской губ. около Канска. Тоже отчасти нужно сказать и про *Campr. ligniperdus*, который въ Сибири также очевидно имѣеть лишь изолированные участки нахожденія. Возможно, что оба эти муравья двигаются на востокѣ, но встречаются тамъ такихъ опасныхъ соперниковъ какъ *Campr. saxatilis* и *herculeanus*. Первый изъ нихъ, именно *C. saxatilis*, типичный сибирскій житель, энергично двигается на западъ: онъ перешелъ уже Уралъ, занявши его почти весь, и достигъ теперь до Волги.

Про лиственные лѣса западной и юго-западной Евр. Россіи нужно вообще сказать, что они мало изучены. Лично я съ ними не знакомъ. На основаніи данныхъ проф. Н. В. Насонова и В. А. Караваева мирмекологическая фауна ихъ состоитъ изъ слѣдующихъ формъ:

<i>Camponotus vagus</i>	— truncicola
— <i>herculeanus</i>	<i>Lasius fuliginosus</i>
— <i>ligniperdus</i>	— <i>niger</i>
— <i>marginatus</i>	— <i>flavus</i>
<i>Formica rufa</i>	— <i>umbratus</i>
— — var. <i>meridionalis</i>	— <i>mixtus</i>
— <i>pratensis</i>	— <i>brunneus</i>
— <i>exsecta</i>	<i>Tapinoma erraticum</i>
— <i>pressilabris</i>	<i>Dolichod. quadripunctatus</i>
— <i>fusca</i>	<i>Myrmecina graminicola</i>
— <i>rufibarbis</i>	<i>Tetramorium caespitum</i>
— <i>sanguinea</i>	<i>Myrmica laevinodis</i>

— ruginodis	<i>Lepto thorax nylanderi</i>
— rugulosa (ruguloso- scabrinodis)	<i>Temno thorax recedens</i>
<i>Solenopsis fugax</i>	<i>Ponera coarctata</i>
<i>Mycho thorax acervorum</i>	<i>Stenamma westwoodi</i>

Списокъ этотъ конечно неполный. Несомнѣнно найдутся *Mychoth. muscorum* var. *fagi*, нѣкоторыя мирмики и многіе настоящіе лептотораксы, *Liometop. microcephalum*, *Formicoxenus nitidulus*, *Lasius emarginatus* и др.

Отмѣченныя курсивомъ формы особенно характеризуютъ эти лѣса, приближая ихъ какъ я уже говорилъ, къ лѣсамъ западно-европейскимъ и кавказскимъ. Нѣкоторыя изъ нихъ, какъ *C. vagus*, *Dolich. quadripunctatus*, *C. marginatus* встрѣчаются и въ лѣсахъ восточной Россіи, но вообще представляютъ тамъ болѣе рѣдкое явленіе, не образуя замѣтнаго элемента въ ихъ фаунѣ.

Какъ я уже упоминалъ, многіе виды лиственныхъ лѣсовъ двигаются къ С, въ тайгу, вмѣстѣ съ лиственными породами и постепенно укореняются тамъ; таковы—*Form. sanguinea*, *Formica exsecta*, *Lasius fuliginosus*, отчасти *Camponotus vagus*, *C. marginatus*, *Lepto thorax tuberum* и нѣк. др.

Широколиственные лѣса Кавказа прекрасно сохранились, благодаря главн. образомъ малолюдности его и недоступности мѣстности. Мощнымъ поясомъ охватываютъ они склоны горъ, начинаясь почти отъ самыхъ ихъ подножий, спускаются въ ущелья, отчасти занимаютъ и долины. Они образуютъ среднюю зону хребта и состоять изъ довольно разнообразныхъ лиственныхъ породъ (дубъ, букъ, ясень, грабъ и др.), среди которыхъ мѣстами примѣшиваются и хвойные деревья. По мѣрѣ поднятія вверхъ широколиственные лѣса смѣняются постепенно поясомъ сосны и березы. Нужно замѣтить, что эти лѣса на Кавказѣ далеко не вездѣ однородны по своему біологическому характеру и пріурочены къ разнымъ областямъ его, такъ что представляется возможнымъ раздѣлить ихъ на нѣсколько фаций, но въ настоящій моментъ эту задачу еще

нельзя осуществить по недостаточности изслѣдований. Предстоитъ еще много работы для того, чтобы можно было при исполненіи названной задачи избѣгнуть крупныхъ ошибокъ.

Въ общемъ мирмекофауна широколиственныхъ лѣсовъ Кавказа гораздо богаче представителями чѣмъ фауна лиственныхъ лѣсовъ не только Евр. Россіи и Сибири, но по всей вѣроятности также и Туркестана. Насколько это теперь выяснилось, она состоить изъ слѣдующихъ формъ:

<i>Camponotus aethiops</i>	<i>Tetramorium caespitum</i>
— <i>silvaticus</i>	<i>Strongylognathus testaceus</i>
— <i>herculeanus</i>	<i>Myrmecina graminicola</i>
— <i>ligniperdus</i>	<i>Formicoxenus nitidulus</i>
— <i>vagus</i>	<i>Leptothorax corticalis</i>
— <i>marginatus</i>	— <i>exilis</i>
— <i>ruzkii</i>	— <i>affinis</i>
<i>Colobopsis truncata</i>	— <i>unifasciatus</i>
<i>Prenolepis nitens</i>	— <i>anoplogynus</i>
<i>Lasius fuliginosus</i>	— <i>nylanderi</i> (и v. <i>par-</i> <i>vulus</i> )
— <i>flavus</i>	— <i>serviculus</i> v. <i>brauneri</i>
— <i>umbratus</i>	— <i>nigritus</i>
— <i>mixtus</i>	<i>Temnothorax recedens</i>
— <i>niger</i>	<i>Myrmothorax acervorum</i>
— <i>emarginatus</i>	— <i>muscorum</i> (v. <i>fagi</i> )
— <i>brunneus</i>	<i>Myrmica laevinodis</i>
— var. <i>pallidus</i>	— <i>ruginodis</i>
<i>Formica rufa</i>	— <i>scabrinodis</i>
— <i>truncicola</i>	— <i>rugulosa</i>
— <i>exsecta</i> (и v. <i>rubens</i> )	<i>Stenamma westwoodi</i> (и v. <i>hirtula</i> )
— <i>fusca</i>	<i>Dolichod. quadripunctatus</i>
— <i>sanguinea</i>	<i>Tapinoma erraticum</i>
— <i>rufibarbis</i>	<i>Liometop. microcephalum</i>
<i>Polyergus rufescens</i>	<i>Cremastog. scutellaris</i>
<i>Solenopsis fugax</i>	
— <i>orientalis</i>	

<i>Crem. scutel. v. schmidti</i>	— <i>gibbosa v. muschtaidica</i>
<i>Aphaenog. subterranea</i>	
— var. <i>kurdica</i>	<i>Ponera coarctata</i>

Здесь, за немногими исключениеми, представлена въ основныхъ чертахъ почти вся лѣсная палеарктическая фауна, съ замѣтнымъ однако преобладаніемъ европейскихъ формъ. Недостаетъ только нѣкоторыхъ южноевропейскихъ (*Leptoth. melanosecephalus* Em., *Camp. universitatis* For., *Camp. foreli* Em. и др.), а также нѣсколькихъ, найденныхъ пока въ средней Европѣ, каковы лептотораксы (*Leptoth. clypeatus* Maug., *tirolensis* Gredl., *interruptus* Schenck). Специальныхъ же формъ сравнительно мало. Но вѣдь фауна Кавказа и неможеть пока почитаться вполнѣ изслѣдованной. Относительно нѣкоторыхъ изъ приведенныхъ въ списѣ формъ нужно замѣтить, что они рѣдки въ лиственныхъ лѣсахъ Кавказа и не характерны для нихъ. Таковы, наприм., *Form. rufa*, *exsecta*, *Camp. ligniperdus*, *Temnoth. recedens*.

Формами наиболѣе обыкновенными, распространенными широко въ лиственныхъ лѣсахъ Кавказа, являются мирмики, нѣкоторые лептотораксы (напр. *Lept. unifasciatus*, *nylanderi*, *Mychoth. acervorum*, *Tetr. caespitum*, *Las. fuliginosus*, *Las. niger*, *emarginatus*, *flavus*, *Form. rufibarbis*, *F. fusca*, *Taripotoma erraticum* и др.), но специальную окраску лѣсной фаунѣ придаютъ не онѣ, а такие въ большинствѣ случаевъ довольно рѣдкие пока на Кавказѣ муравьи какъ *Stenamta westwoodi* var. *hirtula*, *Mych. mucorum* v. *fagi*, *Prenolepis nitens*, *Colob. truncata*, и сравнительно болѣе частые, какъ *Dolichod. quadripunctatus* (и v. *unicolor*), *Cremast. scutellaris* v. *schmidti*, *Aphaenog. subterranea* и v. *kurdica*, *Aph. gibbosa* и v. *muschtaidica*, *Camp. aethiops*, *C. vagus*, *Ponera coarctata*, *Myrmecina graminicola*. Въ противоположность Европ. Россіи въ лиственныхъ лѣсахъ Кавказа совсѣмъ не найденъ *Form. truncicola* и очень рѣдокъ *Form. rufa* i. sp., свойственный борамъ главнымъ образомъ Закавказья. *Formica pratensis* также болѣе характеренъ въ Европѣ.

теренъ для боровъ Кавказа, хотя попадается также въ смѣшанныхъ лѣсахъ на главномъ хребтѣ, и въ лиственныхъ Дагестана.

Нужно далѣе замѣтить, что лиственные лѣса съвернаго склона главнаго хребта отличаются по своей мирмекофаунѣ отъ лѣсовъ южнаго склона и Закавказья. Въ первыхъ не встрѣчены *Temnoth. recedens*, *Cremastog. scutellaris* v. *schmidti*, *Liometop. microcephalum*, *Camp. marginatus ruzskii*, *Colob. truncata*, *Aphaenog. gibbosa* и *Aph. subterranea* var. *kurdica*, которые имѣются во вторыхъ, причемъ тамъ очень обыкновененъ *Crem. scutellaris* v. *schmidti*, а *Colob. truncata* и *T. recedens* рѣдки.

Лѣса Дагестана также имѣютъ свой особый обликъ; они бѣдаѣ формами муравьевъ въ сравненіи съ другими лѣсами Кавказа. Они имѣютъ характеръ свѣтлыхъ лѣсовъ съ богатымъ травянистымъ покровомъ и приближаются къ южнымъ лѣсамъ Европ. Россіи. Тамъ сравнительно обыкновенны: муравей амазонка (*Polyergus rufescens*), живущій съ своимъ наиболѣе обычнымъ рабомъ *Form. rufibarbis* въ земляныхъ поросшихъ рѣдкой травой холмикахъ на лѣсныхъ лугахъ, *Tetram. caespitum* и его нахлѣбникъ *Strongylogn. testaceus*, *Lasius bicornis affinis*, *Form. sanguinea*, *Las. alienus* и *alieno-niger*, соленоопись, пріурочивающійся обыкновенно къ чужимъ гнѣзdamъ муравьевъ, *Myrmica rugulosa*.

Наконецъ, нужно выдѣлить лиственные лѣса съверо западнаго Кавказа, ибо только тамъ пока найдены *Erenolepis nitens*, и *Strong. christophi* var. *rehbinderi*; кроме того тамъ сравнительно обыкновенны *Colob. truncata*, *Formica cinerea* var. *imitans*, *Campion. lateralis (bicolor)*, *Las. brunneus (brunneocmarginatus)*, и весьма часть *Campionotus vagus*. Лѣса предкавказья (около Пятигорска, Кисловодска и др.), носятъ на себѣ уже сильно выраженный степной характеръ. Эти лѣса можно хорошо наблюдать на горѣ Машукѣ; тамъ среди рѣдкихъ древесныхъ насажденій и богатой травянистой растительности обыкновенны такие виды какъ *Pheidole pallidula*, *Plagiolepis rugulosa*, *Form. rufibarbis*, *Camp. aethiops*, *Tet-*

*ram. caespitum* и var. *splendens*, *Tapinoma erraticum*, *Las. alienus*, *Leptoth. nylanderi*, изъ коихъ *Pheidole pallidula* и *Plag. rugosae* характерны для каменистыхъ предгорий, покрощихъ кустарникомъ и степною растительностью, Дагестана и Закавказья. Лѣса же Колхиды, напротивъ, сохраняютъ дѣственныи, глубоко лѣсной типъ; въ нихъ такие истинно лѣсные жители какъ *Cremastog. scutellaris*, *Colob. truncata*, *Stenamma mestwoodi*, *Camponotus marginatus*, *Leptoth. corticalis*, *L. nylanderi*, *Myrmecina graminicola*, *Dolichoderus 4-punctatus* и вѣв. др. должны имѣть свой настоящій центръ, откуда они распространялись по Кавказу. Тамъ-же между прочимъ найденъ *Leptoth. servicus* var. *brauneri*. Лѣса эти имѣютъ тѣсное отношеніе къ лѣсамъ побережья Чернаго моря на сѣверо-западномъ Кавказѣ. Къ сожалѣнію и тѣ и другіе въ мирмекологическомъ отношеніи очень мало изслѣдованы.

Березовые лѣса по составу своей мирмекофауны отличаются отъ сѣверныхъ лиственныхъ лѣсовъ своимъ смѣшаннымъ населеніемъ, именно нахожденіемъ многихъ степныхъ формъ, которыхъ тамъ являются полноправными гражданами, присутствуя постоянно наравнѣ съ типически лѣсными формами. Специально только имъ свойственныхъ формъ изъ муравьевъ они повидимому не имѣютъ. Особенно развиты березовые лѣса въ Сибири, где они занимаютъ обширныя пространства и образуютъ вполнѣ самостоятельную *substatio*, тѣсно граница со степью. Вотъ почему еще Миддендорфъ называлъ пространства, занятые ими въ Западной Сибири, „березовою степью“<sup>1)</sup>). Затѣмъ они растутъ на Уралѣ, особенно на восточныхъ его склонахъ и въ лѣсостепныхъ районахъ Пермской и Уфимской губерній, далѣе въ Губерлинскихъ горахъ, и на самомъ крайнемъ югѣ достигаютъ Мугоджаръ. Въ Европ. Россіи березовые лѣса не занимаютъ такихъ большихъ пространствъ, какъ въ Сибири, но все-же весьма обыкновенны, встрѣчаясь чаще небольшими участками, рощами или колками на различныхъ

---

<sup>1)</sup> Миддендорфъ, А. Ф. Бараба, 1871 г., стр. 16 и 17.

почвахъ, даже на каменистыхъ и песчаныхъ. Едва ли теперь березовые лѣса на равнинѣ имѣютъ самостоятельный, перво-бытный характеръ; они обыкновенно возникаютъ на мѣстѣ другихъ лѣсовъ, особенно сосновыхъ боровъ, а можетъ-быть даже и прямо на степи. Это отражается и на характерѣ ихъ фауны.

Мирмекофауна березовыхъ лѣсовъ содержитъ въ себѣ виды лѣсные и степные, причемъ первые всегда преобладаютъ. Это особенно яствуетъ изъ слѣдующаго списка муравьевъ, наблюдавшихся мною въ березовыхъ паркахъ Западной Сибири и на восточномъ склонѣ южнаго Урала:

<i>Camponotus saxatilis</i>	<i>L. flavus</i>
<i>C. herculeanus</i>	* <i>L. umbratus</i>
<i>Formica rufa</i>	<i>L. mixtus</i>
* <i>F. truncicola</i> (оч. рѣдокъ) <sup>1)</sup>	<i>L. fuliginosus</i>
* <i>F. pratensis</i>	<i>Myrmica laevinodis</i>
* <i>F. pressilabris</i>	<i>M. ruginodis</i>
<i>F. exsecta</i>	<i>M. kasczenkoi</i>
* <i>F. uralensis</i>	* <i>M. scabrinodis</i>
<i>F. sanguinea</i>	* <i>M. lobicornis</i>
* <i>F. rufibarbis</i>	<i>Tetramorium caespitum</i>
<i>F. fusca</i>	<i>Myrmothorax acervorum</i>
* <i>F. gagates</i>	<i>M. muscorum</i>
<i>Iasius niger</i>	<i>Formicoxenus nitidulus</i>
* <i>L. alienus</i>	<i>Leptothorax tuberum v. nigriceps</i>
<i>L. alieno-niger</i>	

Здесь среди большинства лѣсныхъ формъ мы видимъ и извѣстный процентъ чисто степныхъ муравьевъ (отмѣченныхъ звѣздочкой), изъ коихъ большая часть обыкновенно держится не въ самихъ лѣсахъ непосредственно, а на окраинахъ и

---

<sup>1)</sup> Про *Form. truncicola* нужно замѣтить, что онъ въ чистыхъ березовыхъ лѣсахъ западной Сибири мною не былъ найденъ; я встрѣтилъ его въ смѣшанномъ лиственномъ лѣсу на островѣ озера Таволжана въ Ишимскомъ округѣ.

лужайкахъ, которыхъ тамъ всегда бываетъ много, каковы: *Form. pratensis*, *uralensis*, *gagates*, *pressilabris*, *Myrm. lobicornis*; но имѣются и такие, которые проникаютъ въ самую глубь лѣса и живутъ тамъ бокъ о бокъ съ чисто лѣсными формами, напр. *Myrm. scabrinodis*, *Lasius umbratus*, *Las. alienus*, *Form. rufibarbis*, и это явленіе весьма характерно для березовыхъ лѣсовъ. Интересно указать также на обычное пребываніе въ березовыхъ лѣсахъ: 1) чернаго золотисто-волосаго кампонотуса (*Camp. saxatilis*), являющагося постольку-же лѣснымъ, поскольку и горно-степнымъ жителемъ; во 2) *Leptoceph. tuberum* var. *nigriceps* Mayg., первоначальный характеръ мѣстообитанія котораго пока еще трудно установить; вѣроятнѣй всего, что это форма вустарниковой степи или сосноваго бора. Всегда преобладающій элементъ мирмекологического населенія березовыхъ парковъ Сибири лѣсной, среди котораго очень обыкновенны сѣверные таежные виды, какъ *Camp. herculeanus*, *Mychoth. acervorum* и *Myrmica ruginodis*,—особенность, отличающая эти лѣса отъ южныхъ лиственныхъ лѣсовъ, гдѣ названные муравьи или отсутствуютъ, или очень рѣдки. Различіе это выступаетъ еще рѣзче, если мы будемъ сравнивать тѣ и другіе не только въ отношеніи муравьевъ, но и въ отношеніи другихъ представителей фауны, наприм. птицъ.

Въ березовыхъ рощахъ Симбирской губ., развитыхъ среди ковыльной степи на мѣлу по правому высокому берегу Волги, я нашелъ мирмекофауну менѣе обильную, состоявшую только изъ слѣдующихъ муравьевъ:

<i>Camponotus marginatus</i>	<i>F. sanguinea</i>
<i>Lasius flavus</i>	<i>F. exsecta</i>
<i>L. niger</i>	<i>F. pressilabris</i>
<i>L. alienus</i>	<i>F. pratensis</i>
<i>L. umbratus</i>	<i>Myrmica scabrinodis</i>
<i>Formica fusca</i>	<i>Myr. lobicornis</i>
<i>F. rufibarbis</i>	<i>Tetramorium caespitum</i>
<i>F. rufib. v. subpilosa</i>	

Здесь степные формы уже совершенно преобладали над лѣсными и въ этомъ отношеніи березовые лѣса имѣютъ большое сходство съ сухими сосновыми или лиственничными борами.

Смѣшанный составъ березовой фауны объясняется какъ самимъ характеромъ этихъ лѣсовъ, такъ и ихъ происхожденіемъ. Отличительной особенностью первого является неспособность березы подавлять другіе элементы окружающей ея природы, отчего эти элементы растительности и фауны могутъ легко уживаться съ ней<sup>1)</sup>). Въ березовыхъ лѣсахъ мы всегда наблюдаемъ густой покровъ травянистой растительности, не заглушенной и не стѣсняемой березой. Происходитъ между прочимъ это оттого, что деревья въ березовыхъ лѣсахъ не образуютъ частыхъ, сплошныхъ насажденій, а растутъ рѣдко, разбросанно или группами, чередуясь съ открытыми луговинами и полянами; далѣе въ нихъ нѣтъ вовсе значительной кустарниковой поросли и затѣмъ самый характеръ листвы березовыхъ деревьевъ таковъ, что она не даетъ значительной тѣни. Кроме березы, которая конечно всегда преобладаетъ, въ березовыхъ лѣсахъ еще встрѣчается осина, ива, изрѣдка кленъ или вязъ, черемха, крушина, боярышникъ, кусты шиповника, дикой вишни, малины. Нерѣдки среди нихъ мокрия, болотистая низина, которая береза часто зарастаетъ и которая такъ любятъ *Mutica ruginodis* и *laevinodis*, а также и солончаки (особенно въ Сибири) на полянахъ. Среди березовыхъ лѣсовъ мы встрѣчаемъ массу степныхъ растеній, а вмѣстѣ съ ними и степныхъ животныхъ, среди которыхъ имѣются не только виды общестепенные, но и виды, свойственные черноземной и каменистой степи (напр. *Formica gagates*), но за всѣмъ тѣмъ, какъ я уже упоминалъ, и лѣсной элементъ выраженъ рѣзко и преобладаетъ. Впрочемъ здѣсь играетъ значеніе и географическое положеніе: именно въ березовыхъ лѣсахъ болѣе

<sup>1)</sup> Въ дубовыхъ лѣсахъ происходитъ совершенно обратное: они, напротивъ, подавляютъ степную природу, почему въ нихъ степные растенія и животные могутъ селиться только на опушкахъ и полянахъ, свободныхъ отъ насажденій дуба.

съверныхъ мѣстностей лѣсной элементъ ясно преобладаетъ и господствуетъ, а степной подавленъ, тогда какъ въ березовыхъ лѣсахъ, растущихъ на югѣ, какъ разъ наоборотъ. Такъ что несомнѣнно, что два указанные элемента, лѣсной и степной, въ березовыхъ лѣсахъ борются между собой и климатъ вѣтаки здѣсь играетъ большую роль. Но существуютъ формы, которыхъ сопровождаются березовые лѣса всюду независимо отъ климата или характера ихъ травянистаго покрова; таковы темнобурый и желтый лазіусы, *Formica rufibarbis*, *Formica exsecta*. Онѣ встрѣчаются въ этихъ лѣсахъ какъ на съверѣ, такъ и на югѣ, равно какъ и въ горахъ, въ ихъ верхнемъ поясе, на высотѣ, до какой только можетъ береза достигнуть тамъ. Очевидно, между ними и березой есть что-то родственное. Красный тонкоголовый муравей (*Form. exsecta*), кажется, въ особенности находить весьма подходящія условія жизни для себя среди березовыхъ лѣсовъ; ихъ свѣтлый видъ, широкій просторъ, масса воздуха и свѣта, обильная травянистая поросль — все это чрезвычайно нравится ему, любящему далеко раскидывать свои колоніи; это обычный спутникъ березы, можетъ быть даже коренной житель березовыхъ лѣсовъ.

Кромѣ того смѣшанное населеніе березовыхъ лѣсовъ объясняется еще и тѣмъ, что эти такъ обильно раскинутыя березовыя рощи на равнинахъ Европ. Россіи и Сибири вторичнаго происхожденія, что онѣ возникли въ большинствѣ случаевъ на мѣстѣ бывшихъ сосновыхъ боровъ. Эти послѣдніе въ прежнія времена, очевидно, имѣли въ Россіи огромное распространеніе, но быстро исчезли подъ вліяніемъ рубокъ и особенно пожаровъ, которымъ они такъ часто подвержены и отъ которыхъ никакой другой лѣсъ не страдаетъ въ такой степени какъ они. Возобновляются-же сосновые боры крайне слабо, медленно, или даже вовсе не возобновляются. На мѣстѣ ихъ обыкновенно поселяются другія лѣсныя породы деревьевъ, главнымъ-же образомъ береза<sup>1)</sup>). Но тогда какъ большая часть

---

<sup>1)</sup> Проф. А. Я. Гордагинъ, изучивъ березовые лѣса въ Западной Сибири, пришелъ къ тому заключенію, что они тамъ представляютъ втори-

другихъ древесныхъ породъ, напримѣръ, дубъ и др., совер-  
шенно подавляютъ и даже уничтожаютъ боровую фауну, бе-  
резовые лѣса даютъ многимъ ея представителямъ пріютъ и воз-  
можность продолжать свое существование. Такимъ образомъ пре-  
облащающій элементъ населія березовыхъ лѣсовъ и состоитъ изъ  
прежде бывшихъ представителей боровой фауны, что вполнѣ  
ясно вытекаетъ изъ сопоставленія списковъ формъ березовыхъ  
лѣсовъ и сосновыхъ боровъ. Но не нужно думать, что березовые  
лѣса возникаютъ только послѣ боровъ; они выростаютъ и хоро-  
шо развиваются также на мѣстѣ елово-пихтовой тайги и послѣ  
рубки широколиственныхъ лѣсовъ; тогда они уже заимствуютъ  
часть своей фауны и изъ этихъ послѣднихъ; такъ наприм.  
*Catopon. marginatus* въ березовыхъ лѣсахъ есть несомнѣнно  
выходецъ лиственіаго (дубоваго) лѣса. Наконецъ не лишена  
вѣроятія и возможность возникновенія или самостоятельнаго  
поселенія березовыхъ рощъ на степи и тогда конечно такие наи-  
болѣе стойкіе ея элементы, какъ *Form. rufibarbis*, *F. pratensis*, *Las. alienus*, *Myrmica lobicornis* должны удержаться  
въ березовыхъ лѣсахъ. Другія-же степные формы, однако, почему-  
то не уживаются въ березовыхъ лѣсахъ; туда проникаютъ  
или тамъ остаются только преимущественно такія, которые  
свойственны луговымъ степямъ и вообще широко распростра-  
нены; формы-же типичной ковыльной или каменистой степи,  
или кустарниковой, которая избѣгаютъ густого, сплошного  
травянистаго покрова, въ березовыхъ лѣсахъ не поселяются  
(наприм. *Leptothorax nassonovi*, *Leptoth. serviculus*, *Myrmecocystus caspius*, *Messor structor* и др.).

Вполнѣ самостоятельную, первично растущую ассоціацію  
березовые лѣса образуютъ въ верхнемъ поясѣ горъ, на гравицѣ  
лѣсной растительности; но тамъ они отличаются поразительно-

---

чную форму растительности, которая развилась изъ сосновыхъ боровъ подъ  
влияніемъ человѣка, уничтожавшаго боры. Но возможно, по его мнѣнію, и  
первично существованіе березы тамъ, но только въ известныхъ мѣстахъ  
и на опредѣленныхъ почвахъ. (См. А. Гордягинъ, Матеріалы для поз-  
нанія почвъ и растительности Западной Сибири. Тр. Казанск. Общ. Ест., т.  
XXXIV, вып. 3. 1901 г.).

бѣдной фауной вообще и мирмекофауной въ частности. Такъ, на Кавказѣ, на главномъ хребтѣ и въ Дагестанѣ, я нашелъ въ высокорастущихъ, граничившихъ уже съ альпійскими лугами, березовыхъ лѣсахъ только *Formica fusca*, *F. rufibarbis*, *Myrm. ruginodis*, *Form. exsecta*, *F. pressilabris*, *Mychoth. acervorum*, *Lasius flavus* и *niger*, причемъ *Form. pressilabris* жилъ не въ самыхъ лѣсахъ, а по ихъ окраинамъ.

### Сосновые боры

*Сосновые боры* представляютъ весьма своеобразный типъ, рѣзко отличающійся какъ отъ елово-пихтовой тайги, такъ и отъ широко-лиственныхъ лѣсовъ. Несмотря на сильное ихъ порѣдѣніе за послѣднее время, они все еще въ Россіи довольно широко распространены, въ особенности на сѣверѣ и въ центрѣ, и въ общемъ покрываютъ значительную площадь, хотя болѣшихъ, сплошныхъ насажденій и не образуютъ. Въ полосѣ тайги сосновые боры перемѣшаны съ елово-пихтовыми лѣсами, а южнѣе ея образуютъ крупные участки на песчаныхъ почвахъ. Таковы бора въ Казанской губ., Нижегородской, Самарской, Симбирской, Пензенской, Саратовской, Рязанской, Воронежской, Калужской, Орловской, въ юго-западной Россіи и пр. Наконецъ, сосна еще растетъ на скалахъ и утесахъ (Ураль, Жигули, Св. Горы въ Харьковск. губ., Фиппляндія).

Фауна нашихъ сосновыхъ боровъ чрезвычайно оригинальна и интересна, но къ сожалѣнію досихъ поръ не была предметомъ детальныхъ изслѣдований зоологовъ. М. Н. Богдановъ<sup>1)</sup>, кажется, былъ однимъ изъ первыхъ, обратившихъ на нее серьезное вниманіе. Онъ изучалъ боры Поволжья и далъ намъ списокъ звѣрей и птицъ, живущихъ въ нихъ. Но онъ не отѣнилъ характерной особенности боровой фауны, равно какъ и не сдѣлалъ попытки проанализировать ее, вы-

---

<sup>1)</sup> Птицы и звѣри черноземной полосы Поволжья и долины средней и нижней Волги. Тр. Казанск. Общ. Ест., т. 1. 1871 г.

яснить происхождение слагающихъ ее формъ. Разбирая группировку птицъ и звѣрей вообще въ лѣсахъ Новолѣзья, онъ останавливается также и на сосновыхъ борахъ. „Типичныхъ животныхъ бора“, говорить онъ (стр. 189), „очень немного“; далѣе, что „фауна боровъ является самой бѣдной и по числу видовъ и по количеству особой, и чѣмъ болѣе примѣшано къ соснѣ лиственныхъ деревьевъ, тѣмъ богаче и разнообразнѣй дѣлается боровая фауна,—послѣднее конечно совершенно справедливо. Типичными формами бора Богдановъ считаетъ: беркута (*Aquila nobilis*), сѣрую сову (*Syrnium uralense*), чернаго и бѣлоспиннаго дятла, дрозда-дерябу, московку (*Parus ater*), хохлатую синицу и гаичку (*Farus palustris*), чижъ, поползнѧ, сойку, глухаря, бѣлку и кувицу, а для смѣшанныхъ и послѣтретичныхъ боровъ еще и рябчика. Однако нужно замѣтить, какъ это дѣлается отчасти и самъ Богдановъ, что всѣ эти виды вттрѣчаются и въ старомъ чернолѣсси, а также и въ елово-пихтовой тайгѣ. Слѣдовательно, можно-ли ихъ всѣхъ считать типичными для сосноваго бора. Очевидно, что нельзя, тѣмъ болѣе, что нѣкоторыя изъ нихъ, отличаются довольно обширнымъ распространенiemъ и повидимому никакой опредѣленной связи съ сосновыми борами не имѣютъ (наприм. беркутъ, чижъ, куница); а бѣлоспинный дятель даже избѣгаеть ихъ.

Изъ птицъ, по моимъ наблюденіямъ, обычно встрѣчающимися въ сосновыхъ борахъ нужно назвать слѣдующихъ: желну (*Picus martius*), большого пестраго дятла (*Dendroc. major*), сѣрую сову (*Syrnium uralense*), глухаря, щеврицу (*Anthus arboreus*), пѣвчаго дрозда (*Turdus musicus*), сойку (*Garrulus glandarius*), хохлатую синицу (*Lophophanes cristatus*), *Parus ater*, *Poecile borealis*, козодоя (*Caprimulgus europaeus*) и и. др. Но большинство изъ нихъ едва-ли могутъ считаться безусловно типичными для боровъ. Наиболѣе характерными для бора я считаю не ихъ, а дрозда-дерябу (*Turdus viscivorus*) и лѣсного жаворонка (*Alauda arborea*),—птицъ вообще весьма рѣдкихъ и наиболѣе свойственныхъ горнымъ областямъ, гдѣ онъ живутъ исключительно въ бо-

рахъ. Хотя онъ несомнѣнно встрѣчаются и въ борахъ на равнинѣ, напр. въ восточной Россіи, но по рѣдкости ихъ нахожденія тамъ усъзывали до сихъ поръ отъ многихъ изслѣдователей. Весьма вѣроятно, что среди птицъ встрѣчаются еще и другіе виды, которые должны быть причислены къ первобытнымъ обитателямъ бора, но ихъ трудно теперь указать какъ вслѣдствіе большой подвижности птицъ и легкой ихъ разселяемости, такъ и потому еще, что сами боры въ настоящее время подверглись значительнымъ измѣненіямъ, сильно разрѣжены и перемѣшаны съ еловыми и лиственными лѣсами, а мѣстами и совсѣмъ уничтожены. Среди насѣкомыхъ есть многіе характерные виды для боровъ, наприм. изъ бабочекъ: сосновая пяденица (*Fidonia piniaria*); изъ жуковъ между прочимъ, какъ мнѣ это любезно сообщилъ А. П. Семеновъ-Тянъ-Шанскій (in litt.), — *Spondylis buprestoides* (типичный спутникъ сосны) и *Cicindela silvatica* L. (для сухихъ боровъ). Муравьи также имѣютъ характерныхъ обитателей боровъ какъ, наприм., *Formica cinerea*, особая разновидности желтаго и темнобураго лазіусовъ и н. др. Далѣе нужно указать еще на присутствіе въ сухихъ сосновыхъ борахъ чѣкоторыхъ степныхъ и болѣе южныхъ формъ, наприм., изъ птицъ полевого жаворонка (*Alauda arvensis*), удода (*Upupa epops*), балобана (*Hierofalco sacer*), пустельгу и кобчикъ (*Erythr. vespertinus*) и иѣк. др., которая держится главнымъ образомъ на гаряхъ и порубахъ; изъ звѣрей — барсука, изъ гадовъ — зеленую ящерицу. Такимъ образомъ фауна позвоночныхъ животныхъ сосновыхъ боровъ, содержа въ себѣ очень мало типичныхъ формъ, отличается смѣшаннымъ характеромъ и состоитъ главнымъ образомъ изъ видовъ также свойственныхъ тайгѣ, лиственнымъ лѣсамъ и степи.

Этотъ смѣшанный характеръ боровой фауны еще рѣзче выраженъ въ мірѣ насѣкомыхъ, въ частности у муравьевъ, къ разсмотрѣнію которыхъ мы теперь и переходимъ.

Мирмекологическая фауна боровъ вообще состоитъ изъ слѣдующихъ формъ:

- |   |   |
|---|---|
| ! <i>Camponotus herculeanus</i>           | ** <i>L. umbratus</i>                     |
| ○ <i>C. ligniperdus</i>                   | ○ <i>L. mixtus</i>                        |
| ○ <i>C. vagus</i>                         | ** <i>L. bicornis</i> v. <i>affinis</i>   |
| <i>C. saxatilis</i> (Сибирь)              | ○ <i>Tapinoma erraticum</i>               |
| ○ <i>C. aethiops</i>                      | ** <i>Myrmecocystus aenescens</i>         |
| * <i>Formica cinerea</i> (i. sp.)         | + <i>Myrmica rubida</i>                   |
| * <i>F. cinerea</i> var. <i>imitans</i>   | + <i>M. sulcinodis</i>                    |
| ** <i>F. rufibarbis</i> (i. sp.)          | + <i>M. sulcin.</i> v. <i>fuscipes</i>    |
| ?* <i>F. rufib.</i> var. <i>subpilosa</i> | ** <i>M. lobicornis</i>                   |
| ! <i>F. fusca</i>                         | ** <i>M. scabrinodis</i>                  |
| ○ <i>F. sanguinea</i>                     | ! <i>M. laevinodis</i>                    |
| <i>F. sanguin.</i> v. <i>mollessonae</i>  | ! <i>M. ruginodis</i>                     |
| ! <i>F. rufa</i> (i. sp.)                 | ! <i>M. kasczenkoi</i>                    |
| * <i>F. pratensis</i>                     | <i>M. rugulosa</i>                        |
| ** <i>F. truncicola</i>                   | ! <i>Myrtothorax acervorum</i>            |
| ○ <i>F. exsecta</i>                       | ! <i>M. acervor.</i> v. <i>nigrescens</i> |
| ** <i>F. pressilabris</i>                 | * <i>M. flavesiensis</i>                  |
| ** <i>Polyergus rufescens</i>             | * <i>M. muscorum</i>                      |
| <i>Lasius flavus</i> v. <i>odoratus</i>   | <i>M. musc.</i> var. <i>scamni</i>        |
| * <i>L. flavus</i> v. <i>flavoides</i>    | * <i>Tomognathus sublaevis</i>            |
| * <i>L. fl.</i> v. <i>fuscoideis</i>      | ** <i>Leptothorax tuberum</i> i. sp.      |
| + <i>L. myops</i>                         | ○ <i>Leptothorax corticalis</i>           |
| <i>L. niger</i>                           | ○** <i>Lept. unifasciatus</i>             |
| * <i>L. niger</i> v. <i>pinetorum</i>     | ○ <i>Lept. nylanderi</i>                  |
| (n. nov.) <sup>1)</sup>                   | ○ <i>Lept. nyland.</i> v. <i>parvulus</i> |
| ** <i>L. alienus</i>                      | ** <i>Lept. servicus</i>                  |
| * <i>L. carniolicus</i>                   | * <i>Lept. volgensis</i>                  |

<sup>1)</sup> *Lasius niger* var. *pinetorum* (нов. var.) ♀. Отличается от типичной формы помимо характера места обитания, еще меньшими размерами тела (ср. дл. 3 мм) и более низкой, более мелкой, слаженной скульптурой поверхности хитина, почему эта поверхность имѣть более явственный блескъ. Окраина тѣла всегда несколько темнѣе чѣмъ у типа. Гнѣздится въ песчаныхъ холмикахъ въ сосновыхъ борахъ, часто совместно съ желтымъ лазиусомъ. Жизнь ведетъ болѣе подземную, чѣмъ типичный *Las. niger*. Самцы и самки особенныхъ отличий не представляютъ, кроме нѣсколько меньшихъ размѣровъ.

<i>Formicoxenus nitidulus</i>	** <i>Solenopsis fugax</i>
** <i>Tetramorium caespitum</i>	** <i>Sol. orientalis</i>
** <i>Strongylognathus chrichtophi</i>	** <i>Messor structor v. clivorum</i>

Изъ приведенныхъ въ этомъ спискѣ формъ тѣ, которые напечатаны курсивомъ, являются наиболѣе обыкновенными и начаще встрѣчающимися въ борахъ. Формы же, которыхъ нужно считать характерными для боровъ, отмѣчены звѣздочкой; ихъ, какъ видно, сравнительно очень не много. Изъ нихъ одни весьма распространены и обыкновенны въ борахъ, а именно *Form. cinerea* (типичная и *v. imitans*), желтый и бурый лазіусы, *Myrm. scabrinodis*, *Form. rufibarbis v. subpilosa*. Другія сравнительно рѣдки, напр. *Mych. muscorum*. Наконецъ третьи отличаются спорадическимъ распространениемъ, являясь формами нынѣ видимо древними, реликтовыми; таковы *Tomogn. sublaevis*, *Lasius carniolicus*, *Leptoth. volgensis*. Изъ нихъ первый видъ, живущій въ гнѣздахъ *Mych. acervorum* и *muscorum*, найденъ въ Даніи, Швеціи, Финляндіи и въ двухъ пунктахъ южнаго Урала. *Las. carniolicus*, захватывая своимъ общимъ распространениемъ почти всю Европу, западную Сибирь и Кавказъ, извѣстенъ здѣсь всего изъ 6 мѣстонахожденій, довольно удаленныхъ другъ отъ друга и въ двухъ мѣстахъ (именно въ Уфимской губ. и въ Закавказье) онъ найденъ не въ борахъ, а въ одномъ случаѣ на каменистомъ степномъ склонѣ (Уфимск. губ.), а въ другомъ на пескахъ, поросшихъ тамариксомъ и *Calligonum* (ок. Аракса въ Закавказье), и потому можетъ быть эти именно мѣстонахожденія скорѣе указываютъ на его первичное, первобытное мѣстообитаніе. Что-же касается *Leptoth. nassonovi volgensis*, то онъ найденъ только пока въ одномъ пункте, именно въ Жегулахъ, на известковыхъ утесахъ, поросшихъ соснякомъ; ни въ окрестныхъ степяхъ, ни въ борахъ на пескахъ онъ, несмотря на мои тщательные поиски, не найденъ, такъ что такая исключительная рѣдкость его мѣстонахожденія едва-ли зависитъ отъ недостаточности изслѣдований. Сюда же можно причислить и

*Leptothorax flavescens*, хотя онъ найденъ пока только среди насаждений лиственницы около хребта Уй-Ташъ въ южномъ Уралѣ, но несомнѣнно долженъ встрѣчаться тамъ-же и въ сосновыхъ борахъ.

Остальная форма списка представляютъ пеструю смѣсь и въ стационарномъ отношеніи могутъ быть раздѣлены на слѣдующія группы: 1) *таежныя* формы, отмѣченныя знакомъ (!); 2) формы, свойственная по преимуществу *лиственнымъ лѣсамъ*, отмѣченныя кружкомъ (○); 3) формы *степнныя*, изъ коихъ многія широко распространены и далеко заходятъ на сѣверъ, поселяясь здѣсь изолированно на специальныхъ мѣстахъ обитанія (пески, южные склоны, утесы, скалы) и представляя здѣсь характеръ экзотического распределенія; все они отмѣчены двумя звѣздочками (\*\*). Далѣе четвертую группу представляютъ формы *горныя*, именно тѣ, около которыхъ поставленъ знакъ (+). Кромѣ того изъ видовъ 2-й и 3-ей группъ, т. е. свойственныхъ на равнинѣ Европ. Россіи лѣсамъ или степямъ, необходимо остановить вниманіе на такихъ, которые также живутъ и въ высокой области горъ, среди нагорныхъ степей и въ альпійскихъ лугахъ; это тѣ именно виды, которые я называю *горно-лѣсными* и *горно-степными*. Къ первымъ принадлежать: *Form. fusca*, *L. flavus (flavoides)*, *Myrm. ruginodis*, *Myrcoth. muscorum* и *acervorum*, ко вторымъ относятся: *Las. alienus*, *Form. rufibarbis*, *Myrm. lobicornis*, *Myrm. scabrinodis*, *Tetram. caespitum*. Наконецъ, нужно отмѣтить и такихъ муравьевъ, которые хотя и помѣщены мною для полноты въ данный списокъ, но собственно борамъ не свойственны, это именно *Myrmecos. aenescens* и *Messor structor v. clivorum*; они встрѣчаются и притомъ только въ предѣлахъ степной области по опушкамъ (окраинамъ) сосновыхъ боровъ и на песчаныхъ, поросшихъ рѣдкими соснами склонахъ долины Волги (Самарск. губ.).

По составу мирмекологического населенія, группировкѣ формъ и общему биологическому характеру сосновые боры

распадаются на три типа: а) сырые мшистые боры; б) сухие лишайниковые боры; в) боры, растущие на скалах и утесах.

*Мшистые боры*, представляющие первобытный типъ, растутъ въ сырыхъ низменныхъ мѣстахъ и имѣютъ густой покровъ изъ лиственныхъ мховъ, почва подъ которыми остается болѣе или менѣе влажной; вслѣдствіе скученности сосенъ и значительной высоты ихъ въ такихъ борахъ всегда господствуетъ тѣнь, травянистый же покровъ развитъ чрезвычайно слабо. Такіе боры населены главнымъ образомъ желтымъ и чернобурымъ лазіусами (*Lasius flavus*, v. *fuscooides* и v. *flavoides*, *Las. niger* var. *pinetorum*), живущими въ земляныхъ холмикахъ, затянутыхъ сверху мхомъ. Лазіусы эти чрезвычайно характерны для мшистыхъ боровъ. Иногда они живутъ вмѣстѣ въ одномъ и томъ-же холмикѣ, образуя сосѣдское сожительство или можетъ-быть даже парабіозъ; вмѣстѣ съ ними живутъ и тли въ качествѣ сожителей, равно какъ и жучекъ *Claviger*. Зимой они умѣютъ поддерживать высокую температуру въ своихъ гнѣздахъ и потому не засыпаютъ и имѣютъ даже личинокъ въ различныхъ возрастахъ (какъ это мнѣ пришлось наблюдать въ концѣ ноября и началѣ декабря, въ Казанской губ.). Кроме указанныхъ лазіусовъ въ такихъ борахъ попадаются еще: *Las. flavus* var. *odoratus*, а изъ другихъ муравьевъ—*Camponotus herculeanus*, *Formica rufa*, *F. fusca*, *Myrmecoth. acervorum*, рѣже *muscorum*, *Myrm. laevinodis* и *ruginodis*, еще рѣже *Myrm. scabrinodis* и *lobicornis* и то послѣднія двѣ въ такихъ обыкновенно мѣстахъ, гдѣ мшистый боръ начинаетъ покрываться лишайниками и переходить въ сухой. Мшистые боры большихъ участковъ не образуютъ, а являются вкрапленными среди сухихъ боровъ или елово-пихтовой тайги; часто они перемѣжаются съ моховыми болотами или граничатъ непосредственно съ ними, причемъ на окраинахъ такихъ болотъ въ кочкахъ нерѣдко поселяются *Myrmica ruginodis*, *M. laevinodis*, *Form. fusca*.

*Сухие боры* растутъ на дюнахъ, вообще возвышенныхъ мѣстахъ. Почва ихъ песчаная, покрытая опавшей хвоей, лишайниками и рѣдкой травянистой растительностью, среди

которой не мало встречается типичныхъ степныхъ формъ, каковы наприм. боярдская трава (*Thymus serpillum*. *Th. marschallianus*), *Festuca sulcata*, гвоздика (*Dianthus polymorphus*), *Centhaurea marschalliana*, *Anemone patens* и др., также кустарники *Cytisus biflorus* и *Genista tinctoria*, равно какъ и растенія, свойственныя пескамъ, напр. *Calluna vulgaris*, бѣлая гвоздика (*Dianthus arenarius*). Но всѣ растенія эти, равно какъ и лишайники, не образуютъ сплошного покрова, а растутъ разбросанно среди голой и сухой песчаной почвы, частью сыпучей и рыхлой. Сосны въ такихъ борахъ стоять рѣдко и вслѣдствіе большого простора сильнѣе разростаются въ ширину, чѣмъ въ вышину, раздвигая далеко въ стороны толстые корявые сучья и широко распуская вершину. Тѣни въ этихъ борахъ мало; въ лѣтній зной бываетъ сухо, жарко и душно.

Къ сухимъ барамъ примыкаютъ также обширныя гары и порубки, отличающіяся только тѣмъ, что на нихъ растутъ кромѣ еще болѣе рѣдкихъ молодыхъ сосенъ, еще береза и осина, между которыми остаются широкіе открытые промежутки съ полусгнившими пнями и съ болѣе богатой травянистой и кустарниковой растительностью.

Сухие боры съ ихъ гарями и порубками имѣютъ чрезвычайно интересную мирекологическую фауну. Почва здѣсь на болѣе или менѣе открытыхъ пространствахъ обыкновенно сильно минирована ходами и норками *Lasius alienus*, *Formica cinerea*, *imitans*, *rufibarbis* (или *v. subpilosa*); муравьи эти то и дѣло попадаются на глаза снующими среди кустиковъ бѣлой гвоздики (*Dianthus arenarius*), астрагала (*Astragalus arenarius*), *Anemone patens*, вереска и келеріи (*Koeleria glauca*), обычными спутниками которыхъ они являются. Тутъ-же по сосѣдству среди разныхъ лишайниковъ, дерновинъ *Festuca*, кустовъ *Cytisus* встречаются изящныя насыпныя гнѣздашки *Form. pressilabris*, маленький конусъ которыхъ сложенъ часто изъ тѣхъ-же лишайниковъ и проросъ пахучимъ *Thymus serpillum*. Въ пняхъ, находящихся въ различныхъ стадіяхъ разрушенія, живутъ тихо ползающіе черные кампе-

нотусы (*Campon. herculeanus, vagus, saxatilis, aethiops*), *Form. fusca*, а также вмѣстѣ съ нею и *Form. sanguinea*; подъ ко-  
рой пней ютятся лептотораксы (*Mychoth. acervorum, tizocor-*  
*rum, Lept. unifasciatus, tuberum* и др.), или мирмики. Тутъ-  
же попадаются крупные, насыпные постройки *Form. rufa*,  
*F. pratensis* и *F. truncicola*, причемъ у двухъ послѣднихъ  
онѣ помѣщаются на открытыхъ, солнечныхъ мѣстахъ среди  
гари или порубки, а у *F. rufa* на окраинѣ, подъ тѣнью  
деревьевъ. Далѣе, здѣсь весьма часты земляные холмики,  
обыкновенно поросшіе растительностью, обитаемые *Tetra-*  
*tom. caespitum*,—однимъ или совмѣстно съ *Strongylog-*  
*nathus christophi*,—*Lasius carniolicus, Las. umbratus, Las.*  
*mixtus, Form. rufibarbis, Myrm. scabrinodis*, причемъ не-  
рѣдко бываетъ одинъ и тотъ-же холмикъ занять различ-  
ными видами, живущими отдельными муравейниками, но  
въ непосредственномъ сосѣдствѣ другъ съ другомъ. Здѣсь-  
же изрѣдка можно встрѣтить и муравья-амазонку (*Polyergus*  
*rufescens*), поселившагося или въ пнѣ, если его рабочий яв-  
ляется *Form. fusca*, или въ норахъ вмѣстѣ съ *Form. rufi-*  
*barbis* или рѣже *Form. cinerea*. Изъ мирмикъ, кромѣ уже упо-  
мянутой *M. scabrinodis*, здѣсь обычны *M. lobicornis*, предпо-  
чтавшая жить въ норахъ, прикрывшись камнемъ или ку-  
скомъ коры, затѣмъ *Myrm. rugulosa, M. laevinodis* и *rugin-*  
*odis*, причемъ двѣ послѣднія наичаше выбираютъ своимъ  
мѣстожительствомъ старые пни, хотя могутъ жить и прямо  
въ землѣ подъ дерновинками лишайниковъ, мха, или кучками  
листьевъ, или даже подъ сухимъ пометомъ скота. Въ болѣе  
рѣдкихъ случаяхъ тутъ-же могутъ быть встрѣчены *Myrm.*  
*rubra* и *sulcinodis*. Такимъ образомъ мы здѣсь какъ вигдѣ  
въ другомъ мѣстѣ наблюдаемъ удивительную пестроту формъ,  
встрѣчая на небольшомъ пространствѣ живущими близко другъ  
отъ друга съ одной стороны муравьевъ, свойственныхъ тайгѣ  
и лиственному лѣсу, а съ другой—чисто степныхъ, горно-  
степныхъ и горныхъ.

Сосна на скалахъ и утесахъ образуетъ островки въ го-  
рахъ Сибири, на Кавказѣ, въ Крыму, въ Финляндіи, на Ура-

ль, а также и на возвышенныхъ пунктахъ среди равнинъ Европ. Россіи и Сибири (Жегули, Св. Горы въ Харьковск. губ., сопки въ Акмолинской обл.). Островки эти, часто окруженные сплошными лиственными лѣсами или степью, всегда сохраняютъ свой самостоятельный габитусъ и имѣютъ свою особую фауну, состоящую изъ формъ или специальныхъ, какъ *Leptothen. flavescens* (Уралъ), *Leptothen. nassonovi volgensis* (на Жегулевскихъ горахъ), *Tomognathus sublaevis* (на Уралѣ и въ Финляндіи), или же горно-лѣсныхъ (*Mychoth. acervorum*, *Mych. muscorum*, *Myrm. ruginodis*), горно-степныхъ (*Tetram. caespitum*, *Form. rufibarbis*, *Form. gagates*, *Camp. saxatilis*, *Myrm. lobicornis*, *Las. alienus*, *Las. bicornis* var. *affinis*), степныхъ (*Leptothen. serviculus*), и горныхъ (*Myrm. sulcinodis*, *Myrm. rubida*, *Lasius myops*). Fauna такихъ сосновыхъ боровъ почти тождественна съ фауной лиственичныхъ боровъ, какъ это хорошо можно было наблюдать на Уралѣ.

Такимъ образомъ по характеру своей мирмекологической фауны сосновые боры на скалахъ и утесахъ сходны съ сухими борами на пескахъ, но отличаются: 1) вообще меньшимъ количествомъ формъ и отсутствиемъ многихъ видовъ (наприм. *Polyergus rufescens*, *Form. truncicola*, *Camp. vagus*), свойственныхъ сухимъ борамъ, и среди нихъ даже такихъ, которые (какъ *Form. cinerea*) должны считаться характерными для послѣднихъ; — 2) присутствиемъ нѣкоторыхъ характерныхъ формъ, пока въ равнинныхъ борахъ не найденныхъ, и затѣмъ очевиднымъ преобладаніемъ горно-степныхъ формъ, хорошо уживающихся на каменистомъ субстратѣ, поселяющихся въ щеляхъ скалъ, подъ дерновинками травянистыхъ растеній и мха, въ землѣ при основаніи сосенъ и подъ ихъ корой. Совершенно такой-же характеръ сохраняетъ и мирмекофауна лиственичныхъ боровъ, но только лиственица какъ болѣе распространенная чѣмъ сосна въ горахъ Урала и Алтая имѣть и болѣе богатую въ количественномъ отношеніи фауну; стационарный-же характеръ ея и сосны одинъ и тотъ-же.

Смѣшанный сосновый боръ ничего характерного въ отношеніи фауны не представляетъ. Она отличается или бѣд-

ностю и однообразиемъ, если боръ перемѣшанъ съ тайгой, т. е. съ пихтой и елью, или напротивъ имѣть болѣе разнохарактерный составъ, когда среди сосны растетъ много лиственныхъ деревьевъ. Въ первомъ случаѣ въ бору отсутствуетъ большая часть формъ, свойственныхъ сухимъ барамъ; но лазіусы обыкновенно всегда имѣются въ своихъ холмикахъ. Во второмъ—примѣшиваются формы, характерные для лиственныхъ лѣсовъ; зато лазіусы становятся рѣдкими, и исчезаютъ многіе типичные жители боровъ, напр. *Formica cinerea*, *F. rufib.* v. *subpilosa*.

### С т е п ь

*Степная* мирмекологическая фауна пріурочена къ полосѣ степей, занимающихъ всю почти южную половину Европ. Россіи и юго-западную часть Сибири. Выражена она также мѣстами въ Крыму, на Кавказѣ, въ Туркестанѣ, равно какъ въ средней и восточной Сибири. Въ послѣднихъ мѣстностяхъ элементы ея впрочемъ точно еще не установлены. Сплошного распространенія эта фауна по крайней мѣрѣ въ Евр. Россіи въ настоящее время не имѣеть, такъ какъ дѣвственные степи почти истреблены и заняты полями и поселеніями человѣка. Цѣльный характеръ она сохраняетъ только на тѣхъ сравни-тельно небольшихъ участкахъ и клочкахъ цѣлинной степи, которые еще сохранились кой-гдѣ въ Евр. Россіи, главн. образомъ на востокѣ, въ Заволжье, затѣмъ въ Зауральи и въ Западной Сибири. По этимъ отрывочнымъ, разбросаннымъ и разъединеннымъ теперь участкамъ и приходится возстановлять картину степной жизни. Кроме того отдѣльные степные формы, какъ это мы видѣли уже, распространены далеко на сѣверъ отъ полосы степей; тамъ они ются по окраинамъ и полянамъ различныхъ лѣсовъ, въ борахъ, на южныхъ склонахъ, на утесахъ и скалахъ, частью въ рѣчныхъ долинахъ; вездѣ тамъ они отчасти сохранились въ качествѣ реликтовыхъ формъ, отчасти-же являются формами пришлыми, новыми, обнаружи-

вающими стремлением двигаться все дальше, чему благоприятствует деятельность человека.

Степная мирмекофауна, сообразно характеру самой степи, распадается на следующие стационарные группы: 1) фауну черноземной травянистой (луговой и ковыльной) степи; 2) — кустарниковой степи; 3) — каменистой степи и 4) — солонцеватой степи и солонцовъ, представляющую уже переходъ въ пустынъ.

Луговая и ковыльная степи растутъ на черноземъ, который залегаетъ широкой полосой южне лѣсовъ въ Европѣ Россіи, простираясь отъ подножія Карпатъ до Урала. На съверъ граница чернозема имѣеть видъ ломанной линіи, проходящей приблизительно черезъ Бердичевъ, Кіевъ, Орелъ, Тулу, Рязань, Моршанска, Тамбовъ, Пензу, Тетюши, Чистополь до р. Бѣлой. На югѣ онъ переходитъ въ глинистая, солонцеватая степи-пустыни, занимающая съверную часть Крыма, побережье Чернаго моря, частью Предкавказье, вообще низовья Дуная, Днѣпра, Дона и Волги. Выше съверной границы черноземно-степной области лежатъ нѣсколько черноземныхъ острововъ, которые всѣ заняты теперь полями. Въ доисторическое время, какъ выяснилъ Г. И. Танфильевъ<sup>1)</sup>, съверная граница степи отодвигалась нѣсколько дальше къ съверу, доходя до Люблина, Брянска, Калуги, Серпухова, Нижнаго Новгорода и Малмыжа Вятской губерніи. На востокѣ степь по южнымъ отрогамъ Уральскаго хребта переходитъ въ Западную Сибирь, захватывая здѣсь широкое пространство, къ востоку постепенно съуживающееся.

По характеру растительности и фауны черноземная травянистая степь раздѣляется на луговую и типчаково-ковыльную, изъ коихъ первая болѣе развита на съверѣ степной полосы, вторая на югѣ. Эти двѣ *substationes* отличаются другъ отъ друга съ первого взгляда уже своимъ внешнимъ габитусомъ: луговая степь затянута сплош-

<sup>1)</sup> См. Танфильевъ, Г. И. Доисторическая степь Европейской Россіи, съ картой (Землевѣдѣніе, 1906 г., кн. 2).

нымъ разнотравнымъ покровомъ, ковыльная-же покрыта отдельно растущими дерновинами перистыхъ или волосистыхъ ковылей, типчака, *Avena desertorum* и др., между которыми остаются промежутки голой, ничѣмъ не покрытой почвы. Ковыльная степь обладаетъ болѣе типичной и болѣе богатой фауной. Между ковыльной и луговой степью существуютъ полные переходы, равно какъ такие-же переходы наблюдаются и по отношенію кустарниковой и каменистой степи.

Формами черноземной лугово-ковыльной степи являются:

<i>Lasius umbratus</i>	* <i>Leptothorax nassonovi</i>
* <i>L. exacutus</i>	* <i>Lept. stipaceus</i>
<i>L. alienus</i>	* <i>Lept. serviculus</i>
<i>Formica pratensis</i>	<i>Lept. unifasciatus</i>
<i>F. uralensis</i>	<i>Myrmica scabrinodis</i>
<i>F. pressilabris</i>	<i>M. lobicornis</i>
<i>F. rufibarbis</i>	* <i>M. lobicorn. v. deplanata</i>
<i>Solenopsis orientalis</i>	* <i>M. lobic. v. schenckii</i>
<i>Tetramorium caespitum</i>	

Кромѣ того въ степь ковыльную и луговую заходятъ изъ сосѣднихъ участковъ каменистой и кустарниковой степи *Myrmecocystus aenescens*, *Messor structor* (и *v. clivorum*), *Form. sanguinea*, *Form. gagates*, *Polyergus rufescens*, *Form. rufibarbis* *v. subpilosa* (изъ бора); и нѣкоторыя изъ нихъ гнѣздаются на ней. Формы, отмѣченныя звѣздочкой (\*) въ спискѣ, попадались мнѣ только на ковыльной степи; на луговой же степени они повидимому нормально не живутъ.

Муравьи, свойственные типчаково-ковыльной и луговой степи, гнѣздаются попреимуществу въ землѣ, въ норахъ; особенно любятъ они селится около или подъ дерновинами степныхъ злаковъ (ковыля, *Festuca*, *Avena desertorum*, *Koeleria*); только *For. uralensis*, *pratensis* и *pressilabris* дѣлаютъ насыпные сооруженія, которыя у *For. pratensis* часто достигаютъ крупныхъ размѣровъ и окружаются обширнымъ валомъ. Собственно *Form. pratensis* и *uralensis* не принадлежать къ типичнымъ

обитателямъ травянистой степи; ихъ гнѣзда помѣщаются все-гда на окраинахъ степи по близости къ кустарникамъ или опушкѣ лѣса, куда они неизмѣнно и заходить, собирая тамъ обломки сучьевъ, изъ которыхъ строить наружные конусы и которыми выполняютъ внутренность воронокъ своихъ гнѣздъ. Точно также мало типичны для травянистой степи *Leptothis unifasciatus* и *Las. umbratus*. Извѣдка попадается на ней и *Lasius mixtus* (около листв. лѣсовъ). Формами характерными для ковыльной степи нужно считать *Lept. nassonovi*, *L. stipaceus*. Послѣдній очень обыкновененъ въ степяхъ въ Западной Сибири, поросшихъ гранатникомъ (*Libanotis sibirica*), въ пустыхъ стебляхъ которого при ихъ основаніи онъ гнѣздится.

*Каменистая степь* занимаетъ всегда лишь сравнительно небольшіе ограниченные участки территории, будучи развита исключительно на каменистыхъ холмахъ, на скалахъ, утесахъ и на различныхъ склонахъ, обращенныхъ на Ю, ЮВ или ЮЗ. Основнымъ условіемъ для ея произрастанія служить твердый каменистый субстратъ, бѣдность почвенного покрова и сухость его, почему и растительность каменистой степи ксерофитного характера. На холмахъ она одѣваетъ какъ склоны ихъ, такъ и вершины, и особенно характерно развита на Уралѣ, въ Губерлинскихъ и Индерскихъ горахъ, въ Киргизской степи (на горахъ Б. и М. Богдо), на Кавказѣ, въ Крыму, въ Туркестанѣ и въ южной Сибири. На Кавказѣ она наблюдается на предгоріяхъ и на склонахъ невысокихъ горъ и холмовъ, но подымается и выше, переходя не замѣтно въ горно-степную область. На сѣверѣ, среди лѣсовъ, она представляется какъ бы островки или оазисы, рѣзко отличаясь своимъ зоо-ботаническимъ габитусомъ отъ окружающей мѣстности. Въ Европ. Россіи съ єя равниннымъ рельефомъ каменистая степь наблюдается главнымъ образомъ на склонахъ съ обнаженіями мѣла, грубаго известняка или мергеля (преимущественно по долинамъ и берегамъ рѣкъ).

Растительность каменистой степи состоитъ не только изъ обычныхъ степныхъ видовъ, какъ-то ковылей, типчака,

*Koeleria*, *Thymus*, *Centaurea*, *Artemisia* и др., которые здесь растутъ разбросанно, не соцально, но и изъ многихъ другихъ болѣе своеобразныхъ формъ (среди нихъ особенное вниманіе привлекаютъ бобовыя, какъ-то *Hedysarum*, астрагалы, *Orobrychis sativa* и др.); часто на ней появляются кустарники (дикая вишня, бобовникъ, *Cotoneaster vulgaris*) и даже отдѣльныя деревца (береза, дубнякъ, осина, сосна, яблоня, карагачъ, орѣшникъ). Отличительнымъ свойствомъ растительности каменистой степи является ея разрѣженность; она никогда не покрываетъ склона или холма сплошь, а растетъ рѣдко, разбросанно, оставляя между отдѣльными экземплярами растеній голые промежутки. Поверхностнымъ субстратомъ каменистой степи является часто грубая темноцвѣтная, щебневатая почва, усеянная различной величины обломками камней, подъ которыми обыкновенно и находяться различные обитатели этой интересной стадіи, особенно изъ мира насѣкомыхъ. Иногда грунты каменистой степи бываютъ сплошь скалистымъ (Ураль, Кавказъ, Губерлинскія горы, Акмолинск. обл., Иnderскія горы), состоя не только изъ известняковъ, но и изъ болѣе твердыхъ горныхъ породъ (кварцитъ, гранита, порфира, сланцевъ и др.), обыкновенно лишь едва прикрытыхъ очень тонкимъ слоемъ сѣрой почвы или чернозема, а иногда и совсѣмъ почти обнаженныхъ, содержа частицы почвы въ щеляхъ и промежуткахъ камней и скалъ. Каменистая степь особенно хорошо и полно развита на югѣ какъ въ степной области, такъ и среди пустынь и горъ. Мир-мекологическая фауна ея весьма своеобразна и содержитъ въ себѣ не мало характерныхъ формъ, изъ коихъ большая часть несомнѣнно южного происхожденія. Многія изъ этихъ формъ однако идутъ далеко на сѣверъ, гдѣ онѣ встрѣчаются спорадически, и притомъ только въ сообществѣ съ каменистой степью, т. е. следовательно всегда при особыхъ опредѣленныхъ условіяхъ. Большая часть видовъ муравьевъ, живущихъ на каменистой степи, дѣлаютъ свои гнѣзда подъ камнями, въ промежуткахъ между ними и въ трещинахъ скаль.

Слѣдующіе муравьи свойственны каменистой степи:

<i>Camponotus vagus</i>	<i>Tap. nigerrimum</i>
<i>C. saxatilis</i>	* <i>Solenopsis fugax</i>
<i>C. aethiops</i>	* <i>Sol. orientalis</i>
<i>C. lateralis</i>	<i>Tetramorium caespitum</i>
<i>Lasius carniolicus</i>	* <i>T. caesp. var. ferox</i>
<i>L. emarginatus</i>	<i>T. caesp. v. meridionale</i>
<i>L. alienus</i>	* <i>T. caesp. v. forte</i>
<i>L. umbratus</i>	* <i>T. caesp. v. punicum</i>
* <i>L. exacutus</i>	<i>T. inerme</i>
* <i>Formica uralensis</i>	* <i>Myrmoxenus gordiagini</i>
<i>F. pratensis</i>	<i>Leptothorax bulgaricus</i>
<i>F. pressilabris</i>	<i>L. nassonovi</i>
* <i>F. gagates</i>	<i>L. tuberum i. sp.</i>
<i>F. rufibarbis</i>	<i>L. unifasciatus</i>
<i>F. rufib. v. subpilosa</i>	<i>L. exilis</i>
<i>F. rufib. v. glauca</i>	<i>L. serviculns</i>
<i>F. clara</i>	<i>Myrmica scabrinodis</i>
<i>F. cinerea</i>	<i>M. lobicornis</i>
<i>F. sanguinea</i>	<i>M. lobic. v. schenckii</i>
* <i>Proformica nasuta</i>	<i>M. lobic. v. deplanata</i>
<i>Pr. aberrans</i>	<i>M. sulcinodis (v. nigripes)</i>
<i>Myrmecocystus aenescens</i>	<i>Messor structor</i>
<i>Polyergus rufescens</i>	* <i>M. struct. v. clivorum</i>
<i>Plagiolepis pygmaea</i>	* <i>M. tataricus</i>
* <i>Pl. pygm. v. pallescens</i>	<i>Pheidole pallidula.</i>
<i>Tapinoma erraticum</i>	

Всего свыше 50 формъ. Изъ нихъ многія являются въ тоже время и горностепными, частью чисто степными, частью пустынными (наприм. *Plagiol. pygmaea*, *Proform. nasuta*, *Myrm. aenescens*, *Tetram. inerme*, *Pheid. pallidula*). Характерные формы отмѣчены звѣздочкой (\*). Имѣются формы, свойственные кустарникамъ и опушкамъ (*Polyerg. rufescens*, *Lept.*

*unifasciatus*, *F. sanguinea*), лиственнымъ лѣсамъ (*Carp. vagus*, *Las. emarginatus*), пескамъ и сосновымъ борамъ (*Form. cinerea*, *F. rufibarbis* v. *subpilosa*); встрѣчаются и горныя (*M. sulcinodis*).

Въ распространеніи многихъ степныхъ формъ животныхъ каменистая степь играетъ большое значеніе, давая имъ возможность жить экзоклинически, т. е. далеко за предѣлами нормальной области ихъ обитанія. Многія изъ такихъ формъ наблюдаются на сѣверѣ въ полосѣ лиственныхъ лѣсовъ и даже среди тайги, гдѣ онѣ поселяются исключительно на склонахъ, поросшихъ растеніями, свойственными каменистой степи. Именно въ сѣверной и средней Европѣ Россіи и въ Сибири, также и въ западной Европѣ южные степные склоны являются преимущественнымъ мѣстообитаніемъ такихъ муравьевъ, какъ *Tetramorium caespitum*, *Form. rufibarbis*, *F. uralensis* (Московск. губ.), *F. gagates*, *Leptoth. tuberum*, *Lasius alienus*, *L. umbratus*, *Solenopsis fugax*, *Myrmica scabrinodis*, *M. lobicornis*. Многія изъ перечисленныхъ формъ, впрочемъ, одновременно со степными склонами встречаются еще и въ сосновыхъ борахъ, куда можетъ быть отчасти онѣ и перешли съ этихъ склоновъ.

На каменистой степи часто встречаются и формы спорадического распространенія (*Mess. structor* var. *clivorum*, *Lasius carniolicus*) и затѣмъ вообще многія южные формы (напр. *Iheid. pallidula*, *Leptothorax semenovi*, *Tapinota nigerrimum*, *Plagiolepis rugosae*, *Proformica nasuta* и нѣк. др.), свойственные по преимуществу пустынѣ. Fauna каменистой степи очень древняго происхожденія, имѣющая тѣсную связь съ горными областями. Въ ледниковую эпоху она была развита сильно. Она дала многія формы для черноземной степи и для сосновыхъ боровъ. Сама-же получила большинство своихъ формъ частью изъ горностепной области, частью отъ пустыни, такъ какъ и та и другая въ ледниковую эпоху или близкую къ ней были развиты гораздо болѣе чѣмъ теперь. Fauna каменистой степи въ средней и сѣверной полосѣ Европѣ Россіи обречена на постепенное вымирание, ибо холмы

и склоны съ обнаженіями, гдѣ она развита, съ течеіемъ времени все болѣе и болѣе разрушаются какъ отъ естественныхъ агентовъ (денудація, эрозія), такъ въ особенности и благодаря дѣятельности человѣка.

Въ области пустынь, также въ Закавказье и въ Крыму, вообще на югѣ, каменистая степь привимаетъ особый, болѣе южный, пустынный характеръ и населена цѣлымъ рядомъ формъ, вовсе не встрѣчающихся на сѣверѣ, а напротивъ распространенныхъ въ Персіи, Малой Азіи, Мезопотаміи, Аравіи, Сѣверной Африкѣ и на европейскомъ побережье Средиземного моря, или имѣющихъ тамъ близкихъ представителей. Каменистой степи съ такимъ характеромъ правильнѣе придавать название *каменистой пустыни*, сохранивъ название *каменистой степи* за той стаціей, которая развита въ области чернозема и сѣвера. Такая каменистая степь-пустыня имѣется напр. на горахъ Малое и Большое Бодо, на гипсовыхъ холмахъ около Индерскаго соленаго озера, на Мугоджахъ, Мангишлакѣ, Дагестанѣ, въ Закаспійской обл. и пр. На Кавказѣ она незамѣтно сливаются съ горно-степною областью. Изъ формъ, свойственныхъ этимъ южнымъ каменистымъ степямъ, нужно называть: *Pheidole pallidula*, *Myrmecocystus desertorum*, *Plagiol. rugosa*, *Bothriom. meridionalis*, *Tetramorium inerme*, *ruficatum*, *meridionale*, *Leptothorax semenovi*, *Acantholepis frauendorfii*, *Proform. nasuta*, *Pr. aberrans*, *Myrmecoc. albicans*, *Messor barbarus meridionalis*, *M. capitatus*, *Formica clara*.

*Кустарниковая степь* служить въ некоторомъ родѣ промежуточнымъ звеномъ между лѣсомъ и степью. Кто видѣлъ наши южные, развитые въ предѣлахъ степной области лиственные лѣса, тотъ хорошо знаетъ какое громадное развитіе имѣютъ тамъ степные кустарники, растущіе по опушкамъ, полянамъ, окраинамъ лѣсныхъ дорогъ и на склонахъ лѣсныхъ овраговъ; этимъ кустарникамъ, главнымъ образомъ состоящимъ изъ дикой вишни, бобовника и *Cytisus biflorus*, всегда сопутствуютъ и цѣлый рядъ травянистыхъ степныхъ растеній. Мѣстами дикой вишни и бобовника на полянахъ и опушкахъ

лесовъ такъ много, что они дѣлаютъ ихъ почти непроходимыми. Но степные кустарники встречаются также пятнами и полосами и на ровной степи и на холмахъ и на склонахъ, причемъ здѣсь они развиты вполнѣ типично и къ нимъ кромѣ трехъ вышеуказанныхъ видовъ прибавляются еще дрезена (*Caragana frutescens*), таволга (*Spiraea crenifolia*), шиповникъ, тернъ, боярышникъ, груша, яблоня, берестъ, мелкорослый дубнякъ.

Такія кустарниково-древесные заросли, перемѣшанные разнообразными травянистыми степными растеніями, растущими между ними или образующими отдельныя луговины, представляютъ самостоятельную стацію, отличающуюся какъ особой группировкой своего населенія, такъ и некоторыми специально свойственными ей формами.

Изъ муравьевъ наиболѣе обычными для стаціи степныхъ кустарниковъ нужно назвать слѣдующихъ:

* <i>Polyergus rufescens</i>	<i>F. rufibarbis</i>
* <i>Camponotus lateralis</i>	* <i>Leptothorax unifasciatus</i>
<i>C. aethiops</i>	* <i>L. kirillovi</i>
* <i>Formica sanguinea</i>	* <i>L. tuberum</i>
* <i>F. uralensis</i>	* <i>L. exilis</i>
* <i>F. truncicola</i>	<i>Bothriomyrmex meridionalis</i>
<i>F. pressilabris</i>	<i>Solenopsis orientalis</i>
* <i>F. pratensis</i>	<i>Myrmica scabrinodis</i>

Къ нимъ часто еще присоединяются и другие менѣе характерные, гменоно: *Lasius flavus*, *L. umbratus*, *L. bicornis*, *L. alienus*, *L. niger*, *Camponotus vagus*, *Tapinoma erraticum*, *Myrmica scabrinodis*, *Tetramorium caespitum*, *Leptothorax nassonovi* и другіе, свойственные каменистой или ковыльной степи. Отмѣченные звѣздочкой (\*) мнѣ кажутся особенно характерными.

Фауна кустарниковой степи тѣсно связана съ черноземно-ковыльной и съ каменистой степью, такъ какъ она всегда развивается среди нихъ и въ некоторомъ родѣ подчинена

имъ, а съ другой стороны она представляетъ несомнѣнныи переходъ къ лѣсу (лѣсостепь), лавая пристанище такимъ формамъ, какъ *Formica truncicola*, *F. pratensis*, *Catponotus tagus*, *Camp. aethiops*, *Leptothorax tuberum* и *unifasciatus*, которые дѣлаются гнѣзда въ деревѣ или пуждаются въ деревянистыхъ материалахъ для постройки сложныхъ насыпныхъ гнѣздъ.

На Кавказѣ кустарниковая степь состоить изъ многихъ специальныхъ растеній, каковы дерди-дерево, алыча, абрикосъ и др.; тамъ она развита въ изобиліи на склонахъ невысокихъ горъ и у ихъ подножія, на холмистыхъ предгоріяхъ, по ущельямъ и т. д.; мѣстами она обнаруживаетъ переходъ въ нагорной степи и къ пустынѣ, будучи населена такими формами какъ *Formica rufib. v. caucasica*, *Proformica nasuta*, *Pheidole pallidula*, *Plagiol. rugosa* и др.

Чѣмъ разнообразнѣй кустарниковая и древесная растительность кустарниковой степи, тѣмъ богаче и разнообразнѣй ея фауна. Такъ, напр., кустарниковая степь въ Уфимской губерніи, где она мѣстами хотя и очень развита, но состоить сплошь только изъ зарослей бобовника (*Amygdalus nana*) или дикой вишни (*Prunus chamaecerasus*), населена очень немногими формами муравьевъ, именно: *Polyergus rufescens*, *Form. pratensis*, *F. pressilabris*, *F. rufibarbis*, *F. truncicola*, *Tetramorium caespitum*, *Myrmica scabrinodis*, *Lasius alienus*, причемъ муравейники *F. truncicola* и *F. pratensis*, образующіе самыя крупныя и легче замѣтныя сооруженія на этой степи, всегда стоять отдельно, на значительномъ разстояніи другъ отъ друга, эксплуатируя разныя области. *Polyergus rufescens* тамъ очень рѣдокъ и живетъ вмѣстѣ съ *F. rufibarbis*. Въ заросляхъ вишни на полянахъ дубовыхъ лѣсовъ Симбирской губ. фауна муравьевъ еще бѣднѣе; тамъ встрѣчаются между прочимъ также *Lasius flavus* и *niger*. Если же взять для сравненія кустарниковую степь болѣе южныхъ мѣстностей, наприм. Саратовской губ. или Кавказа, въ составѣ которой входять кромѣ кустарниковъ и различныя древесныя породы (карагачъ, яблона, боярышникъ, алыча и др.), то тамъ уже встрѣчаются

лептотораксы (*L. unifasciatus*, *exilis*, *tuberum*), черные мелкие кампоподусы (*Camp. lateralis*, *aethiops*), *Bothriomyrm. meridionalis* (на Кавказѣ), соленопсисъ, не считая различныхъ лазіусовъ и формикъ.

Солонцы и солончаковая степь разбросаны островами въ области степей близъ ея южной границы, а солонцы кромъ того также и въ области пустынь. Островки эти обыкновенно небольшихъ размѣровъ и всего чаще пріурочены къ солянымъ озерамъ. Участки солонцоватой степи и солонцы окружаются не только степями, но нерѣдко также граничать и съ лѣсами, располагаясь на опушкахъ и полянахъ (наприм., около бай-рачныхъ лѣсковъ Саратовской губ.). Кроме специально имъ свойственной фауны, на нихъ обычно заходятъ и другие виды со степи. Солончаковая степь представляетъ переходную стадію между черноземной степью и солонцами. Она имѣеть видъ травянистыхъ пространствъ, развитыхъ на подсолонкахъ и солонцоватыхъ черноземахъ. Въ восточной Россіи (Саратовская, Самарская, Оренбургская губ.) и въ Западн. Сибири такія пространства весьма нерѣдки.

Растительный покровъ солонцеватой степи состоитъ изъ смѣши чисто степныхъ травъ съ солончаковыми. Фауна ея тоже смѣшанная, состоящая не только изъ специальныхъ чисто солончаковыхъ формъ, но также и изъ обыкновенныхъ степныхъ или пустынныхъ (*Plagiol. rugosa*), а равно и изъ формъ различного характера мѣстообитанія. Присутствіе степныхъ и пустынныхъ формъ легко объяснить на солончаковой степи, такъ какъ они заходить туда изъ соседнихъ, непосредственно около нихъ лежащихъ участковъ черноземной степи или глинистой пустыни. Нахожденіе же на солончаковыхъ степяхъ и солонцахъ формъ разнохарактернаго обитанія выяснить довольно трудно; къ такимъ формамъ принадлежать напр. *Las. niger* и *Las. flavus*, представляющіе преобладающей элементъ населенія солончаковыхъ участковъ. По этому поводу нужно вообще замѣтить, что некоторые муравьи отличаются чрезвычайной неприхотливостью въ выборѣ мѣстообитанія, способностью приспособляться къ различнымъ жизненнымъ условіямъ.

Таковы, наприм., *Lasius flavus*, *L. niger*, *Myrmica laevinodis*, *Tetramorium caespitum*, отчасти *Formica rufibarbis*, *F. fusca*, *Las. alienus* и н. др. Причина этой особенности лежитъ между прочимъ въ условіяхъ ихъ соціальной жизни, въ ихъ крайней умѣренности по отношенію къ пищи, въ ихъ трудолюбіи и еще въ томъ, что они сожительствуютъ съ различными видами другихъ животныхъ, которыхъ искусно умѣютъ использовать въ своихъ выгодахъ, напр. съ тлями. Послѣднія, доставляя муравьямъ необходимую пищу своимъ испражненіямъ, сами пытаются соками различныхъ растеній, не требуя никакого особенного ухода за собой со стороны муравьевъ. Такъ, *Las. flavus*, повидимому, питается исключительно на счетъ тлей, являясь въ данномъ случаѣ типичнымъ монофагомъ; живя въ своихъ холмикахъ, онъ никогда не выходитъ наружу,—это совершенно подземный житель, держащий у себя въ гнѣздахъ тлей въ корняхъ растеній. *Lasius niger*, напротивъ, оказывается пастолько-же подземнымъ, какъ и надземныхъ жителемъ, даже послѣднимъ въ большей степени; тлей у себя въ муравейникѣ онъ не всегда держитъ, а предпочитаетъ посѣщать этихъ мало подвижныхъ насѣкомыхъ на деревьяхъ и травянистыхъ растеніяхъ и собирать съ нихъ свою дань, совершая эту работу не только днемъ, но также и въ тихія, теплые ночи. Столь же усердно посѣщаются тлей на растеніяхъ *Myrmica laevinodis*, *Formica rufibarbis* и *F. fusca*.

Въ общемъ втетаки фауна солонцовъ и солончаковой степи довольно бѣдная. Въ составѣ я входятъ слѣдующія формы:

* <i>Lasius flavus</i>	<i>F. rufibarbis</i>
<i>L. fl. v. odoratus</i>	* <i>F. rufib. v. glauca</i>
<i>L. bicornis v. affinis</i>	<i>F. cinerea</i>
<i>L. mixtus</i>	<i>Myrmecocystus aenescens</i>
* <i>L. niger</i>	<i>M. tancrei</i>
<i>L. alienus</i>	<i>Solenopsis orientalis</i>
<i>Formica pratensis</i>	<i>Sol. orient. v. kasalinensis</i>
<i>F. pressilabris</i>	<i>Tetramorium caespitum</i>

<i>Myrmica laevinodis</i>	<i>M. rugulosa</i>
* <i>M. bergi</i>	<i>Plagiolepis pygmaea</i>
<i>M. scabrinodis</i>	* <i>Cardicondyla stamb. v. koshewnikovi</i>
* <i>M. scabr. v. lacustris</i>	
* <i>M. scabr. v. salina</i>	

Звездочкой отмечены характерные формы.

Конечно составъ фауны солонцовъ и солонцоватыхъ степей въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи различенъ въ зависимости отъ характера ихъ растительности, количества содержания влажности и солей, также и географического положенія. Сѣверные солонцы вообще бѣднѣе формами южныхъ. Для солонцевъ въ западной Сибири характерны мирмики (*Myrm. scabrinodis* var. *salina*, var. *lacustris*). Фауна солонцовъ окрестностей Сарепты оказалась очень оригинальной; тамъ я нашелъ слѣдующихъ муравьевъ: *Lasius flavus* i. sp., var. *odoratus*, *L. affinis*, *L. niger*, *L. alienus*, *Form. rufibarbis*, *Solenopsis orientalis*, *Tetramorium caespitum*, *Plagiolepis pygmaea*, *Myrmica scabrinodis*, *M. bergi*, *Cardicondyla koshewnikovi*. Жили они тамъ въ земляныхъ холмикахъ, причемъ въ большинствѣ случаевъ одинъ и тотъ-же холмикъ населенъ былъ несколькими формами. Изъ указанныхъ формъ большая часть на сѣверныхъ солонцахъ не встрѣчается. Только *Lasius niger* и *flavus* являются спутниками всякихъ солонцовъ независимо отъ ихъ характера и географического положенія.

Все населеніе муравьевъ на солонцоватыхъ лугахъ и солонцахъ въ большинствѣ случаевъ сосредоточивается въ земляныхъ холмикахъ, представляющихъ интересное явленіе соціальныхъ гнѣздъ. Въ этихъ холмикахъ, проростающихъ сверху травой, живутъ различные виды муравьевъ съ разными цѣлями: одни въ качествѣ настоящихъ хозяевъ или истинныхъ симбionтовъ, другіе какъ простые сосѣди, трети съ цѣлями хищническими и воровскими (напр. *Solenopsis*). Главная-же роль здѣсь повидимому принадлежитъ лазіусамъ, особенно желтому лазіусу, крайне трудолюбивому и независимому, который по всей вѣроятности и является первоначальнымъ устро-

телемъ этихъ холмиковъ. Солончаковыя пространства въ этомъ отношеніи сходны съ лугами рѣчныхъ долинъ; и тамъ и тутъ число лазіусовыхъ холмиковъ, лежащихъ очень близко одинъ отъ другого, часто бываетъ громадно. Такъ въ окрестн. Сарепты (въ 1905 г.) на одномъ солонцоватомъ лугу я насчитывалъ въ разныхъ участкахъ его на 9 кв. саженяхъ отъ 8 до 27 муравьевиныхъ холмиковъ,—что на одной десятинѣ составить приблизительно отъ 2130 до 7200 холмиковъ; а на одной квадратной верстѣ отъ 222000 до 750000. Въ долинѣ р. Свіаги я получалъ не меньшія числа. Въ окрестностяхъ г. Красноуфимска проф. А. Я. Гордягинъ насчитывалъ 40 муравейниковъ (населенныхъ главнымъ образомъ *Las. flavus* и *L. niger*) на 100 квад. саженяхъ, что на квадратн. версту составить 100000. Въ Саратовской губ. (Сердобскій и Балашовскій уѣзды) Т. П. Гордѣевъ (879) приводить 25 холмиковъ тѣхъ-же муравьевъ на 10 кв. метровъ или 250000 на 1 километръ (на мокрыхъ солонцахъ и солонцо-ватыхъ лугахъ) <sup>1)</sup>.

Влажность мѣста очевидно представляетъ важное условіе для поселенія такихъ муравьевъ какъ *Lasius flavus*, *L. niger* и *Myrmica laevinodis*. На сухихъ солонцеватыхъ степяхъ два первыхъ очень рѣдки, а послѣднія совсѣмъ не встрѣчается; точно также ихъ нѣть на черноземной и каменистой степи. Содержаніе солей въ почвѣ вѣроятно здѣсь играетъ второстепенную роль. Присутствіе же въ большей или меньшей степени влажности имѣеть наибольшее значеніе при выборѣ мѣста поселенія у вышеназванныхъ муравьевъ. Тоже очевидно нужно сказать и про *Myrmica bergi*, которую я въ окрестностяхъ Сарепты ни разу не встрѣтилъ на глинистой полынной пустынѣ, остающейся большую часть лѣта сухой и твердой какъ камень. Что-же касается находженія въ холми-

---

<sup>1)</sup> Означеніе холмики съ разнообразнымъ населеніемъ муравьевъ представляютъ много своеобразныхъ биологическихъ особенностей, но здѣсь я не могу вдаваться въ подробности и буду обѣ нихъ говорить въ другомъ мѣстѣ.

кахъ ва солонцахъ *Cardicondyla*, *Plagiolepis* и *Solenopsis*, могущихъ жить и въ пустынѣ и на каменистой стели, то я думаю, что здѣсь въ гнѣздахъ лазіусовъ эти муравьи поселяются въ качествѣ клептобионтовъ и лестобионтовъ.

На мокрыхъ злыхъ солонцахъ обитаетъ гораздо меньше муравьевъ, чѣмъ на солонцоватыхъ лугахъ или степяхъ; тамъ (Оренбургская губ., Тобольская) встрѣчаются только желтый и темнобурый лазіусы, *Myrmica scabrinodis* v. *salina* и *la-  
custris*.

Сравнительное богатство формами муравьевъ сырыхъ солонцовыхъ луговъ среди глинистой полынной пустыни объясняется болѣе благопріятными ихъ жизненными условіями: они являются настоящими оазисами среди крайне бѣдной жизнью, лишенной въ лѣтніе мѣсяцы почти всякой растительности пустыни.

Интересно отмѣтить различіе въ отгѣнкахъ строенія сложныхъ гнѣздъ у формъ цикла *Formica rufa* въ лѣсу и на степи. Гнѣзда этихъ формъ (*F. pratensis*, *truncicola*), какъ извѣстно, состоятъ изъ подземной части, имѣющей видъ воронки, наполненной главнымъ образомъ обломками стеблей, и надземной въ видѣ насыпного конуса, составленного преимущественно изъ различныхъ растительныхъ материаловъ (среди которыхъ стебли обыкновенно преобладаютъ); кромѣ того воронка снаружи окружается кольцевымъ валомъ изъ вынесенной земли. Валъ этотъ бываетъ болѣе развитъ у степныхъ гнѣздъ и находится совершенно наружу, никогда не будучи прикрыты насыпнымъ конусомъ; у лѣсныхъ же гнѣздъ онъ вообще менѣе и закрыты насыпнымъ конусомъ. Въ этомъ заключается главное различіе гнѣздъ лѣсныхъ отъ степныхъ. Кромѣ того въ лѣсныхъ гнѣздахъ насыпной конусъ всегда имѣется и хорошо развитъ, достигая иногда значительныхъ размѣровъ. Въ гнѣздахъ же на степи конусъ развитъ слабо и большую частью вовсе отсутствуетъ, такъ что поверхность воронки представляется гладкую, ровную площадку, иногда даже слегка вогнутую. Издали такие муравейники не видны. Круговой валъ у нихъ застаетъ скрѣпляющей его травянистой и кустарниковой растительностью, которая нерѣдко достигаетъ значительной вы-

соты и густоты, совершенно скрываая муравейникъ отъ глазъ наблюдателя и доставляя обитателямъ такого гнѣзда благодѣтельную тѣнь. Если муравейникъ стоитъ на крутомъ склонѣ холма, то часть кругового вала, обрѣщенная къ основанію склона, бываетъ обыкновенно значительно болѣе развита, какъ-бы подпирая снизу гнѣздо, благодаря чему площадка, прикрывающая воронку, сохраняетъ горизонтальное положеніе. Развитіе наружнаго конуса въ лѣсныхъ гнѣздахъ объясняется: во 1-хъ) обиліемъ насыпного матеріала, находящагося всегда тутъ-же поблизости, вслѣдствіе чего значительно облегчается трудъ муравьевъ по доставкѣ этого матеріала, во 2-хъ) постояннouю влажностью, находящуюся въ лѣсу и въ особенности въ лѣсной почвѣ, что и побуждаетъ муравьевъ подымать выше конусъ и дѣлать внутри его камеры, очень хорошо и удобно вентилируемыя; въ эти камеры въ извѣстное время выносятся коконы и личинки. Затѣмъ въ лѣсу наружный конусъ, какъ-бы онъ не былъ великъ, въ особенности если гнѣздо помѣщается въ чашѣ лѣса, не такъ земѣтенъ, какъ это имѣло бы мѣсто на степи. Значеніе кругового вала въ гнѣзлахъ, стоящихъ на степныхъ склонахъ, заключается еще и въ томъ, что онъ предохраняетъ муравейникъ отъ размыва дождевыми водами. Отсутствіе же или слабое развитіе наружнаго конуса у степныхъ гнѣздъ объясняется отчасти также бѣдностью деревянистыхъ матеріаловъ на степи и загруднительностью для муравьевъ изъ доставки.

### П у с т ы н я.

Область *пустынь* занимаетъ главнымъ образомъ Западную и сѣверную части Турана. Пустынныя пространства тамъ группируются около Каспійскаго моря, Аральскаго и Балхаша, простираясь отъ Ергеней до Тарбогата, къ сѣверу доходя до Тургая и Денгиза, на югѣ ограничиваясь предѣлами Персіи и Афганистана. На востокѣ они уходятъ во Монголію. На западѣ область пустынь захватываетъ юговосточный уголъ Евр. Россіи (Киргизская и Калмыцкая степь), затѣмъ тянется по западному побережью Каспійскаго моря, вдаваясь въ области бассейна Куры въ Закавказье (Карабахская степь). Отличаясь крайней бѣдностью осадковъ, черзвычайной сухостью воздуха,

большими амплитудами температуры (сильными жарами летомъ и морозами зимой), область эта по своему общему характеру и биологическимъ условіямъ раздѣляется на два различные типа: 1) *глинистую или суглинистую, солонцеватую полынную пустыню* и 2) *песчаную пустыню*.

Хотя мирмекофауна нашихъ пустынь еще мало изучена, тѣмъ не менѣе мы можемъ сказать, что главными обитателями пустынь изъ муравьевъ являются некоторые кампонотусы (главн. образомъ расы вида *Catpon. maculatus*, каковы напр. *C. xerxes*, *C. turkestanicus* и др.), хищные, проворные муравьи-бѣгунки (*Myrmecocystus setipes*<sup>1</sup>), *desertorum*, *foreli*, *pallidus* и др.), некоторые мономоріумы и аеногастеры изъ родовъ *Ischnomyrmex* и *Messor*. На всѣхъ этихъ муравьяхъ пустыня кладеть свой особый отпечатокъ. Нѣкоторые изъ нихъ обладаютъ специальными приспособленіями для жизни въ пустынѣ (длинныя ноги, сильно развитыя щетинки на голеняхъ, волоски на нижней поверхности головы, охранительная окраска). Одни являются хищниками, другіе, напротивъ, по преимуществу зерноядны. Необходимо отмѣтить также почти полное отсутствіе въ фаунѣ пустыни представителей родовъ *Formica*, *Lasius* и *Myrmica*, столь обыкновенныхъ въ лѣсахъ и степахъ. Крылатыя формы у обитающихъ пустынью муравьевъ обыкновенно появляются ранней весной, когда и сами муравьи вообще бывають наиболѣе дѣятельны. Гнѣздятся муравьи въ пустынѣ исключительно въ землѣ, въ глубокихъ норахъ.

Глинистая, солонцеватая, полынная пустыня начинается у насъ отъ Сарепты и идетъ къ Каспійскому морю въ Киргизскую степь и Тургайскую область. Эта плоско-однообразная низменная равнина съ глинистой каштановаго или каштаново-сераго цвѣта почвой, поросшая рѣдкими кустиками темной полыни и солянками, съ обширными солонцами и южковыми зарослями. Ранней весной она оживляется красивыми цвѣтками

---

<sup>1</sup>) Заслуживаютъ вниманія интересныя наблюденія проф. В. Фаусека (1939) надъ одной разновидностью этого муравья (*v. turkestanicus*) въ Закаспийской области.

тюльпановъ и кипитъ своеобразною торопливою животною жизнью, въ теченіе же лѣта и осени представляетъ печальную и безжизненную равнину. Fauna ея сравнительно бѣдна и однообразна. Наиболѣе характерными ея представителями являются ящерицы (*Eremias velox*, *Erem. arguta*, *Agama sanguinolenta*, *Phrynocephalus helioscopus*), сѣрая гадюка (*Vipera rhenardi*), пустынные орлы (*Aquila orientalis*, *A. glitschi*), сайгакъ, различныя саранчевые, своеобразные жуки, пауки и др.

Изъ муравьевъ глинисто-песчаной пустыни свойственны слѣдующіе:

<i>Lasius alienus</i>	* <i>Acantholepis frauenfeldii</i>
<i>L. alien. v. lasioides</i>	* <i>A. frauenf. v. arnoldovi</i>
* <i>Myrmecocystus aenescens</i>	* <i>Plagiolepis pygmaea</i>
* <i>M. tancrei</i>	<i>Tetramorium caespitum</i>
* <i>M. desertorum</i>	<i>Myrmica rugosa v. kirgisica</i>
* <i>M. setipes v. turkomanicus</i>	* <i>Myrm. stangeana</i>
* <i>M. altisquamis</i>	* <i>Messor structor</i>
* <i>M. altisquam. v. jakobsoni</i>	<i>M. lobuliferus v. excursionis</i>
* <i>M. foreli</i>	* <i>M. capitatus v. aralocaspicus</i>
* <i>M. albicans</i>	* <i>M. cap. v. meridionalis</i>
* <i>Camponotus turkestanicus</i>	* <i>M. cap. v. semirufus</i>
* <i>C. xerxes</i>	? <i>Cardiocondyla stambulovi</i>
<i>Solenopsis orientalis</i>	

Звѣздочкой отмѣчены характерныя формы.

На глинистой пустынѣ также встрѣчаются нѣкоторые муравьи, свойственные каменистой степи, наприм. *Proformica nasuta*, котораго я нашелъ въ окрестностяхъ Сарепты гнѣздающимся въ довольно большомъ количествѣ на участкѣ глинистой пустыни, поросшемъ кустами тамариска.

Fauna песчаной пустыни въ сравненіи съ глинистой отличается гораздо большимъ разнообразіемъ, что конечно находится въ связи съ болѣе богатой растительностью, присущей пескамъ. Она имѣетъ не мало весьма характерныхъ формъ.

Изъ муравьевъ къ такимъ формамъ принадлежать:

<i>Myrmecocystus pallidus</i>	<i>Tetramorium caespitum</i> v.
<i>M. altisquamis</i> v. <i>jacobsoni</i>	<i>meridionale</i>
<i>Camponotus marginatus</i>	<i>Leptothorax satunini</i>
<i>ruzskii</i>	<i>Cardiocondyla elegans</i> v.
<i>C. turkestanus</i>	<i>uljanini</i>
<i>Formica clara</i>	<i>C. bogdanovi</i>
<i>F. rufibarbis</i> v. <i>subpilosa</i>	<i>Monomorium salomonis</i>
<i>F. cinerea</i> v. <i>imitans</i>	<i>Mon. gracillimum</i>
<i>Cremastogaster subdentata</i>	<i>Mon. barbatulum</i>
<i>Solenopsis deserticola</i>	<i>Pheidole pallidula</i> v. <i>arenarium</i>
<i>Myrmica rugosa</i> v. <i>kirgisica</i>	<i>Solenopsis deserticola</i>
<i>M. bergi</i> v. <i>barchanica</i>	

Однѣ изъ этихъ формъ свойственны подвижныхъ барханнымъ пескамъ (напр. *Myrmec. pallidus*, *Monomor. barbatulum*), другія предпочитаютъ пески уплотненные, уже окрѣпшіе (напр. камповотусы, *Form. clara*, *Myrmica bergi* var. *barchanica*, *Cardiocondyla* и др.). Сверхъ того въ область песковъ заходятъ и даже поселяются тамъ: *Myrmec. aenescens*, *M. tancrei*, *M. albicans*, *M. desertorum*, *Messor structor*, *meridionalis* и др., *Campon. turkestanicus*, *Lasius alienus*, *Tetramor. semilaeve* v. *schmidti*.

Кромѣ того области пустынь еще принадлежать: *Tetramorium schneideri*, *T. striativentre*, *T. reticuliventre*, *Messor capitatus* v. *sorokinii*, *Cr. subdentata* v. *flavicapilla*, *Camp. fedtschenkoi*, *C. dichrous* v. *ferganensis*, *Ischnomyrmex rhabdiiceps*, но характеръ ихъ мѣстообитанія намъ въ точности остается пока не извѣстнымъ.

Каменистая пустыня имѣть въ общемъ тотъ же характеръ какъ и каменистая степь; она обладаетъ только болѣе богатой и разнообразной фауной, въ составъ которой входять попреимуществу южныя формы. Отдѣлять ее рѣзко отъ каменистой степи нельзя; можетъ-быть даже правильнѣе было бы соединять ихъ. Между двумя этими стаціями существуетъ цѣлый рядъ постепенныхъ переходовъ. Каменистая степь по-

мѣрѣ ел движенія къ югу, что особенно хорошо замѣтно на границѣ чернозема и глинистой пустыни, привимаетъ все болѣе и болѣе пустынныи характеръ, причемъ таکія болѣе сѣверныи формы ея, какъ *Form. rufibarbis*, *Lasius umbratus*, *Myrmica scabrinodis*, *lobicornis*, *Form. sanguinea*, *Form. pratensis* и др. постепенно исчезаютъ, смѣняясь болѣе южными (наприм. *Tetramor. inerme*, *Proform. nasuta*, *Leptoth. semenovi*, *Messor structor*, *Campon. lateralis* и др.), на что я уже указывалъ (см. стр. 82). Вообще формы муравьевъ каменистой пустыни, какъ и растительность ея, болѣе своеобразны и характерны. Многія изъ нихъ на другихъ мѣстахъ обитанія вовсе не встречаются.

Изъ формъ, свойственныхъ каменистой пустыни, нужно главнымъ образомъ указать слѣдующихъ:

? <i>Camponotus interjectus</i>	? <i>T. caesp v. reticuliventre</i>
<i>Lasius alienus</i>	<i>T. semilaeve</i>
<i>L. alien. v. lasioides</i>	<i>T. inerme</i>
<i>Formica clara</i>	? <i>T. striativentre</i>
<i>Proformica nasuta</i>	? <i>T. schneideri</i>
? <i>Pr. aberrans</i>	<i>Leptothorax semenovi</i>
<i>Myrmecocystus albicans</i>	<i>Aphaenogaster testaceopilosa</i>
<i>M. aenescens</i>	<i>Messor structor</i>
<i>Acantholepis frauenfeldii</i>	<i>M. barbarus</i>
<i>Plagiolepis pygmaea</i>	<i>M. capitatus</i>
<i>Tapinoma nigerrimum</i>	<i>Cardiocondyla elegans</i>
? <i>Cremastogaster laestrygon</i>	? <i>Monomorium venustum</i>
<i>Cr. sordidula</i>	<i>Pheidole pallidula</i>
? <i>Solenopsis deserticola</i>	<i>Iph. megacephala</i>
<i>Tetramorium caespitum v. meridionale</i>	<i>Myrmica stangeana</i>
<i>T. caesp. v. punicum</i>	? <i>Ischnomyrmex raphidiiceps</i>

Тѣ, которые пока предположительно занесены въ данный списокъ, отмѣчены знакомъ (?). Среди перечисленныхъ формъ многія безъ сомнѣнія заходятъ и въ глинистую пустыню и

въ песчанную; въкоторыя встречаются и съвернѣе, на каменистой степи или на другихъ мѣстонахожденіяхъ (напр. *Lasius alienus*).

### Горныя области.

Не менѣе своеобразной фауной населены и горныя страны, именно въ ихъ верхнихъ наиболѣе высокихъ областяхъ. Не смотря на крайнее разнообразіе въ біологическомъ отношеніи различныхъ районовъ горъ, не смотря на то, что въ предѣлахъ горной области мы встречаемъ разные пояса растительности, начиная съ черноземной степи у ихъ подножій и до альпійскихъ луговъ па вершинахъ, наиболѣе характерными и самостоятельными въ горахъ фаунами являются только двѣ: *альпійская* и *горно-степная*. Первая населяетъ самый верхній поясъ горъ, тамъ, гдѣ прекращается древесная растительность и простираются раскошные высокогорные луга среди моренъ и торчащихъ скалъ у границы ледниковъ.

Альпійский поясъ ограниченъ снизу полосой лѣсовъ, состоящихъ или изъ березы, съ примѣсью другихъ лиственныхъ породъ (напр. субальпійского клена, рабины, осины и др.) или изъ сосны. Луга этого пояса покрыты разнообразными густо растущими травами съ красивыми цвѣтами, среди которыхъ попадаются заросли горныхъ кустарниковъ (рододендронъ).

Фауна горно-степная развита на безлѣсныхъ каменистыхъ вершинахъ и склонахъ болѣе или менѣе высокихъ горъ и плоскогорій, съдовинахъ, по краямъ ущелій и долинъ (обыкн. на выс. 3000—6000 ф.). Растительность этихъ мѣстностей на каменистомъ субстратѣ, травянистая и кустарниковая, носить на себѣ пустынно-степной отпечатокъ. Обѣ эти фауны, помимо специальныхъ, имъ только свойственныхъ формъ, имѣютъ въ своемъ составѣ еще и такие виды, по крайней мѣрѣ изъ муравьевъ, которые распространены далеко за предѣлы этихъ горныхъ областей и живутъ на равнинѣ, но уже на другихъ мѣстахъ обитанія. Нижеприложенные списки поясняютъ это.

Мирмекофауну нагорныхъ степей составляютъ слѣдующія  
формы:

<i>Lasius exacutus</i>	<i>C. tichomirovi</i>
<i>L. alienus</i>	? <i>C. interjectus</i>
<i>L. niger</i>	<i>O. aethiops v. glaber</i>
<i>L. emeryi</i>	<i>Myrmecocystus aenescens</i>
<i>L. brunneus</i>	<i>M. tancrei</i>
<i>L. flavus</i>	<i>M. setipes</i>
<i>L. myops</i>	<i>M. bicolor</i>
<i>Formica gagates</i>	<i>Cremastogaster sordidula</i>
<i>F. sanguinea</i>	<i>Cr. bogojawlenskii</i>
<i>F. transcaucasica</i>	<i>Solenopsis orbula v. latroides</i>
<i>F. uralensis</i>	<i>Tetramorium caespitum</i>
<i>F. rufibarbis</i>	<i>T. caesp. v. splendens</i>
<i>F. clara</i>	? <i>T. schneideri</i>
<i>F. clara v. caucasica</i>	<i>Myrmica lobicornis</i>
<i>F. cinerea</i>	? <i>M. rugulosa</i>
<i>F. cin. v. armenica</i>	<i>M. scabrinodis</i>
<i>F. cin. v. imitans</i>	<i>M. laevinodis v. minuta</i>
<i>F. pratensis</i>	<i>Temnothorax rogeri</i>
<i>F. pressilabris</i>	<i>Bothriomyrmex meridionalis</i>
<i>Proformica nasuta</i>	<i>Pheidole pallidula</i>
? <i>Pr. aberrans</i>	<i>Messor structor</i>
<i>Camponotus lateralis v. atricolor</i>	<i>M. aegyptiacus v. incorruptus</i>
? <i>C. fedtschenkoi</i>	<i>M. caducus</i>
<i>C. saxattlis</i>	<i>Aphaenogaster testaceo-pilosa</i>
<i>C. buddhae</i>	<i>Cardiocondyla bogdanovi</i>
	<i>C. elegans</i>

Изъ этого списка видно, что фауна нагорной степи, какъ я уже обѣ этомъ упоминалъ, имѣеть много общихъ формъ съ каменистой и черноземной степью, равно какъ и съ пустыней, но у ней имѣются и специальнаяя формы, придающія ей особый габитусъ и вѣ горныхъ областей очевидно не встрѣчающіяся; — вотъ почему горно-степная область и должна быть выдѣлена какъ самостоятельная стація. Къ сожалѣнію не вездѣ еще эти типичныя горно-степныя формы достаточно констатиро-

ванны. Главнымъ образомъ онѣ извѣстны съ Памира и съ Кавказа. На Памирѣ (благодаря сборамъ Н. В. Богоявленскаго) намъ стали извѣстны такія несомнѣнно типичныя для той мѣстности формы, какъ *Camponotus tichomirovi*, *Crematogaster sordid. bogojavlenskii*, *Lasius emeryi* и *Myrmica laevinodis* var. *minuta*. На Кавказѣ нагорная степь особенно хорошо развита въ Дагестанѣ, въ Закавказье, въ Армении. Тамъ обитаютъ: *Form. cinerea armenica*, *Form. clara v. caucasica*, *Messor caducus*, *M. aegyptiacus* v. *incorruptus*, *Form. pressilabris*, *Myrmecocystus bicolor* и н. др., большая часть коихъ были тамъ найдены К. А. Сатуниномъ.

Долженъ замѣтить, что многія формы помѣщены мною въ списокъ пока провизорно по недостатку нужныхъ данныхъ. Впослѣдствіи можетъ быть онѣ окажутся болѣе характерными для другихъ стацій, напр. для пустыни или для альпійской области.

Не подлежитъ сомнѣнію, что фауна муравьевъ нагорной степи наиболѣе родственна съ фауной каменистой пустыни и каменистой степи. Вѣроятно, послѣ того, какъ произведены будутъ достаточно полныя изслѣдованія, придется соединить всѣ эти фауны въ одно цѣлое, въ которомъ центральное положеніе должна будетъ занять горно-степная фауна.

Формами, встрѣчающимися въ альпійской области горъ, можно считать слѣдующихъ:

<i>Lasius flavus</i> (и v. <i>flavoides</i> )	* <i>Leptothorax alpinus</i>
* <i>L. myops</i>	<i>Myrcothorax acervorum</i>
? <i>L. exacutus</i>	* <i>Myrmica rubida</i>
<i>L. alienus</i>	* <i>M. dshungarica</i>
<i>Formica pressilabris</i>	<i>M. ruginodis</i>
<i>F. execta</i> v. <i>rubens</i>	<i>M. laevinodis</i>
<i>F. fusca</i>	<i>M. rugulosa</i>
<i>F. gagates</i>	<i>M. scabrinodis</i>
<i>F. transcaucasica</i>	* <i>M. smythiesi</i>
<i>F. rufibarbis</i>	<i>M. lobicornis</i>
? <i>Myrmecocystus aenescens</i>	* <i>M. sulcinodis</i>
<i>Tetramorium caespitum</i>	* <i>Aphaenogaster obsidiana</i>

Большая часть муравьевъ этого списка отличаются широкимъ распространениемъ и разнохарактерностью мѣстобитаній. Только отмѣченные звѣздочкой могутъ повидимому считаться действительно характерными для альпійского пояса горъ и потому исключительно къ нему пріуроченными, хотя и здѣсь для нѣкоторыхъ всетаки придется сдѣлать исключение (напр. *Myrm. sulcinodis*, *Myrm. rubida*, *Las. tuops*, встречающіеся въ борахъ).

### Рѣчные долины и культурные мѣстности.

Въ вышезложенномъ мы разобрали группировку муравьевъ по наиболѣе крупнымъ, характернымъ стациямъ, каковыми являются: лѣсъ, степь, пустыня и высокія области горъ. Для полноты этого разсмотрѣнія мы должны еще сказать о рѣчныхъ долинахъ и культурныхъ мѣстностяхъ.

*Рѣчные долины* не имѣютъ такого опредѣленного типа, какъ лѣсъ или степь, ибо въ ихъ предѣлахъ встрѣчаются и лѣса и луговые, травянистые пространства и пески, нерѣдко поросшіе сосновыми борами. Лѣса въ рѣчныхъ долинахъ растутъ на гривахъ или въ низменныхъ мѣстностяхъ въ видѣ уремъ и населены исключительно лѣсными формами, но только въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ въ лѣсахъ на перевалахъ. Въ такихъ уремахъ чрезвычайно обыкновененъ и обиленъ *Lasius niger*, живущій и въ пняхъ и въ холмикахъ. Затѣмъ весьма нерѣдки *Formica exsecta*, *Form. fusca*, *Las. fuliginosus*, *Myrmica laevinodis* и *ruginodis*. На травянистыхъ лугахъ можно сказать царятъ безраздѣльно *Las. flavus* и *Las. niger* въ своихъ неизмѣнныхъ холмикахъ. Къ нимъ часто присоединяются: *Tetram. caespitum*, иногда на югѣ вмѣстѣ съ *Strong. christophi*, рѣже *F. rufibarbis*, *Myrm. ruginodis*, *M. scabrinodis*, *Las. alienus*, *Las. mixtus*, даже *Form. fusca* и *F. sanguinea*. Для песковъ обычны *Form. cinerea* (typ. и *imitans*) и *Myrmica rugulosa*. Послѣдняя очень обыкновенна въ долинѣ средняго теченія Волги, гдѣ она поселяется не только на пескахъ, но и на иловатыхъ лугахъ.

*Lasius niger* на сырыхъ поемныхъ травянистыхъ лугахъ рѣкъ (особенно небольшихъ, какъ Свіяга, Б. Черемшанъ, Меша, Дёма и др.) нерѣдко воздвигаетъ рыхлые, высокіе, земляные холмики, подпираемые стеблями и листьями травъ, благодаря которымъ они только и удерживаются отъ разрушенія. Постройки эти однако въ первое время столь нѣжны и непрочны, что даже при слабомъ толчкѣ легко распадаются. Впослѣдствіи они осѣдаютъ и становятся болѣе плотными. Такія же постройки возводятся этимъ муравьемъ обыкновенно и послѣ сильныхъ, проливныхъ дождей. Непрочность и легкая разрушаемость такихъ гнѣздъ чернобураго лазіуса заставляетъ его часто менять ихъ и воздвигать новые, которыхъ ставятся обыкновенно тутъ-же поблизости. *Lasius flavus* такихъ рыхлыхъ, непрочныхъ и быстро сооружаемыхъ гнѣздъ не дѣлаетъ; его работы ведутся медленный и прочный. Иногда, въ очень рѣдкихъ случаяхъ, такие же непрочные, но только очень небольшихъ размѣровъ холмики устраиваютъ и нѣкоторыя мирмеки (*Myrm. rugulosa*, *M. laevinodis*).

Подъ терминомъ „культурная мѣстность“ я подразумѣваю мѣста поселенія человѣка съ прилежащими къ нимъ полями, огородами, садами, парками и усадьбами. На такихъ мѣстахъ во 1-хъ) остаются нѣкоторые изъ прежнихъ обитателей, аборигеновъ страны, приспособляющіеся къ новымъ условіямъ; во 2-хъ) поселяются новые колонисты, приходящіе вмѣстѣ съ человѣкомъ и часто совершенно вытѣсняющіе аборигеновъ. Встрѣчаются здѣсь и пришельцы изъ отдаленныхъ странъ, завезенные случайно человѣкомъ, поселившіеся въ его домахъ, сдѣлавшіеся его захребетниками. Виды второй категоріи представляютъ характерный примѣръ апойического распространенія.

Вообще формъ, свойственныхъ культурнымъ мѣстностямъ, не особенно много, какъ это видно изъ слѣдующаго списка:

*Formica fusca*

*F. cinerea*

*F. rufa*

*Lasius flavus*

*F. rufibarbis*

*L. umbratus*

<i>L. niger</i>	<i>T. caesp. v. reticuliventre</i>
<i>L. alienus</i>	<i>Cremastogaster subdentata</i>
<i>L. brunneus</i>	<i>Crem. subd. v. flavicapilla</i>
<i>L. emarginatus</i>	<i>Monomorium pharaonis</i>
<i>Camponotus ruzskii</i>	? <i>Stenamma asiaticum</i>
<i>C. fedtschenkoi</i>	<i>Aphaenogaster gibbosa v.</i>
<i>C. turkestanicus</i>	<i>muschtaidica</i>
<i>Tapinoma nigerrimum</i>	<i>Messor structor</i>
<i>Prenolepis vividula</i>	<i>M. barbarus</i>
<i>Plagiolepis pygmaea</i>	<i>Myrmica laevinodis</i>
<i>Solenopsis orientalis v. kasa-</i>	<i>M. ruginodis</i>
<i>linensis</i>	<i>M. scabrinodis</i>
<i>Tetramorium caespitum</i>	<i>Cardiocondyla elegans</i>

Изъ нихъ *Monomor. pharaonis* живеть исключительно въ домахъ; *Prenol. vividula* въ теплицахъ. Затѣмъ довольно обыкновенны также въ постройкахъ человѣка и около нихъ: *Lasius niger* (въ городахъ Европ. Россіи), *Las. brunneus*<sup>1)</sup> (Закавказье), *Las. emarginatus* (тоже), *Las. alienus* (на югѣ Россіи), *Tetram. caespitum* (повсюду), *Tetr. caesp. v. reticuliventre*, *Solenops. orient. v. kasalinensis* и *Cremast. subdentata* (всѣ три въ Туркестанѣ), *Tapinoma nigerrimum* и *Cremast. subd. v. flavicapilla* (въ Закаспійск. обл.), *Campr. ruzskii* (Уральск. обл.). Нѣкоторые изъ приведенныхъ видовъ, слѣдя за всюду за человѣкомъ, сдѣлались почти всемополитами (*Mon. pharaonis*, *Prenol. vividula*).

Изъ нашихъ мѣстныхъ муравьевъ особенно частымъ въ жилищахъ человѣка въ средней и восточной Европ. Россіи

---

<sup>1)</sup> Про *Lasius brunneus* К. А. Сатуинъ мнѣ писалъ, что во времѧ его пребыванія въ Ленкорани муравьи эти «едва его самого не сѣли»; когда онъ лежалъ больной въ одномъ домѣ, то «постель его превратилась положительно въ муравейникъ». Нѣчто въ этомъ родѣ испыталъ и я отъ *Lasius alienus*, когда мнѣ пришлось ночевать въ сакѣ одного изъ ауловъ Дагестана.

является темнобурый лазиусъ (*Lasius niger*); онъ поселяется не только въ пижилыхъ строеніяхъ (бани, амбары, сараи, ледники и пр.), но и въ домахъ, причемъ изъ послѣднихъ выбираетъ такие, въ которыхъ имѣются склады сахаристыхъ или мучнистыхъ веществъ, именно булочныя, пекарни, гастроonomicкіе магазины, мелочныя лавки и пр. Особенного вреда, впрочемъ, человѣку онъ не приносить; тѣмъ болѣе, что онъ не ограничивается обыкновенно жизнью исключительно въ домахъ, но имѣетъ и выходы наружу, посѣща сады, дворы, огороды, цвѣтники и пр.; только на пчельникахъ онъ дѣйствительно иногда можетъ быть непріятелемъ.

Нерѣдко также мѣстами въ строеніяхъ и домахъ средней и восточной Россіи *Tetramorium caespitum*.

Въ городахъ—на тротуарахъ, на улицахъ, около фундаментовъ домовъ и въ общественныхъ садахъ, кроме *Lasius niger* и *Tetram. caespitum*, можно часто встрѣтить *Formica rufibarbis* и *Las. alienus*; рѣже *Myrmica scabrinodis*, *Formica cinerea*, *Lasius umbratus* и *brunneus*. На югѣ, въ Закавказье, къ нимъ присоединяются *Pheidole pallidula*, *Messor structor* и *Cardiocondyla elegans*. Двухъ первыхъ я нерѣдко наблюдалъ гнѣздающими на улицахъ г. Тифлиса, а послѣдняя была очень обыкновенна въ городскомъ паркѣ Муштаидѣ (около Шелководственной станціи)<sup>1)</sup>. Перечисленными формами, конечно, не ограничивается контингентъ всѣхъ тѣхъ муравьевъ, которыхъ можно встрѣтить въ какой-либо давной культурной мѣстности; все здѣсь зависитъ отъ того, въ какихъ условіяхъ находится эта мѣстность и въ какой степени нарушенъ человѣкомъ и его жизнью въ ней первобытный характеръ. Въ заключеніе долженъ замѣтить, что условія жизни муравьевъ въ культурныхъ

<sup>1)</sup> Здѣсь *Cardiocond. elegans* бѣгала въ большомъ количествѣ по песчанымъ деревянкамъ цвѣтника и на тротуарахъ, но гдѣ именно гнѣздились, мнѣ не удалось отыскать. Тутъ-же выѣѣсть съ ней находились и *Pheidole pallidula* и *Lasius alienus*, гнѣздившіеся въ трещинахъ камней тротуаровъ. Въ ботаническомъ саду Тифлиса, кроме вышеуказанныхъ муравьевъ я встрѣтилъ еще *Myrmecoc. riaticus desertorum* и *M. cursor aeneascens*.

мѣстностяхъ и въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ человѣкомъ представляютъ несомнѣнныи интересъ, но во многихъ отношеніяхъ остаются совершенно не выясненными.

## Обзоръ мирмекологической фауны Россіи по участкамъ.

По характеру мирмекологической фауны территорія Россіи можетъ быть раздѣлена на слѣдующіе пять участковъ: Европейская Россія, Крымъ, Кавказъ, Сибирь и Туранъ.

**Европейская Россія.** Въ предѣлахъ Европейской Россіи найдено до сихъ поръ около 105 формъ муравьевъ. Большая часть изъ нихъ, именно свыше 60, встрѣчается также и въ Западной Европѣ, почему и мирмекофауна Европ. Россіи вноситъ на себѣ по преимуществу европейскій характеръ. Кроме того въ составѣ рассматриваемой мирмекофауны имѣются еще формы сибирскія и специальныя. Количество европейскихъ формъ составляетъ ок. 58%, сибирскихъ—ок. 6,5% и специальныхъ—13%. Затѣмъ нужно указать еще на присутствіе въ мирмекологической фаунѣ Евр. Россіи нѣкотораго количества формъ среднеазіатскихъ, какъ наприм. *Myrmec. foreli*, *Cardiocond. elegans* var. *uljanini*, *C. stambulovi* var. *koshevnikovi* и др., но онѣ живутъ на самой юго-восточной окраинѣ Евр. Россіи и всецѣло принадлежать Турану.

Формами специальными я пока называю такихъ, которые найдены были исключительно въ Евр. Россіи, если-же нѣкоторые изъ нихъ и идутъ за предѣлы ея, то во всакомъ случаѣ очень недалеко. Къ этимъ формамъ принадлежать слѣдующіе муравьи:

<i>Formica rufa</i> v. <i>meridionalis</i>	<i>Camponotus marginatus</i> ka-
<i>F. pressilabris</i> v. <i>rufoma-</i>	<i>mensis</i>
<i>culata</i>	<i>C. hercul. v. shitkovi</i>
<i>F. fusca</i> v. <i>gagatoides</i>	<i>Leptothorax melnikovi</i>

L. tub. kirillovi	Messor tataricus
L. nass. volgensis	M. structor v. clivorum
Mychothorax musc. flavescentia	Tetramorium caespitum v.
M. acervorum var. superus	ferox
Myrmica scabr. bessarabica	

Еще имются формы, которые найдены въ восточной Евр. Россіи и въ прилежащихъ къ ней частяхъ Азіи, какъ наприм. *Strongylogn. christophi*, *Myrmica sulcinodis* v. *nigripes*. Сверхъ того несомнѣнно также и нѣкоторыя изъ приведенныхъ въ спискѣ формъ современемъ найдутся въ Азіи, а *Form. rufa* v. *meridionalis* уже известенъ изъ Западной Сибири.

Чисто азиатскими формами въ фаунѣ Евр. Россіи изъ муравьевъ являются:

Camponotus p. saxatilis	F. clara
Formica uralensis	Leptothorax stipaceus
F. rufib. v. glauca	L. nassonovi

Онѣ принадлежать по преимуществу области Урала и востоку Евр. Россіи, гдѣ распространены спорадически.

Присутствіе азиатско-сибирскихъ формъ въ Европ. Россіи указываетъ на то, что ея мирмекофауна, сохрания въ общихъ чертахъ европейскій характеръ, въ тоже время на востокѣ не рѣзко ограничивается отъ Азіи. Къ тому-же нужно принять во вниманіе и то обстоятельство, что значительное количество формъ муравьевъ, общихъ Европ. Россіи и Европѣ, распространены также и въ Сибири.

На основаніи того, что намъ теперь известно о распределеніи муравьевъ въ Евр. Россіи, представляется возможность въ предѣлахъ ея выдѣлить или, точнѣе сказать, пока намѣтить слѣдующіе 6 районовъ или округовъ: сѣверный, западный, южный, центрально-восточный, Финляндію и Ураль.

*Сѣверный* районъ, занятый полосой тундръ, болотъ и тайги, отличается крайне бѣдной и однообразной мирмекофа-

уной. Для него можно считать характерными *Camponotus herculeanus v. shitkovi*, *Formica fusca v. gagatoides*, *Mychothrix acervorum*, живущихъ на окраинѣ тайги и тундры. По всей тайгѣ распространены и обильны въ ней: *Formica rufa*, *F. fusca*, *Camponotus herculeanus*, *Myrmecocystus laevinodis* и *M. ruginodis*. Но едва-ли этихъ муравьевъ тайга привела съ собой изъ Сибири; они по всей вѣроятности раньше ея жили въ древнихъ кругополярныхъ лѣсахъ, а съ приходомъ тайги свободно уживались и въ ней. Южная граница этого района проходитъ приблизительно черезъ сѣверную часть Пермской губ., Вятскую, сѣверные части Казанской и Нижегородской, затѣмъ слѣдуетъ по теченію Волги. Детально эта граница въ мирмекологическомъ отношеніи еще не можетъ быть установлена.

*Западный* районъ охватываетъ главнымъ образомъ При- вислинскій край и прилежащія къ нему губерніи съ Волын- ской и Киевской включительно, ограничиваясь на востокѣ приблизительно теченіемъ Днѣпра. Онъ характеризуется лѣсами западно-европейского типа, населенными такими формами, какъ *Temnothorax recedens*, *Ponera coarctata*, *Lasius emarginatus*, *Myrmecina graminicola*, *Stenamma westwoodi*, *Dolichoderus quadripunctatus*, *Camponotus marginatus*, изъ которыхъ однѣ восточнѣе, въ центральную Евр. Россію, не идутъ, другія встрѣчаются тамъ рѣдко. Но онъ распространены въ лѣсахъ южной полосы и на Кавказѣ. Нѣкоторыя, впрочемъ, проникли даже въ Сибирь и въ Туркестанъ, но во всякомъ случаѣ западное ихъ происхожденіе несомнѣнно.

*Южный* районъ Евр. Россіи представляетъ собою полосу степи, главнымъ образомъ черноземной, и южныхъ степныхъ лѣсовъ. Мирмекофауна его типично степная. Особенно характерными для этого района, мнѣ кажется, нужно признать *Myrmecocystus cursor caspius (aenescens)* и *Myrmica scabrinodis bessarabica*. Затѣмъ также несомнѣнно известный оттѣнокъ его мирмекологической фауны придаютъ: *Messor struttator* (var. *muticus*), *Camponotus lateralis* (var. *atricolor*, *merula*), *Camponotus vagus*, *Myrmecocystus lobicornis v. deplanata*, *Polyergus rufescens*, *Proformica nasuta*, *Formica cinerea v. imitans*. Мо-

жеть быть найдутся еще и другія формы послѣ болѣе подробныхъ изслѣдований. Для лѣсовъ этого окружка характерны: *Form. rufa v. meridionalis*, *Liomictus microcephalus*, *Mycloth. muscorum v. fagi*.

Центрально-восточный районъ заключаетъ въ себѣ центральную часть и востокъ Евр. Россіи до Урала. Это область широколиственныхъ (по преимуществу дубовыхъ) лѣсовъ и сосновыхъ боровъ. На югъ онъ занятъ черноземной степью, перемежающейся съ островами лѣсовъ, и незамѣтно переходитъ въ южный районъ. Для дубовыхъ лѣсовъ характерны *Leptoth. melnikovi*, *Camp. marginatus kamensis*, *Lasius fuliginosus* и др. Боры имѣютъ свою особую, специальную фауну, о которой мы уже говорили. Каменистая степь здѣсь, особенно на востокѣ Евр. Россіи, развита сильно и имѣетъ такихъ характерныхъ представителей, какъ *Messor tataricus*, *M. structor v. clivorum*, *Tetr. caespitum v. ferox*, *Solenopsis fugax orientalis*, *Plagiolepis rugulosa*, *Las. umbratus exacutus*. Кроме того своеобразный габитусъ мирмекофаунѣ названного района придаютъ *Lasius carniolicus*, *Strongylogn. christophi*, *Leptoth. tub. kirillovi*, *L. nass. volgensis*, *Camp. marg. ruzskii*, *Polyergus rufescens* и тѣ сибирскія формы, которые были указаны раньше. Эти послѣднія вмѣстѣ съ другими представителями сибирской фауны (изъ птицъ напр. *Emberiza aureola*, *Sturnus menzbieri*, *Milvus melanotis*) постепенно двигаются на западъ. Вообще про фауну центрально-восточного района Евр. Россіи нужно сказать, что она носить на себѣ замѣтный отпечатокъ Азіи: европейско-сибирскія формы тамъ часты и обыкновенны, западные же рѣдки или отсутствуютъ, не говоря уже про присутствіе цѣлаго ряда чисто азіатскихъ формъ. Отъ тайги этотъ районъ особенно мѣстами, вслѣдствіе уничтоженія ея (посредствомъ порубокъ и пожаровъ) и внѣдренія къ сѣверу формъ лиственныхъ лѣсовъ и отчасти степей, отличается не рѣзко.

Финляндія характеризуется довольно своеобразной мирмекологической фауной, имѣющей тѣсное соотношеніе съ фауной Швеціи и Норвегіи. Несмотря на свое сѣверное положеніе

эта страна гранита и сосны имѣеть среди представителей своей мирмекофауны значительное количество степныхъ формъ, составляющихъ почти 40% всего ея состава. Формы эти тамъ, очевидно, пріурочены къ сосновымъ борамъ. Имѣются тамъ также и типичные горные формы, каковы *Myrmica rufibarbis* и *sulcinodis*. Характеренъ для Финляндіи также *Tomognathus sublaevis*. Остальное количество населенія муравьевъ составляютъ въ большинствѣ случаевъ формы болѣе или менѣе обыкновенные, широкораспространенные. Всего до сихъ поръ въ Финляндіи, которую собственно говоря изучалъ (и то не всю) одинъ только Ниландеръ, констатировано 33 формы муравьевъ. Изъ нихъ особаго вниманія заслуживаютъ слѣдующія:

<i>Camponotus ligniperdus</i>	<i>F. rufibarbis</i>
<i>C. vagus</i>	<i>F. sanguinea</i>
<i>Lasius fuliginosus</i>	<i>Leptothorax tuberum</i>
<i>L. umbratus</i>	<i>Tomognathus sublaevis</i>
<i>L. alienus</i>	<i>Mycothorax muscorum</i>
<i>Polyergus rufescens</i> (остр. Балтійск. моря)	<i>Myrmica rubida</i>
<i>Formica truncicola</i>	<i>M. scabrinodis</i>
<i>F. pratensis</i>	<i>M. rugulosa</i>
<i>F. pressilabris</i>	<i>M. lobicornis</i>
<i>F. gagates</i>	<i>M. sulcinodis</i>
	<i>Tetramorium caespitum</i>

Такая пестрая комбинація формъ для столь сѣверной местности должна быть признана очень оригинальной.

Сюда же, повидимому, нужно причислить и *Form. exsecta suecica*, который хотя пока известенъ только съ острова Ально въ Ботническомъ заливѣ, но вѣроятно найдется и въ Финляндіи.

Изъ приведенного списка видно, что въ Финляндіи преобладаетъ мирмекофауна сосновыхъ боровъ, большая часть формъ которой являются также и типично степными. Кроме того тамъ встречаются и формы каменистой степи, но какъ

онъ тамъ распредѣлены и какой стаціи принадлежать, остается неизвѣстнымъ. Нужно думать, что большая часть изъ указанныхъ въ спискѣ формъ очень древняго происхожденія, что онъ сохранились въ Финляндіи со временемъ ледниковаго періода, а не пришли туда впослѣдствіи.

На Уралѣ извѣстно до сихъ поръ около 51 формы муравьевъ. Число это безъ сомнѣнія неполное, такъ какъ нужно принять во вниманіе, что въ мирмекологическомъ отношеніи болѣе или менѣе удовлетворительно изслѣдованы только нѣкоторыя мѣстности въ южной части Урала; кромѣ того имѣются сравнительно хорошия сборы изъ средней части; сѣверный Уралъ вовсе не изслѣдованъ.

Формы эти слѣдующія:

<i>Camponotus herculeanus</i>	<i>F. rufibarbis</i> v. <i>glaуca</i>
<i>C. ligniperdus</i>	<i>F. cinerea</i>
<i>C. pennsylvanicus saxatilis</i>	<i>F. cinerea</i> v. <i>imitans</i>
<i>Lasius flavus</i>	<i>F. sanguinea</i>
<i>L. flavus</i> v. <i>odoratus</i>	<i>Proformica nasuta</i>
<i>L. myops</i>	<i>Myrmecocystus cursor aenescens</i>
<i>L. myops</i> v. <i>flavoides</i>	<i>Tetramorium caespitum</i>
<i>L. umbratus</i>	<i>Formicoxenus nitidulus</i>
<i>L. mixtus</i>	<i>Tomognathus sublaevis</i>
<i>L. bicornis</i> v. <i>affinis</i>	<i>Leptothorax nassonovi</i>
<i>L. niger</i>	<i>L. tuberum</i> s. str.
<i>L. brunneus</i>	<i>L. tuberum</i> v. <i>nigriceps</i>
<i>L. alienus</i>	<i>L. tuberum stipaceus</i>
<i>Formica rufa</i>	<i>L. tuberum unifasciatus</i>
<i>F. truncicola</i>	<i>Myrchothorax acervorum</i>
<i>F. pratensis</i>	<i>M. acervorum</i> v. <i>nigrescens</i>
<i>F. uralensis</i>	<i>M. acervorum</i> v. <i>superus</i>
<i>F. exsecta</i>	<i>M. muscorum</i>
<i>F. exsecta</i> v. <i>rubens</i>	<i>M. muscorum</i> <i>flavescens</i>
<i>F. pressilabris</i>	<i>Myrmica laevinodis</i>
<i>F. fusca</i>	<i>M. l. ruginodis</i>
<i>F. gagates</i>	<i>M. scabrinodis</i>
<i>F. rufibarbis</i>	<i>M. sc. rugulosa</i>

M. lobicornis	M. sulcinodis v. nigripes
M. lobicornis v. deplanata	Strongylognathus christophi
M. sulcinodis	

Самыми многочисленными изъ формъ муравьевъ на Уралѣ, какъ это видно и изъ списка, являются формики, мирмики и лазіусы. Очень также обыкновенны *Myrmecothorax*'ы. Изъ формикъ рѣдокъ *Form. truncicola*. Изъ лазіусовъ болѣе часты формы желтаго лазіуса (*Las. flavius* s. ext.). Изъ кампонотовъ чрезвычайно обыкновеннымъ является *Catop. saxatilis*, принадлежащій главнымъ образомъ области скаль. и повидимому очень рѣдкимъ—*C. ligniperdus*, найденный экспедиціей гр. Зичи (111) около Балтыма близъ Екатеринбурга *Proformica nasuta*, *Strongyl. christophi* и черный бѣгунокъ (*Myrmec. acnescens*) принадлежать самымъ южнымъ частямъ Урала. *Lasius bicornis* v. *affinis* и *L. brunneus* должны быть очень рѣдки и спорадичны<sup>1)</sup>). *Lept. unifasciatus* на сѣверъ достигаетъ по крайней мѣрѣ до Екатеринбурга.

Азиатскія формы представлены на Уралѣ довольно хорошо, но большую частью встречаются на восточномъ его склонѣ. Для вторженія ихъ въ Европу Россію Уралъ не могъ представить особенныхъ преградъ и онъ дѣйствительно перешли его, продолжая распространяться къ западу. Изъ такихъ формъ нужно упомянуть про *Catop. saxatilis*, *Lept. nassonovi*, *L. stipaceus*, *Form. uralensis*, *Myrm. sulcinodis* v. *nigripes*; большая часть ихъ достигли до Волги. Точно также и многія европейскія формы, двигаясь на Востокъ, свободно переселялись за Уралъ въ Сибирь (напр. *Lept. tuberum* v. *nigriceps*, *Anerg. atratulus*); некоторые, дойдя до Урала, задержались тамъ (*Lept. unifasciatus*). Но *Polyergus ruf-*

<sup>1)</sup> Первый изъ этихъ лазіусовъ найденъ въ Соликамскомъ у. Пермской губ., на Уй-Ташѣ и въ Губерлинскихъ горахъ (въ каждой мѣстности только по 1 мѣстонахожденію). Второй былъ добытъ только въ одномъ пункте Урала, именно въ лѣсостепной области Красноуфимск. у., на Большой Татышной горѣ (см. 1 часть моей работы, стр. 291 и 312).

*scens* и *Dolichoderus quadripunctatus* не перешли черезъ Ураль. Такимъ образомъ въ настоящее время мы должны представить себѣ два миграціонныхъ потока формъ, восточныхъ и западныхъ, текущихъ одинъ на встрѣчу другому и сталкивающихся на Уралѣ.

Особенно характерными для Урала являются такие муравьи, какъ *Tomogn. sublaevis*, *Mychoth. acervorum* v. *superus* и *M. muscorum flavescens*. Это вѣроятно древнія формы, такъ какъ онѣ очень рѣдки на Уралѣ и спорадичны. Двѣ же послѣднія можетъ-быть окажутся эндемическими.

Уралъ вмѣщаетъ въ себѣ разнообразныя стаціи. Тамъ есть тайга, лиственные лѣса, сосновые и лиственничные боры, степь. Всѣ онѣ населены своими специальными формами. Наибольшаго развитія имѣетъ тайга, которой Уралъ занятъ на значительной части своего протяженія и которая спускается къ югу нѣсколько дальше 55° с. ш. Самая южная часть Урала, со включеніемъ Губерлинскихъ горъ, носитъ степной характеръ. Особеннаго вниманія заслуживаютъ на Уралѣ: 1) т. наз. лѣсостепная область, хорошо описанная ботаниками (Крыловъ, Гордягинъ, Коржинскій), но почти не изученная зоологами; 2) область утесовъ и скаль, развитая на вершинахъ хребтовъ и сопокъ. Для этой послѣдней области характерны: *Mychoth. muscorum* s. str., *M. m. flavescens*, *M. acervorum* (typ., v. *nigrescens*, v. *superus*), *Tom. sublaevis*, *Myrm. sulcinodis* (typ., v. *nigripes*), *Camp. p. saxatilis*, *Las. flavus*, *L. myops*, *L. alienus*; тутъ-же встрѣчаются *Myrm. ruginodis*, *scabrinodis* и *lobicornis*.

Мирмекологическая фауна Урала по своему составу и характеру имѣетъ много общаго съ таковой-же Финляндіи, что указываетъ на извѣстную связь, существующую между двумя этими мѣстностями. И мнѣ кажется, что эта связь сдѣлается еще болѣе очевидной, когда будетъ изслѣдована въ мирмекологическомъ отношеніи промежуточная полоса (главн. обр. Олонецкая и Вологодская губ.), лежащая между Ураломъ и Финляндіей. Весьма вѣроятно, что тогда прерывчатое распространеніе такихъ формъ, общихъ Уралу и Фин-

ляндії, какъ *Tomognathus sublaevis* и *Myrmica sulcinodis*, окажется просто случайнымъ, вызваннымъ лишь недостаткомъ изслѣдовавшій, такъ какъ можетъ статься, что онъ найдутся гдѣ-либо и въ вышеназванной промежуточной полосѣ.

**Крымъ.** Въ Крыму найдено до сихъ поръ 52 формы муравьевъ. Число это чрезвычайно мало и въ будущемъ должно значительно увеличиться, такъ какъ мирмекологическая фауна Крыма никѣмъ еще не была изслѣдована и всѣ имѣющіяся о ней свѣдѣнія основаны на случайныхъ сборахъ. Тѣмъ не менѣе даже и при столь скучныхъ данныхъ намъ известны 4 формы, найденные исключительно въ Крыму, именно: *Form. gagates* var. *muralewiczi*, *Leptoth. unifasciatus* var. *tauricus*, *Cremastog. auberti karawaevi* и *Messor capitatus* var. *jakowlevi*. Кроме того только изъ Крыма известна *Ponera ochracea*. Всѣ эти формы пришли въ Крымъ съ запада или юго-запада, т. е. малоазіатско-балканского происхожденія, и только *F. gag.* v. *muralewiczi* могъ выработать изъ типичнаго *gagates*, переселившагося въ Крымъ изъ южной Россіи, хотя онъ очень обыкновененъ и на Балканскомъ полуостровѣ. *Cremast. karawaevi* произошелъ изъ *Cr. auberti* typ., который хотя и неизвѣстенъ еще на Балканскомъ полуостровѣ, но найденъ въ Малой Азіи (Форель 936, стр. 189); на Кавказѣ же онъ не былъ встрѣченъ. *Ponera ochracea* также не известна еще съ Балканского полуострова, но по небольшой замѣткѣ Фореля (267, стр. 9) можно догадаться, что она водится въ Греціи.

Въ общемъ мирмекофауна Крыма обнаруживаетъ совершенно средиземноморскій характеръ. Съ Кавказомъ она имѣеть ок. 45 общихъ формъ; съ Балканскимъ полуостровомъ и Малой Азіей—ок. 42. Формъ, специально свойственныхъ Кавказу, въ ней пока не найдено. Всѣ же формы муравьевъ, общія Крыму и Кавказу, являются распространенными вообще въ Европѣ и въ частности въ Средиземноморской подобласти, откуда они проникли и въ Крымъ и на Кавказъ.

Въ послѣднее время былъ высказанъ взглядъ нѣкоторыми зоологами (А. П. Семеновъ-Тянъ-Шанскій, А. М.

Никольский),<sup>1)</sup> что Крымъ быль раньше въ соединеніи не съ Кавказомъ, а съ Балканскимъ полуостровомъ и носить на себѣ черты „балкано-малоазіатской природы“. По этому поводу долженъ замѣтить, что всѣ имѣющіяся данныя, хотя и очень еще недостаточныя, по мирмекофаунѣ названного полуострова не только не противорѣчать этому мнѣнію, но вполнѣ подтверждаютъ его. Что Крымъ долженъ быть отдаленъ отъ Европ. Россіи и считаться самостоятельнымъ зоологическимъ участкомъ,—въ этомъ, мнѣ кажется, нѣть сомнѣнія, такъ какъ и природа и фауна его, въ особенности горной части и южнаго берега, совершенно отличны отъ южной Евр. Россіи. Въ Крыму по крайней мѣрѣ имѣется 17 формъ муравьевъ, которая не известны изъ южной половины Евр. Россіи и большая часть которыхъ тамъ и не найдутся.

**Кавказъ.** Въ настоящее время на Кавказѣ известно 135 формъ муравьевъ. Изъ нихъ слѣдующія найдены пока исключительно на Кавказѣ:

<i>Camponotus aethiops</i> v. <i>gla-</i>	<i>Leptothorax corticalis</i> v. <i>korbi</i>
ber	<i>L. alpinus</i>
<i>Formica clara</i> v. <i>caucasica</i>	<i>L. serviculus</i> v. <i>brauneri</i>
<i>F. cinerea</i> v. <i>armenica</i>	<i>Myrmothorax muscorum</i> v.
<i>Cremastogaster subdentata</i>	<i>scamni</i>
v. <i>scaffrida</i>	<i>Aphaenogaster obsidiana</i>
<i>Cr. sordidula</i> v. <i>kosti</i>	<i>A. subterranea</i> v. <i>kurdica</i>
<i>Cardiocondyla bogdanovi</i>	<i>A. gibbosa</i> v. <i>muschtaidica</i>
<i>Solenopsis orbula</i> v. <i>latroides</i>	<i>Messor aegyptiacus</i> v. <i>incor-</i>
<i>Tetramorium caespitum</i> v.	<i>ruptus</i>
<i>splendens</i>	<i>Ponera coarctata</i> v. <i>lucida</i>
<i>Strongylognathus christophi</i>	
v. <i>rhebinderi</i>	

<sup>1)</sup> См. «Нѣсколько соображеній о прошломъ фаунѣ и флорѣ Крыма по поводу нахожденія тамъ горной куропатки (*Caccabis chukar* G. K. Gray), А. И. др. Семенова» (Записки Имп. Акад. Наукъ, т. VIII, № 6), 1899. Так же: А. М. Никольский, «Пресмыкающіяся и земноводные Российской Имперіи» (Записки Имп. Акад. Н., т. XVII, № 1) 1905.

Всего 18 формъ, изъ коихъ многія окажутся по всей вѣроятности эндемическими для Кавказа, такъ какъ представляютъ большую часть незначительныхъ вариаций чисто мѣстного характера. Большинство этихъ формъ принадлежитъ Закавказью. Для главнаго Кавказскаго хребта повидимому характерными являются *Arhaenog. obsidiana* и *Leptoth. alpinus*,--оба свойственные альпійской области Кавказа, причемъ первый идетъ по всему хребту. Изъ муравьевъ Закавказья заслуживаютъ вниманія: 1) *F. cinerea* var. *armenica* (изъ области Б. и М. Ааратовъ и озера Гокчи), довольно своеобразная и характерная для той мѣстности форма; 2) *Cardiocondyla bogdanovi*, принадлежащая къ интересной, открытой К. А. Сатунинымъ<sup>1)</sup>, фаунѣ песковъ около Арапыха; распространеніе этой формы по всей вѣроятности окажется болѣе обширнымъ, такъ какъ она, какъ и вся фауна Арапыхскихъ песковъ, туранскаго происхожденія (что и подтверждалось уже на другомъ оригинальномъ видѣ, первоначально добытымъ тамъ-же, именно *Leptothorax satunini*, который потомъ былъ найденъ въ Бухарѣ); 3) *Messor aegyptiacus* v. *incorruptus*, живущій въ нагорныхъ степахъ Закавказья и по всей вѣроятности представляющій самостоятельную расу; муравей этотъ интересенъ тѣмъ, что является на Кавказѣ выходцемъ изъ сѣверной Африки, гдѣ живетъ его типичная форма.

Остальная мирмекологическая фауна Кавказа заключаетъ въ себѣ формы различного происхожденія. Главнымъ образомъ она слагается изъ троекаго рода формъ: средиземноморскихъ, сѣверно-палеарктическихъ и среднеазіатскихъ (туранскихъ). Преобладающимъ элементомъ въ ней являются средиземноморскія формы, которые переселились на Кавказъ черезъ Малую Азію. Къ нимъ принадлежать большая часть кампонотусовъ, лептотораксы, формы родовъ *Cremastogaster*,

<sup>1)</sup> см. К. А. Сатуний, обзоръ изслѣдований млекопитающихъ Кавказскаго края. Отд. отт. изъ ХХІV кн. Записокъ Кавказск. Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ., Тифлисъ, 1903 г.

*Plagiolepis*, *Bothriomyrmex*, муравьи-фаэтончики, аеногастеры и мессоры, *Monomorium salomonis*, *Cardiocondyla elegans*, *Acantholepis frauendorfii*, *Tarinox nigerrimum*, *Pheidole pallidula*, *Tetram. semilaeve* и н. др. Формы эти свойственны преимуществу нижнему поясу лесовъ и степи.

Сѣверные формы пришли на Кавказъ изъ Европы чрезъ Балканскій полуостровъ и Малую Азію, на что, наприм., прямо указываетъ нахожденіе *Formica rufa*<sup>1)</sup> въ Закавказіи, въ борахъ Карской области, тогда какъ въ лѣсахъ сѣвернаго склона главнаго хребта онъ почти отсутствуетъ. Отчасти, впрочемъ, некоторые изъ сѣверныхъ формъ могли проникнуть на Кавказъ и непосредственно съ сѣвера, изъ Европы Россіи, но конечно только въ болѣе позднее время; это главнымъ образомъ формы, свойственные низкимъ степямъ и степнымъ лѣсамъ. Вообще нужно замѣтить, что представители сѣверной мирмекологической фауны сосредоточены на главномъ хребтѣ Кавказа, гдѣ онъ держится въ болѣе высокихъ областяхъ, именно въ верхнемъ поясѣ лѣсовъ, въ субальпійской и альпійской областяхъ. Здѣсь, въ особенности въ альпійской области Кавказа, гдѣ наряду съ типично горными муравьями (*Myrm. rubida*, *M. sulcinodis*) живутъ и такие, какъ *Lasius alienus*, *L. flavus*, *Formica fusca*, *Myrmothorax acervorum*, всѣ ея обитатели должны быть очень древнаго происхожденія: они несомнѣнно существовали здѣсь еще до ледникового периода. Къ сѣвернымъ формамъ Кавказа относятся большая часть представителей р. *Formica*, лазузы, мирмеки, *Tetram. caespitum*, михотораксы, *Catromotus herculeanus*, *Polyergus rufescens* и н. др.

Среднеазіатскіе формы проникли на Кавказъ изъ Туркана черезъ арабо-каспійскую пустыню съ сѣверо-востока или черезъ Персию съ юго-востока. Ихъ сравнительно не

---

<sup>1)</sup> Про этого муравья, столь обыкновенного въ лѣсахъ Европы Россіи и Западной Европы, нужно замѣтить, что на Кавказѣ онъ рѣдокъ и распространенъ не сплошь, а прерывчато, островками, и кажется главнымъ образомъ свойственъ сосновымъ борамъ.

такъ много и они попреимуществу распространены въ восточной области Кавказа, именно, въ прибрежной полосѣ Каспийскаго моря, въ Дагестанѣ и въ низменности восточнаго Закавказья, въ бассейнѣ Куры. Характерными представителями туранской мирмекофауны на Кавказѣ являются: *Catoponotus interjectus*, *Formica clara*, *F. transcaucasica*, *Myrmecocystus setipes* var. *turcomanicus*, *Cremastogaster subdentata*, *Leptothorax satunini* и *Myrmica bergi*. Изъ нихъ особеннаго вниманія заслуживаютъ *Formica clara* и *F. transcaucasica* — формы монгольского происхожденія. Первая пришла на Кавказъ черезъ Арабо-каспійскую пустыню и образовала тамъ особую разновидность (*v. caucasica*); а *F. transcaucasica* по-видимому проникъ на Кавказъ съ сѣвера, черезъ юго-западную Сибирь. На Кавказѣ его распространеніе недостаточно выяснено; принадлежитъ онъ тамъ вѣроятно горностепной и альпійской областямъ. Такимъ-же путемъ, очевидно, переселился на Кавказъ и *Leptothe. serviculus*, давъ тамъ разновидность *brauneri*<sup>1)</sup>. Изъ муравьевъ-фаэтончиковъ на Кавказѣ водятся два — туркменскій фаэтончикъ (*v. turcomanicus*) и пустынныій (*desertorum*), образующіе переходы между собою; изъ нихъ первый происходит отъ *Myrm. setipes*, распространенного въ Индостанѣ, Памирѣ и Персіи; а второй живетъ въ сѣверной Африкѣ, Абиссиніи и Сиріи. Оба эти фаэтончика встрѣчаются по побережью Каспійскаго моря и въ бассейнѣ Куры, не идя въ сѣверу кажется далѣе Дербента, и на Кавказѣ могутъ считаться характерными для восточнаго Закавказья.

**Сибирь.** Въ мирмекологическомъ отношеніи *Сибирь* пока можно раздѣлить на 2 части: Западную и Восточную. Изъ числа всѣхъ формъ муравьевъ, найденныхъ тамъ, именно ок. 80, на долю Западной Сибири приходится 64, на долю Вос-

<sup>1)</sup> Я предполагаю, что на Кавказѣ долженъ найтись со временемъ и *Myrmoxenus gordiagini* или близкій къ нему видъ, такъ какъ въ Дагестанѣ мною былъ пойманъ 1 ♂ муравья, оставшійся не опредѣленнымъ, но ближе всего подходившій къ р. *Myrmoxenus*. Я посыпалъ его Форелю и онъ согласился съ моимъ мнѣніемъ.

точной 47 формъ; но нужно принять во внимание, что Восточная Сибирь (особенно Уссурійскій край) въ отношеніи муравьевъ почти вовсе не изслѣдована и во всякомъ случаѣ мирмекологическая фауна должна быть гораздо богаче. Общихъ же формъ у обѣихъ частей Сибири имѣется 32.

Большая часть формъ Западной Сибири, простирающейся на востокъ приблизительно до Забайкалья, общія съ Европой и Европой. Формами специальными ей нужно считать слѣдующихъ:

<i>Camponotus p. saxatilis</i>	<i>L. servicus</i>
<i>Formica uralensis</i>	<i>Myrmica scabrinodis v. salina</i>
<i>F. rufibarbis v. glauca</i>	<i>M. scabrin. v. lacustris</i>
<i>Mutilloxenus gordiagini</i>	<i>M. sulcinodis v. nigripes</i>
<i>Leptothorax stipaceus</i>	<i>M. kasczenkoi</i>

Изъ нихъ *F. uralensis* и *M. kasczenkoi* распространяются до Забайкалья. На западъ большая часть этихъ формъ достигли Урала и отчасти перешли его; насколько-же далеко идутъ они на востокъ, остается въ точности не известнымъ. Изъ указанныхъ формъ наиболѣе широкораспространеннымъ является золотистоволосый кампонотусъ (*Campr. saxatilis*), который, хотя и проходитъ черезъ всю Сибирь, но наиболѣе характернымъ долженъ считаться именно для Западной Сибири, гдѣ онъ крайне обыкновенъ; въ Восточной-же Сибири онъ повидимому значительно болѣе рѣдокъ и даже вѣроятно спорадиченъ, сталкиваясь тамъ съ двумя близкими формами—*Campr. aterrimus* и *japonicus*. Нашъ *C. saxatilis* имѣть сородичей не только въ Азіи, но и въ Сѣв. Америкѣ, и трудно сказать, гдѣ у нихъ всѣхъ была первоначальная родина—въ Азіи или въ Сѣв. Америкѣ. По всей вѣроятности они всѣ ведутъ начало отъ древняго родича, имѣвшаго свой центръ происхожденія гдѣ-нибудь на сѣверѣ Сибири еще въ третичный періодъ, а потомъ отсюда съ наступлениемъ ледниковой эпохи постепенно двигавшагося на югъ и востокъ, распространявшагося по всей Сибири въ Манчжурію, Китай, Монголію, Индостанъ и въ Сѣв. Америку, распавшись при этомъ на цѣлый рядъ формъ.

Изъ нихъ *C. saxatilis* ближе всего стоитъ къ съвероамериканскому *pennsylvanicus* (typ.) и японскому (*japonicus*), особенно послѣднему, и еще предстоитъ решить вопросъ объ ихъ истинныхъ соотношеніяхъ; въ Восточной же Сибири по всей вѣроятности живутъ переходныя формы.

Съ Европой (исключая востокъ Европ. Россіи) у Западной Сибири имѣется ок. 37 общихъ формъ муравьевъ. Изъ нихъ нужно указать: 1) *Anergates atratus*, живущій въ гнѣздахъ *Tetram. caespitum* и открытый пока лишь въ одномъ пунктѣ Западной Сибири (Акмолинская обл.), — видъ весьма замѣчательный, крайне интересный по своимъ біологическимъ особенностямъ; въ Евр. Россіи онъ до сихъ поръ не былъ найденъ и не потому, чтобы онъ совсѣмъ не водился тамъ, а вслѣдствіе спорадичности его мѣстонахожденій и по трудности отысканія; можетъ-быть даже въ Сибири, по тщательномъ изслѣдованіи, онъ окажется формой отличной отъ европейской; 2) *Camponotus vagus*, который, будучи рѣдокъ и спорадиченъ на востокѣ Европ. Россіи, не встрѣчаясь ни на Уралѣ, ни въ Тобольской губ., нашелся послѣ значительного перерыва въ своемъ распространеніи въ Енисейской губ.; 3) *Lasius carniolicus*, распространеніе котораго въ Зап. Сибири вполнѣ подтверждаетъ его спорадичность. Остальные муравьи, общіе Западной Сибири и Европѣ, отличаются вообще широкимъ распространеніемъ и ничего замѣчательного не представляютъ.

Съ юга, именно съ юго-востока Европ. Россіи и изъ Киргизскихъ степей, въ Зап. Сибирь заходятъ: *Mutillus cursor aenescens* (*caspius*), *Tetram. inerme*, отчасти вѣроятно также *Strongylognathus christophi* и *Messor structor* (*v. muticus* и *orientalis*).

Къ Западной Сибири нужно относить и Алтай, представляющій въ отношеніи своей фауны вообще и мирмекофауны въ частности чрезвычайный интересъ, такъ какъ онъ по всей вѣроятности былъ центромъ распространенія какъ для западно-сибирскихъ формъ, такъ и для многихъ европейско-русскихъ, напр. *Formica uralensis*, *F. pressilabris*, *F. pratensis*, *Myrmecoxenus gordiagini*, *Leptothrix serviculus*, *Lasius carniolicus*,

*Mychothorax acervorum*, *Tomognathus sublaevis* и др. Алтай по своимъ условиямъ и по фаунѣ долженъ быть близокъ къ Уралу: тамъ, наприм., имѣются такие же паркообразные лѣса изъ березы и лиственницы, населенные *Form. pressilabris*, *F. exsecta*, *F. uralensis*, *F. pratensis*,—сосновые боры съ *Camp. herculeanus* и *saxatilis*,—скалистые склоны и сочки, на которыхъ юится своеобразная горно-степная мирмекофауна<sup>1</sup>). Ураль-же въ свою очередь, какъ это уже говорилось, связывается нѣ-которымъ образомъ съ Финляндіею и вотъ, при болѣе об-стоятельныхъ изслѣдованіяхъ, можетъ оказаться, что всѣ эти три области—Алтай, Ураль и Финляндія—представляютъ три послѣдовательные центра въ распространеніи и происхожденіи животныхъ формъ, двигавшихся изъ юго-запада Сибири въ Европ. Россію и Западную Европу.

Восточная Сибирь имѣетъ болѣе опредѣленно выраженную мирмекологическую фауну. Ей собственно принадлежать:

<i>Camponotus herculeanus</i> v.	<i>Dolichoderus sibiricus</i>
<i>whymperi</i>	<i>Tapinoma sessile</i>
<i>C. hercul. v. sachalinensis</i>	<i>Mychothorax hirticornis</i> v.
<i>C. aterrimus</i>	<i>sibiricus</i>
<i>C. quadrinotatus</i>	<i>Myrmica angulinodis</i>
<i>Formica truncicola</i> v. <i>yessensis</i>	<i>M. commarginata</i>
<i>F. sanguinea</i> v. <i>mollesonae</i>	

Сюда-же надо еще причислить *Formica fusca nipponeensis*<sup>2</sup>), водящагося въ Японіи.

Все это характерныя формы, изъ которыхъ три, именно *C. hercul. v. whymperi*, *Tapinoma sessile* и *Mych. hirtic. v. sibiricus*—съвероамериканского происхожденія. *Form. truncicola*

<sup>1</sup>) Интереснымъ между прочимъ фактомъ въ этомъ отношеніи пред-ставляется нахождение бѣлобрюхаго глухаря (*Tetrao urogallus uralensis* Menzb.) въ южномъ Уралѣ и на Алтаѣ.

<sup>2</sup>) Одинъ экземпляръ ♀ этой расы я получилъ недавно изъ окр. ст. Раздольное, Уссурійскаго края. Въ Манчжурии этотъ муравей очень обыкно-венъ.

*v. yessensis*, *C. hercul.*, *v. sachalinensis* и *C. aterrimus* являются переселенцами изъ Манчжурии или изъ Японии. Изъ нихъ *C. hercul.* *v. sachalinensis*, хотя въ предѣлахъ нашихъ владѣній известенъ только изъ Сахалина, но долженъ встрѣчаться также и въ Амурской и въ Приморской областяхъ, такъ какъ былъ найденъ въ Манчжурии и въ Монголіи (870).

Кромѣ того въ Восточной Сибири имѣется ок. 25 формъ, отличающихся вообще широкимъ распространеніемъ и встречающихся въ Европѣ; некоторые изъ нихъ не найдены еще въ Западной Сибири, наприм. *Lasius mixtus* и *brunneus*, но онѣ известны съ Урала и конечно со временемъ и тамъ найдутся. Довольно загадочно нахожденіе въ Приморской обл. (г. Владивостокъ) *Cremastogaster laestrygon* var. *striaticeps*, водящагося въ сѣверной Африкѣ; можетъ-быть онъ былъ случайно завезенъ туда съ товарами, такъ-же какъ и *Pheidole megacephala*.

Съ Сѣверной Америкой у Восточной Сибири пока известно ок. 15 общихъ формъ.

Къ области Восточной Сибири я отношу также и Забайкалье, хотя со временемъ его, какъ имѣющаго тѣсное сопотношеніе съ Монголіей, придется выдѣлить въ качествѣ отдельного округа. Пока для него известны три специальные формы: *Form. sanguinea v. mollessonae*, *Myrmica angulinodis* и *commarginata*, изъ которыхъ послѣдняя весьма характерна. Затѣмъ тамъ, конечно, найдутся и двѣ монгольскія формы—*Proformica nasuta mongolica* и *Messor lobuliferus*.

Туранъ. Область *Turana* я принимаю въ тѣхъ границахъ, какъ это сдѣлано проф. А. М. Никольскимъ въ его описаніи пресмыкающихся и земноводныхъ Россійской имперіи <sup>1)</sup>), т. е. я включаю сюда всю Закаспійскую и Тургайскую области и Киргизскую степь на СЗ до нижняго теченія Волги и Ергеней. Вѣроятно въ настоящее время намъ известно не болѣе половины всего состава мирмекологической фауны Турана, такъ какъ такие обширные районы его какъ Тянъ-Шань, Тар-

---

<sup>1)</sup> I. cit., стр. 459.

богатай и др. представляютъ въ мирмекологическомъ отношеніи *terra incognita*. Мнѣ лично на мѣстѣ пришлось познакомиться съ мирмекофауной Турана только въ Киргизской степи, представляющей его крайній форпостъ на западѣ; свѣдѣнія объ остальныхъ мѣстностяхъ его мы имѣемъ изъ сборовъ, сдѣланныхъ лишь болѣе или менѣе попутно различными натуралистами.

Мирмекологическая фауна Турана, состоящая въ настоящее время изъ 119 формъ, содержитъ въ себѣ главнымъ образомъ 4 группы формъ различного происхожденія. Однѣ формы принадлежать къ представителямъ Средиземноморской подобласти и отчасти проникли въ Туранъ съ запада черезъ Малую Азію, Мезопотамію и Персію; другія суть выходцы Индостана; третыи пришли съ востока, изъ пустынь Монголіи и Тибета; наконецъ, четвертые сибирскаго происхожденія—это формы сѣверныя, по преимуществу лѣсныя, степныя или горныя, переселившіяся въ Туркестанъ съ С и СВ изъ Сибири черезъ Алтай <sup>1)</sup>.

Къ первой группѣ, которая занимаетъ собственно Туркестанъ и Закаспійскую область, принадлежать такие виды и расы, какъ *Camponotus dichrous*, *C. aethiops*, *C. lateralis*, *C. fedtschenkoi*, *C. xerxes*, *Proformica nasuta*, *Myrmecocystus albicans*, *bicolor*, *setipes*, *altisquamis*, *pallidus*, *aenescens*, *Acantholepis frauendorfii*, *Plagiol. rugosa*, затѣмъ формы изъ родовъ *Bothriomyrmex*, *Tapinoma*, *Monomorium*, *Cardiocondyla* и *Pheidole*, *Messor structor*, *Cremastogaster auberti* и др.

---

<sup>1)</sup> Есть еще возможность допустить проникновеніе сѣверныхъ формъ (или покрайней мѣрѣ нѣкоторыхъ изъ нихъ) въ Туранъ, а затѣмъ и въ Индостанъ, съ запада, какъ и на Кавказъ, черезъ Балканскій полуостровъ, Малую Азію и сѣверную Персію, именно по горнымъ хребтамъ Эльбурсъ, Конетъ-Дагъ, Ала-Дагъ и Гиндукушъ, но до тѣхъ поръ пока все эти мѣстности не будутъ изслѣдованы въ мирмекологическомъ отношеніи, такое допущеніе останется крайне проблематичнымъ. Наконецъ, если даже вышеуказанные сѣверные формы муравьевъ и будутъ найдены на названныхъ хребтахъ, то все таки еще нужно будетъ доказать, что ониѣ дѣйствительно проникли туда съ запада, а не съ востока.

Вторую группу составляют *Myrmica rugosa*, *M. smythiesi*, *Camp. buddhae*, также *Camp. tichomirovi*, который ближе всего стоит к индийскому *C. pallidus* Sm.; все эти формы пришли изъ съверной Индіи, изъ области Гималаевъ, и свойственны Памиру и Семирѣчью. Къ формамъ индійского происхожденія нужно еще причислить *Pheidole megacephala*, если она дѣйствительно найдется въ Туркестанѣ, и затѣмъ *Monomorium gracillimum*, который проникъ въ Закаспійскую обл. изъ Индіи черезъ Персію; видъ этотъ отличается обширнымъ распространениемъ, но родина его вѣроятно находится въ южной Остъ-Индіи, откуда онъ и распространился къ югу на острова Тихаго океана и къ западу въ Африку черезъ Персію, Сирію и Аравію. *Lasius emeryi* и *flavescens* также повидимому имѣютъ своихъ ближайшихъ различий въ Индостанѣ; своей блѣдно-желтой или коричневато-желтой окраской они отличаются отъ всѣхъ другихъ европейскихъ сородичей *Las. niger* S. ext., къ группѣ котораго они принадлежать. Третья группа туранскихъ формъ центрально-азіатского происхожденія; она занимаетъ восточная окраины Турана, главнымъ образомъ Семирѣчье, куда ея формы проникли изъ Монголіи и можетъ быть Тибета. Къ нимъ относятся *Messor lobuliferus* v. *excursionis*, *Cremastogaster subdentata*, *Formica clara* и *Myrmica dschungarica*. Несомнѣнно найдется также въ Туранѣ и *Form. transcaucasica*.

Съверными выходцами въ Туранѣ являются: *Formica truncicola*, *F. pratensis*, *F. pressilabris*, *F. sanguinea*, *F. fusca*, *F. gagates*, *Camp. herculeanus*, *Lasius niger*, *L. alienus*, *Tetramor. caespitum*, *Myrcothorax acervorum*, *Myrmica ruginodis*, *laevinodis*, *scabrinodis* и *lobicornis*. Формы эти занимаютъ въ Туркестанѣ главнымъ образомъ степи, лѣса или высокія области горъ.

Кромѣ вышеуказанныхъ представителей мирмекофауны Турана мы здѣсь встрѣчаемъ и цѣлый рядъ эндемическихъ формъ, явившихся продуктомъ мѣстныхъ условій. Къ такимъ формамъ относится прежде всего группа тетраморіумовъ съ скульптированнымъ брюшкомъ (*Tetram. schneideri*, *T. stria-*

*tiventre*, *T. caespit.* v. *reticuliventre*). Для всей этой группы Туранъ былъ центромъ происхождения. Въ послѣдствіи отъ нея отдѣлился *Tetram. sericeiventre*, живущій въ Африкѣ. Затѣмъ сюда принадлежать: *Solenopsis deserticola*, *Ischnomyrmex rhabphidiiceps*, *Proformica aberrans*, *Leptothorax semenovi*, *L. satunini*, *Myrmecocystus pallidus*, *Myrm. foreli*, *Stenamma asiaticum*, *Monomorium barbatulum*, *Pheidole koshewnikovi*, *Myrmica bergi*, *M. stangeana*, *M. saposhnikovi* и цѣлый рядъ разновидностей. Многіе изъ этихъ муравьевъ успѣли распространиться изъ своего центра въ Персію, Малую Азію, на Кавказъ и въ Аравію. Нѣкоторые прошли въ другомъ направлении, именно на СЗ, до Сарепты.

Всѣ эти эндемическія формы нужно считать характерными для восточной части Средиземноморской подобласти, въ предѣлы которой входитъ Туранъ. Слѣдовательно всѣ восточно-средиземноморскія формы здѣсь образуютъ двѣ группы. Первая состоять изъ формъ, развившихся на западѣ, какъ, наприм., фаэтончики и др., которая оттуда потомъ переселились въ Туранъ черезъ Малую Азію и Персію; формы эти болѣе новыя. Другая группа представляетъ собою оборигеновъ страны, образовавшихся здѣсь давно изъ первоначальныхъ формъ, пришедшихъ въ Туранъ изъ Индіи и можетъ-быть отчасти уже вымершихъ. Эти отдаленные выходцы тропической Индіи въ очень древнее время черезъ Туранъ и восточный Индостанъ распространились повидимому и по всей Средиземноморской подобласти, давъ начало вмѣстѣ съ коренными ея формами всей современной средиземноморской мирмекофаунѣ.

Въ предѣлахъ Турана прежде всего выдѣляется Арабо-каспійская область съ такими характерными муравьями какъ *Myrm. foreli*, *M. pallidus*, *Solenopsis deserticola*, *Cardiocond. elegans* v. *uljanini*, *C. st. v. koshewnikovi*, *Myrmica bergi*, *M. stangeana*, *M. rugosa* v. *kirgisica*, *Leptothor. semenovi*, *Cremastog. subdentata* v. *flavicapilla*, *Monomor. barbatulum*, *Camp. turkestanus* и др.; затѣмъ—собственно Туркестанъ съ *Proform. aberrans*, *Stenamma asiaticum*, *Ischnomyrm. rhabphidiiceps*,

*Camp. turkestanicus*, *C. fedtschenkoi*; далъе—Семирѣчье съ *Messor lobuliferus* v. *excursionis*, *Myrm. dshungarica*, *M. saposhnikovi*, *Tetram. schneideri*; наконецъ Памиръ съ восточной Бухарой, для которыхъ весьма типичными являются: *Lasius emeryi*, *L. flavescens*, *Leptoth. oxianus*, *L. bulgaricus* v. *melleus*, *L. pamiricus*, *Myrm. laevinodis* v. *minuta*, *Cremastogaster bogojawlenskii*, *Prof. aberrans* v. *nitidior*, *Camp. fedtschenkoi* v. *mayri* и щетинистоногій фаэтончикъ (*Myrmecocystus setipes*). Конечно въ области Турана имѣются и другія характерные мѣстности, наприм. Тянь-Шань, но за неимѣніемъ нужныхъ данныхъ объ нихъ ничего нельзя говорить.

Заканчивая эту главу о мирмекологическихъ участкахъ Россіи, которые могутъ быть и общезоологическими участками, я долженъ замѣтить, въ заключеніе, что при описаніи ихъ я не могъ вдаваться въ какія нибудь детали по недостатку въ большинствѣ случаевъ необходимыхъ материаловъ. Объ очень многомъ приходилось лишь догадываться, многое обобщать на основаніи аналогій. Поэтому и вышеописанные участки я намѣтилъ только въ общихъ чертахъ, предоставивъ будущимъ изслѣдователямъ дополнить и развить сказанное здѣсь, равно какъ и исправить вкравшіяся ошибки.



## Четвертое дополнение къ списку литературы по муравьямъ.

965. Рузскій, М. Списокъ муравьевъ Минской губерніи, собранныхъ экспедиціей Московскаго студенческаго Кружка. Тр. Студ. Кружка при Московск. унив., т. III. 1907 г.
966. — Къ фаунѣ муравьевъ Виленской губерніи. Ibid. 1907 г.
967. Wheeler, W. M. A Collection of Ants from Britisch Honduras. Bull. of the Americ. Museum of Natur. History. Vol. XXIII, Art. 15, pp. 271—277. 1907. Plate XI—XII.



## Замѣченныя опечатки.

<i>Стр.</i>	<i>Строка.</i>	<i>Напечатано.</i>	<i>Слѣдуетъ читать</i>
10	16 сверху	крайне	крайне
15	16 "	manginatus	marginatus
22	4 снизу	Тибета	Тибета, Гималаевъ
23	4 "	mixtus	mixtus
25	18 "	<i>Lasius niger</i>	<i>Lasius niger</i> s. str.
30	6 сверху	распространенію	расширенію
41	2 снизу	<i>kurdica</i>	<i>var. kurdica</i>
55	11 сверху	ихъ какъ	ихъ, какъ
95	1 "	песчаниую	песчаную

Въ таблицѣ на стр. 33 пропущены нахожденія *Camp. aethiops* въ Туранѣ; на стр. 36—*Mutillacostata aeneoscapa* въ Сибири; на стр. 38—*Strongylognathus christophi* въ Туранѣ. Ошибочно указано нахожденіе *Camponotus ligniperdus* (стр. 33) и *Strongylogn. christophi* (стр. 38) въ Сибири.

*Примѣчаніе.* Въ спискахъ муравьевъ настоящей работы ради сохраненія места и въ виду того, что эта работа не имѣетъ систематического характера, въ большинствѣ случаевъ при обозначеніи подродовъ и расъ опущены ихъ родовые и видовые названія.

## Опечатки, пропущенные въ 1-й части работы.

<i>Стр.</i>	<i>Строка.</i>	<i>Напечатано.</i>	<i>Слѣдуетъ читать</i>
151	11 сверху	250	265
226	7 "	въ Сибири (Балтмъ).	въ среднемъ Уралѣ, Екатеринбургск. у. (Балтмъ).
243	5 снизу	половинѣ и	половинѣ апрѣля и
265	6 сверху	и голеней съ	и голени съ
—	7 "	и голеней безъ	и голени безъ
352	17 снизу	1900	1899
399	5 сверху	♀, ♂ и ♀	♀ и ♂
738	13 "	Булава 4 угольная	Голова 4 угольная
761	11 "	Bittel	Buttel

## ОГЛАВЛЕНИЕ.

Предисловие . . . . .	1— 2.
Третье дополнение къ списку литературы по муравьямъ . . . . .	3— 7.
Общій обзоръ мирмекологической фауны Россіи. 8— 27.	
Обзоръ распределенія русскихъ муравьевъ по стациямъ . . . . .	27—102.
Обзоръ мирмекологической фауны Россіи по участкамъ . . . . .	102—122.
Четвертое дополнение къ списку литературы по муравьямъ . . . . .	123.
Замѣченныя опечатки . . . . .	124.

---