

430 CLASS. III. SYNISTATA Ichneumon.

- corrusca*. 59. I. corpore artubusque atris, alis fusco, hyalinis. *Syst. Ent.* 336. 49. *Linn. Syst. Nat.* 2: 934. 31. *Fn. Sv.* 1606.
Habitat in Europa.
- fasciator*. 60. I. ater, abdomine fasciis tribus albis, alis apice fasciis.
Habitat in Italia. *D. Allioni*.
Parvus. Corpus nigrum, immaculatum abdomine foliis
fasciis tribus albis, quarum prima interrupta, tercias
remota fere analis.
- rufilator*. 61. I. niger, anterinis subtus, abdomine pedibusque qua-
tuor anticis rufis. *Syst. Ent.* 336. 50. *Linn. Syst. Nat.*
2: 934. 30. *Fn. Sv.* 1607.
Habitat in Europa.
- manifestator*. 62. I. ater, immaculatus, abdomine sessili cylindrico, pe-
dibus rufis. *Syst. Ent.* 336. 51. *Linn. Syst. Nat.*
2: 934. 32. *Fn. Sv.* 1608.
Ichneumon ater, pedibus rufis, setis ahi corpore duplo
longioribus. *Geoff. Inf.* 2: 323. 5.
Vespa Ichneumon tota nigra praeter pedes, qui crocei
sunt. *Raj. Inf.* 256. 19.
Musca tripilis, corpore tenui et praelongo, setis a cal-
da longissime excurrentibus. *Raj. Inf.* 261. 1.
Reaum. Inf. 6. tab. 29. fig. 16.
Degeer Inf. 1. tab. 36. fig. 9.
Schaeff. Icon. tab. 10. fig. 3.
Habitat in Europae locis glareosis.
- polycera*. 63. I. ater, abdomine linearis longissimo, tibialis posticis
clauatis. *Gen. Inf. Mant.* 254. *
Habitat in India. *D. Fothergill*.
- fuscator*. 64. I. nigro flavoque varius, abdomine clauato, vfringuis
lunulis flavis.
Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Xyats.*
Magnus. Antennae nigrae primo articulo flavo. Caput
nigrum, subtus orbitaque oculorum flavis. Thorax
nigro.

CLASS. III. SYNISTATA. Ichneumon. 431

nigro, flavoque variegatus. Abdomen clavatum, fuscum, lunulis lateralibus maculisque apicie flavis. Alacryalinae macula magna marginali fusca. Pedes flavi. Aculeus elongatus corpore duplo longior.

Later, ore pedibusque rufis, abdome petiolato. compun-
Syst. Ent. 336. 52. dor.

Ichneumon compunctor corpore atro immaculato, ab-
domine subpetiolato longo, pedibus rufis, palpis fe-
taceis. Linn. Syst. Nat. 2. 934. 33. Fn. Sv. 1609.

Ichneumon ater, pedibus rufis, fetis anti longitudine
corporis, abdomine laevi. Geoff. Ins. 2. 324. 6.

Schaeff. Icon, tab. 49. fig. 4.
Habitat in Europa, frequens in papilionum pupis.

66. I. niger, abdomine ferrugineo, primo segmento to- irritator.
to, reliquis punctis duobus nigris. Syst. Ent. 336.

Habitat in America. Mus. Dom. Banks.

67. I. niger, abdomine ferrugineo basi apiceque nigro, delutor.
pedum posticorum patellis foliis nigris. Syst. Ent.
337. 54. Linn. Syst. Nat. 2. 934. 34. Fn. Sv. 1609.
Habitat in Europae nemoribus.

68. I. niger, abdominis segmento secundo tertio quarto elonga-
pedibusque rufis, femoribus posticis nigris. Syst. Ent.
337. 55. *

Habitat in Anglia.

69. I. niger, abdominis segmento secundo tertio quarto, latrator.
ore pedibusque rufis, posticis nigris rufo annulatis.
Habitat in Anglia. Mus. Dom. Banks.

Affinis videtur praecedenti, at triplo minor. Os vti et
antennae subitus rufum. Abdomen petiolatum basi
apiceque nigrum. Pedes rufi postici nigri femori-
bus tibialisque basi rufis.

70. I. corpore nigro, abdomine ferrugineo basi apiceque titillator.
nigro, pedibus posticis nigris, plantis albis. Syst.
Ent. 337. 56. Linn. Syst. Nat. 2. 934. 35. Fn. Sv.
1611.

Habitat in Europa.

432 CLASS. III. SYNISTATA. Ichneumon.

venator. 71. I. niger, abdomine subfalcato basi subtus incarnata pedibus rufis. *Syst. Ent.* 337. 57.

Ichneumon venator corpore atro immaculato, abdomen basi subtus incarnata, pedibus rufis, aculeo retractili. *Linn. Syst. Nat.* 2. 935. 36. *Fn. Sv.* 1613.

Habitat in Europa.

fornicator. 72. I. ater, abdomine clavato fornicato immaculato, pedibus rufis.

Habitat in Italia. *D. Alfon.*

Magnitudo I. venatoris.¹¹ Corpus totum atrum.¹² Abdomen apice incrassatum subtus fornicatum. Pedes rufi plantis posticis nigris.

lineator. 73. I. ater, abdome petiolato, fronte flavo linea, pedibus anticus ferrugineis.

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus medium, totum atrum. Caput atrum fronte linearis duabus flavis vel potius orbita oculorum flau. Thorax immaculatus. Pedes quatuor anteriores ferruginei, postici nigri.

extensor. 74. I. niger, abdomine subcylindrico, pedibus rufis, aculeo corpore longiori. *Syst. Ent.* 337. 58.

Ichneumon extensor corpore nigro immaculato, abdome cylindrico, pedibus rufis, palpis setaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 935. 37. *Fn. Sv.* 1613.

Ichneumon linearis, antennis longitudine corporis, tentaculis setaceis, femoribus clavatis. *Geoff. Ins.* 2. 359. 86.

Habitat in Europa.

maculator. 75. I. niger, abdominis lateribus pedibusque rufis. *Syst. Ent.* 337. 59.

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Turionellae. 76. I. niger, pedibus rufis, tibiis posticis nigris albo annulatis. *Syst. Ent.* 338. 60.

Ichneumon Turionella niger, abdome cylindrico, macula alarum fusca albae inserta, tibiis posterioribus albo annulatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 935. 40. *Fn. Sv.* 1615.

Habitat in Phalaenarum larvis.

C D A S S . III . S Y N I S T A T A . I c h n e u m o n . 433

77. *I. niger*, aculeo corpore duplo longiore, pedibus fibrilibus lutescentibus, posticis tibiae digitoque nigris albo annulatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 935. 41. *Fn. Sv.* 1616.
Habitat in larvis Tiniae strobilellac.
78. *I. niger*, abdome petiolato comprepresso, pedibus pallidis, aculeo corpore subbreuiore. *Linn. Syst. Nat.* 2. 935. 42. *Fn. Sv.* 1617.
Habitat in aqua Ichneumonia strobilellac, qua consumata folliculum crano superfite inaequifaciat.
79. *I. ater*, abdome clavato breuissimo, aculeo cylindrico, pedibus posticis elongatis. *Saltator.*
Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
80. *I. ater*, abdome atrum exceptis solis tibiis anticus lemorumque basi testaceis. Abdome breue, compressum, petiolatum terminatus aculeo brevi, cylindrico, obtuso. Pedes postici elongati, nigri.
81. *I. ater*, abdомinis basi vtrinque puncto flavo, thora face postice bidentato. *oculator.* *Syst. Ent.* 338. 62. *Fn. Sv.* 1618.
Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
82. *I. niger*, pedibus flavis, abdome sessili cylindrico. *Refinellus.* incundo antennis basi luteis. *Syst. Ent.* 338. 62. *I. ater.*
Linn. Syst. Nat. 2. 936. 43. *Fn. Sv.* 1618.
Habitat in Phalaenae resinellae faruis.
83. *I. niger*, abdome oblongo, obfuso, ore pedibusque praerollidis. *Syst. Ent.* 338. 63. *Linn. Syst. Nat.* 2. 936. 44. *Fn. Sv.* 1619.
Habitat in Bombycis salicis larvis.
84. *I. niger*, abdome falcato, segmentis tertio quarto fomentaque basi flavescentibus, pedibus testaceis. *Syst. Ent.* 338. 64. *Linn. Syst. Nat.* 2. 936. 46.
Habitat in Europa boreali.
85. *I. niger*, abdомinis segmentis secundo tertioque ferrugineis, triangulo dorsali nigro. *Syst. Ent.* 338. 65. *I. ater.*
Habitat in Saxonie.

434 CLASS. III. SYNISTATA. Ichneumon.

- variegata*. 85. I. niger, thorace variegato, abdome clavato, fasciis
tor. tribus flavis. *Syst. Ent.* 339. 66. *
Habitat in Europa boreali.
- grauida*. 86. I. niger, abdominis primo segmento ferrugineo, ab-
domen dimidium obtegente. *Syst. Ent.* 339. 67. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 936. 48. *Fn. Sv.* 1622.
Habitat in Europa.
- inimica*. 87. I. niger, abdome falcato toto ferrugineo. *Syst. Ent.*
339. 68. *Linn. Syst. Nat.* 2. 936. 49. *Fn. Sv.* 1623.
Ichneumon niger, pedibus abdomeque ferrugineis.
Geoff. Inf. 2. 357. 80.
Reaum. Inf. 6. tab. 30. fig. 9.
Habitat in Europa.
- falcator*. 88. I. niger, thorace maculato, abdome falcato, segmentis
secundo tertio quartoque rufo. *Syst. Ent.* 339.
69. *
Habitat in Europa boreali.
- pagilla*. 89. I. thorace immaculato, abdome falcato, rufi ballo
apiceque nigro, pedibus tenuibus ferrugineis. *Syst.*
Ent. 339. 70. *Linn. Syst. Nat.* 2. 936. 50. *Fn. Sv.*
1624.
Ichneumon niger, abdome falcato, pedibus abdomini
nisque medio flavi. *Geoff. Inf.* 2. 332. 34. *Linnaeus*
Vespa Ichneumon major, et longior, abdome multo
tenuiore ligamento pectoriannexo. *Raj. Inf.* 255. 17.
Deger. Inf. 1. tab. 6. fig. 12.
Habitat in *Bombycis zigzag larvis*.
Frons macula flava.
- irrorator*. 90. I. ater, alis anticis apice nigris, puncto albo, abdo-
mine clavato, apice macula villosa aurea. *Syst. Ent.*
340. 71. *
Ichneumon ater, alis extremo fuscis, abdominis apice
villoso ferrugineo. *Geoff. Inf.* 2. 337. 36.
Habitat in Europa australiori.
- rufipator*. 91. I. niger, pedibus ferrugineis, femoribus clavatis, pes
fascis dentatis. *Syst. Ent.* 340. 72. *Linn. Syst. Nat.*
2. 937. 51. *Fn. Sv.* 1625.

2. *Ichneu-*

CLASS. III. SYNISTATA. Ichneumon. 435

Ichneumon niger, pedibus ferrugineis, femoribus posticis crassis denticulo armatis. *Geoff. Inf.* 2. 326. 12.

Habitat in Europa.

92. *I. niger*, abdomine falcato medio rufo, tibiis posticis clavatis basi apiceque albis. *Syst. Ent.* 340. 73.

Linn. Syst. Nat. 2. 937. 58. *Fn. Sv.* 1626. *depi*

Ichneumon totus niger, tibialis posticis clavatis, abdome

mine longo, tenui falcato. *Geoff. Inf.* 2. 328. 16.

Vespä Ichneumon thorace crasso nigro, abdome à lon-

go et tenuiori filamento incipiente et in caudam cras-

sam desinente. *Raf. Inf.* 2. 53. 52.

Degeer Inf. 1. tab. 36, fig. 10.

Mouff. Inf. tab. 12.

Reaum. Inf. 4. tab. 10. fig. 14.

Habitat in Apum Sphegumque larvis.

93. *I. niger*, abdomine falcato, maculis tribus lateralibus affecta-
rufis, tibiis posticis clavatis nigris. *Syst. Ent.* 340. 74. *tor.*

Ichneumon affectator niger, abdomine falcato, segmen-

to secundo, tertio quartoque latere rufis, tibiis po-

sticis clavatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 937. 53. *Fn. Sv.*

1627.

Ichneumon niger, tibialis posticis clavatis, abdome te-

nui falcato circa medium fulvo. *Geoff. Inf.* 2. 329. 17.

Scop. carn. 756.

Habitat in Europa.

94. *I. niger*, abdome flavo apice nigro, pedibus flavi. *necator.*
Gen. Inf. Mant. 252.

Raf. Inf. 2. *Vesp.* 4. tab. 4.

Habitat in Phalaenarum larvis, quas folliculis associatis,
numerofosis, albis obtengunt.

* * * * * Antennis luteis.

95. *I. luteus*, thorace striato, abdome falcato. *Syst. Ent.* *luteus.*
341. 75. *Linn. Syst. Nat.* 2. 937. 55. *Fn. Sv.* 1628.

Ichneumon corpore luteo falcato, oculis viridibus ni-

tidis. *Degeer Inf.* 2. 2. 169. 5. tab. 19. fig. 16. 17.

Ichneumon luteus totus. *Geoff. Inf.* 2. 330.

336 CLASS: III. SYNISTATA. Ichneumon.

Vespa Ichneumon major tota fulua, alis amplis, anterius
prioribus nota fulua: *Raj. Inf.* 253. 8. *Goed. Inf.* 2. tab. 37, et tab. 20. fig. 6.

Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 12.
tab. 10. fig. 4.

Sulz. Inf. tab. 18. fig. 118.

Habitat in Europae larvis, in noua Hollandia, Zelandia: *Mus. Dom. Banks.*

flavus. 96. I. luteus, vertice atro, abdome apice fusco. *Syst. Ent.* 341. 76.
Habitat in America. *D. v. Röhr.*

fuluus. 97. I. luteus, alis nigris. *Syst. Ent.* 341. 77.
Habitat in America. *Dom. Drury.*

atratus. 98. I. ater, capite pedibus strigaque anali flauis, aculeo longissimo.
Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Téats.*
Corpus magnum. Antennae luteae. Caput luteum mandibulis strigaque inter oculos nigris. Thorax ater, immaculatus. Abdomen compressum, clavatum, atrum, ultimo segmento margine flauo. Aculeus exsertus corpose triplo longior. Alae obscurae. Pedes flavi femoribus quatuor posticis atris.

dentatus. 99. I. niger flauo maculatus, scutello apice bidentato flauo, ano bidentato. *Iter Norwag.* d. 4. Aug. 1748.
Habitat in Norwagiae lucis. *Dom. Praep. Stroem.*

Morio. 100. I. ater, abdome falcato, alis cyaneis.
Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Banks.*
Magnus. Antennae luteae. Caput atrum fronte flauo maculata. Thorax et abdomen petiolatum falcatum, atra, immaculata. Alae omnes cyaneae apice fuscae. Pedes atri, antici testacei.

amictus. 101. I. niger, abdome falcato, antennis pedibusque ferrugineis. *Syst. Ent.* 341. 78.
Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

glauco-pterus. 102. I. luteus, pectoro nigro, abdome falcato, alis nigro. *Syst. Ent.* 341. 79. *Linn. Syst. Nat.* 2. 938. 67.
Fn. Sv. 1830. *Schaeff.*

CLASS. III. SYNISTATA. Ichneumon. 437

J. Schaeff. *Icon.* tab. 82. fig. 3.

Habitat in Europa.

103. *I. niger*, abdome falcato antice flauo, pedibus postcircumfles-
tis nigro geniculatis, scutello flauo. *Syst. Ent.* 341. *fig.* 20.
Linn. Syst. Nat. 2. 938. 59. *Fn. Sv.* 1631.

Habitat in Europa.

104. *I. flauus*, capite thoraceque maculatis, abdome puncta-
vtrinque punctis quinque nigris.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Medius. Caput flauum; macula verticis atra et in hac
sternata duo. Antennae paulo obscuriores. Tho-
rax flauus; macula dorsali punctisque duobus scutel-
li atris. Abdomen flauum segmentis 1. 3. 4. 5. 7.
vtrinque puncto magno atro. Pedes testacei; imma-
culati.

105. *I. niger*, antennis pedibusque ferrugineis, alis hya- formica-
linis, stigmate nigro. *Syst. Ent.* 342. 81. *Linn. Syst.* *Nat.* 2. 938. 61.

Habitat in praedio Dom. a Linné Hanmarby dicto.

106. *I. flavefcens*, abdome fascia atra, alis fusco macu- mutilla-
latis. *Syst. Ent.* 342. 82. *fig.* 7.

Habitat Hafniae.

107. *I. latera*, antennis pedibusque ferrugineis, alis albis, cinctus.
fasciis duabus nigris. *Syst. Ent.* 342. 83. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 938. 60. *Fn. Sv.* 1632.

Ichneumon niger, alis albis fascia duplice nigra poste-
riori majori. *Geoff. Ins.* 2. 359. 85.

Habitat in Europae hortis.

108. *I. niger*, abdome fascia ferruginea, alis fusco ma- fuscatus.
culatis.

Habitat in Germania. *D. de Hattorff.*

Statura praecedentis parua. Caput nigrum fronde fla-
uente. Thorax niger, immaculatus. Abdomen
nigrum fascia antica fulua. Pedes ferruginei.

438 CLASS. III. SYNISTATA. Ichneumon.

***** Minuti. Antennis filiformibus. Abdomine ouato, sessili.

muscari- 109. I. auratus, pedibus flauis saltatoriis. *Syst. Ent.* 342.
rum. 84. *Linn. Syst. Nat.* 2. 938. 62. *Fn. Sv.* 1636.
Deger. Inf. 1. tab. 32. fig. 19. 20.
 Habitat in larvis Muscarum aphidjuorarum.

Bedegua- 110. I. viridis nitens, abdome aureo. *Syst. Ent.* 432. 3.
ris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 939. 63. *Fn. Sv.* 1634.

Ichneumon antennis clavatis nigris, capite thoraceque
 viridi aureis, pedibus flauis, abdome aureo. *De-*
geer. Inf. 20. 186. 10.

Cynips thorace viridi aeneo, abdome aureo, seti
 ani corpore longioribus. *Geoff. Inf.* 2. 296. 1.

Roe. Inf. 3. tab. 53. fig. F. H.

Reaum. Inf. 3. tab. 41. fig. 13. 14.

Ab. Nat. Curios. Dec. 2. Ann. 2. obs. 10.

Blancard. Inf. 188. 12.

Habitat in larvis gallarum rosae, quercus.

gallarum. 111. I. fusco aeneus, abdome nigro, tibii pallidis. *Syst.*
Ent. 342. 86. *Linn. Syst. Nat.* 2. 939. 64. *Fn. Sv.*
 1638.

Habitat in Cynipedia quercus larvis.

Iuniperi. 112. I. auratus viridis, antennis nigris, alis hyalinis. *Syst.*
Ent. 342. 87. *Linn. Syst. Nat.* 2. 939. 65. *Fn. Sv.*
 1635.

Habitat in Tipulae iuniperinae larva.

Pupa- 113. I. auratus coeruleus, abdome viridi nitido, pedibus
rum. pallidis. *Syst. Ent.* 342. 88. *Linn. Syst. Nat.* 2. 939.
 66. *Fn. Sv.* 1636.

Cynips viridi sericeus, abdome aureo, pedibus pal-
 lidis chrysalidum papilionum. *Geoff. Inf.* 2. 395. 24.

Ichneumon *Antiopae.* *Scop. carn.* 765.

Reaum. Inf. 6. tab. 30. fig. 13. 14. 15

Merian. Inf. Europ. tab. 44, et 52.

Goed. Inf. 1. tab. 77.

Deger. Inf. Vers. Germ. 1. tab. 32. fig. 19. 20.

tab. 35. fig. 17.

Deger

CLASS. III. SYNISTATA. Ichneumon. 439.

Degener. Inf. 1. tab. 30. fig. 8.

Rösel. Inf. 2. Vespa. tab. 3.

Habitat in pupis Papilionum et Muscarum, quibus nux per exuta larua oua imponit.

114. I. auratus viridis, abdomine nigro, macula dorsali larua-purpurascente, pedibus flavis. *Linn. Syst. Nat. 2. 939.* 67. *Fn. Sv. 1657.*

Ichneumon antennis clavatis fractis, capite thoraceque viridibus, pedibus flavis, abdomine nigro, macula testacea. *Degener. Inf. 2. 194. 14. tab. 31. fig. 6. 7.*

Reaum. Inf. 2. tab. 36. fig. 9. 10. 11.

Habitat in Phalacnarum laruis.

115. I. auratus viridis, abdomine fusco, basi cingulo pal- *cynipedis.* *Lido.* pedibus flavecentibus. *Syst. Ent. 343. 89.* *Linn.*

Syst. Nat. 2. 939. 68. *Fn. Sv. 1639.*

Habitat in Cynipedium et Phalacnarum laruis.

116. I. nigro aeneus, abdomine coerulecente, pedibus *coccatum.* liuidis. *Syst. Ent. 343. 90.* *Linn. Syst. Nat. 2. 939.*

69. *Fn. Sv. 1640.*

Degener. Inf. 1. tab. 35. fig. 17.
Habitat in Europae Coccis.

117. I. niger, capite rufo, oculis viridibus. *Syst. Ent. 343. secalis.* 91. *Linn. Syst. Nat. 2. 939. 70.* *Fn. Sv. 1641.*

Habitat in laruis spicarum secalis.

Conf. Ichneumon agricolator niger, capite ferrugineo, abdomine sessili. *Linn. Syst. Nat. 2. 937. 54.* Mera huius videtur varietas.

118. I. niger, alis hirsutis, macula lunari nigra. *Syst. Ent. subcuta-* 343. 92. *Linn. Syst. Nat. 2. 940. 71.* *Fn. Sv. 1642.* *aeneus.*

Degener. Inf. 1. tab. 30. fig. 21.
Habitat in laruis subcutaneis.

119. I. niger, abdomine conico acutissimo, femoribus cla- *conicus.* uatis ferrugineis. *Syst. Ent. 343. 93.*

Habitat in Daniae nemoribus.

120. I. niger, pedibus ferrugineis. *Syst. Ent. 343. 94.* *Linn. globatus.* *Syst. Nat. 2. 940. 74.* *Fn. Sv. 1647.*

B c 4

Ichneu-

440 CLASS. III. SYNISTATA. Ichneumon.

Ichneumon niger, antennis filiformibus, pedibus ferrugineis, abdomine virescente. *Degeer Inf.* 2. 176. 6. tab. 29. fig. 13. 14.

Ichneumon serico conglobato albo. *Geoff. Inf.* 2. 320. 1. *Vespa Ichneumon crucigera parua*. *Raj. Inf.* 255. 13. *Merlan. Europ.* tab. 22.

Frisch. Inf. 6. tab. 10.

Reaum. Inf. 2. tab. 35. fig. 5. 6.

Derham theod. 8. cap. 6. n. 1.

Habitat in culmis intra folliculum communem, bombycinum; subrotundum, album.

glomera- 121. I. niger, pedibus flauis. *Syst. Ent.* 344. 95. *Linn.* *Syst. Nat.* 2. 940. 75. *Fn. Sv.* 1646.

Ichneumon serico conglobato flauo. *Geoff. Inf.* 2. 321. 2.

Vespa Ichneumon tripilis, antennis praelongis crucigera s. crucae brasiliariæ. *Raj. Inf.* 254. 12.

Geodec. Inf. 1. 59. 11.

Reaum. Inf. 2. tab. 33. fig. 2. 7. 8.

Merian. Europ. tab. 48.

Degeer Inf. 1. tab. 16. fig. 6.

Roeß. Inf. 2. *Vesp.* 4. tab. 3. a. b.

Habitat in Papilionum larvis: excuntes proprios folliculos flauos nequant. intra quos excluduntur.

Aphidum. 122. I. niger, ab domine basi pedibusque anticus genubus que posticis flauis. *Syst. Ent.* 344. 96. *Linn.* *Syst. Nat.* 2. 940. 72. *Fn. Sv.* 1643.

Ichneumon niger, antennis filiformibus, ore flauescente, pedibus variegatis. *Degeer Inf.* 2. 179. 8.

Ichneumon Aphidum. *Geoff. Inf.* 2. 322. 4.

Frisch. Inf. 11. tab. 19.

Habitat in Europas aphidibus.

Ousilio- 123. I. niger, pedibus rufis, antennis filiformibus longioribus. *Linn.* *Syst. Nat.* 2. 940. 73. *Fn. Sv.* 1644.

Degeer Inf. 1. tab. 35. fig. 11. 12. 13.

Habitat in glossatorum ouis.

Conf. Schrank. Beytr. tab. 2. fig. 13. Vix differt, at pedes nigri.

CLASS. III. SYNISTATA. Ichneumon. 441.

124. *I. atter, antennis ramosis.* *Linn. Syst. Nat.* 2. 941; *pedini-*
cornis.
77. Fn. Sv. 1647.
Degeer Inf. 1. tab. 35. fig. 3; 4-5.
Añ. Hohn. 1740. 4. 64. tab. 1. fig. 4—6.
Habitat in larvis subcutaneis B. quercus.
125. *I. viridis, antennis ramosis.* *ramicor-*
Degeer Inf. 2. 2. 290. 16. tab. 31. fig. 14.
Eulophus. Geoff. Inf. 2. 312. 1. tab. 15. fig. 3.
Habitat in Phalaenarum larvis.
Singularis ob antennas ramosas, vix tamen propriis ge-
naris.
126. *I. apterus niger, pedibus rufis.* *Syst. Ent.* 344. 97. * *agilis.*
Ichneumon apterus niger, corpore oblongo, antennis
pedibusque brunndis. *Degeer Inf. 2. 2. 293. 17. tab.*
31. fig. 18.
Habitat in larvis Ichneumonis aphidum Succiae.
127. *I. apterus niger, abdomine antice pedibusque ferrugineis.* *ferritans.*
Ichneumon apterus niger, abdomine ovali oblongo,
antennis pedibusque rufis. *Degeer Inf. 2. 2. 205.*
18. B.
Habitat in Succiae hortis.
128. *I. apterus rufus, capite abdomeque postico nigris.* *Acaro-*
Syst. Ent. 344. 99.
Mutilla Acarorum. *Linn. Syst. Nat.* 2. 968. 9. *En-*
Sy. 1729. 5.
Ichneumon apterus rufus, capite, antennae abdomeque
postico nigris. *Degeer Inf. 2. 2. 206. 19. tab. 31.*
fig. 19, 20.
Habitat in Europae borealis Circulionum larvis.
Pedes ferruginei.
129. *I. apterus niger, abdomine rufo basi apiceque nigro.* *pedestris.*
Syst. Ent. 344. 100.
Habitat in Succiae hortis.
130. *I. apterus rufus, capite abdomeque nigris.* *Syst. formica-*
Ent. 345. 101.
rius.

442 CLASS. III. SYNISTATA. Euania.

Mutilla formicaria. Linn. Syst. Nat. 2. 968. Ed. 10. Pl. 1728.

Habitat in Sueciae hortis.

III. EVANIA.

- appendigaster*. 1. E. atra, abdomine petiolato breuissimo dorso thoracis imposito. Syst. Ent. 345. 1.
Sphex appendigaster atra, abdomine petiolato breuissimo, pedibus posticis longissimis. Linn. Syst. Nat. 2. 943. 12.
Ichneumon niger, abdomine breuissimo compresso truncato, petiolo longo thoracis dorso imposito, pedibus posticis longissimis. Deger. Inf. 3. 594. 1. tab. 30. fig. 14.
Reaum. Inf. 6. tab. 31. fig. 13.
Brown Iam. tab. 44. fig. 6.
Habitat in Europa australi, capite bon. sp., in noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.
maculata. 2. E. thorace maculato, abdominis primo segmento punctis duobus, secundo margine albis. Syst. Ent. 345. 2.*
Habitat in Anglia. Mus. Dom. Banks.

III. SPHEX.

* Abdomine petiolato.

- sabulosa*. 1. S. nigra hirta, abdominis petiolo biarticulato, segmento secundo tertioque ferrugineis. Syst. Ent. 346. 1.
Linn. Syst. Nat. 2. 941. 1. Fn. Sv. 1648.
Sphex nigra; antennis filiformibus, petiolo elongato, alis fuscis, abdomine antice rubro. Deger. Inf. 2. 2. 148. 4. tab. 28. fig. 27.
Ichneumon niger, abdomine fulvo postice nigro; petiolo longissimo. Geoff. Inf. 2. 349. 63.
Scopol. carn. 770.
Frisch. Inf. 2. tab. 1. fig. 6. 7.
Sulz. Inf. tab. 19. fig. 120.
Schaeff. Icon. 83. fig. 1.
Habitat in Europae terra sabulosa; ubi canis instar pedibus anterioribus cuniculum fodit Iaruamque Phalacrae.

CLASS. III. SYNISTATA. *Sphex.* 443

laenae L. Araneæ semimortuam iti eos sepelit, cui ouulum concretum, quo factum orificium terra claudit. *Linn.*

4. *S. nigra*, abdome rufo, petiolo maculaque dorsali n. *Thomae.*
gris. *Syst. Ent.* 346. 2. *
Habitat in Insula Thomæ Americis.
3. *S. nigra*, labio, ano pedibusque ferrugineis, *haemorrhoidalis.*
Habitat in Africa aequinoctiali. *Muf. Dom. Banks.*
Magnitudo et statura *S. pensylvanicae.* Antennæ nigrae basi ferrugineas. Caput nigrum labio ferrugineo. Thorax hirtus, ater, immaculatus. Abdomen glabrum, atrum ano siue ultimo segmento rufo. Pedes ferruginei femoribus basi nigris. Alae subcyaneæ.
Sphex nigra, alis violaceis apice fuscis, abdominis petiolo filiformi, maxillis longissimis incurvatis. *Deger. Inf.* 3. 586. 2. tab. 30; fig. 2.
Habitat in Pensylvania, in noua Hollandia. *Muf. Dom. Banks.*
4. *S. nigra*, abdome petiolato atro, alis subviolaceis. *pensylvanica.*
Syst. Ent. 346. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 941. 3. *Amoen. acad.* 6. 412. 89.
Sphex nigra, alis violaceis apice fuscis, abdominis petiolo filiformi, maxillis longissimis incurvatis. *Deger. Inf.* 3. 586. 2. tab. 30; fig. 2.
Habitat in Pensylvania, in noua Hollandia. *Muf. Dom. Banks.*
5. *S. cyanea*, alis albis apice fuscis, antennis nigris. *Syst. violacea.*
Ent. 346. 4. *
Habitat ad Cap. bon. sp.
6. *S. coerulea*, alis cyaneis apice fuscis, antennis nigris. *cyanea.*
Syst. Ent. 346. 5.
Sphex coerulea, alis fuscis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 941.
2. *Amoen. acad.* 6. 412. 90.
Sphex coerulea nigra, coeruleo nitida, antennis nigris, alis fusco violaceis, abdominis petiolo elongato. *Deger. Inf.* 3. 589. 6. tab. 30; fig. 6.
Habitat in America boreali.
7. *S. cyanea*, abdome atro, femoribus posticis rufis. *femorata.*
Habitat in Italia. *D. Allioni.*
Media Caput cyaneum antennis nigris. Thorax cyanus, nitidus. Abdomen petiolatum, atrum, nitidum. Alae subferrugineæ. Pedes nigri femoribus posticis rufis.

444 CLASS. III. SYNISTATA. Sphe.

tibialis. 8. *S. hirta nigra cyaneo nitida, tibiis posticis ferruginea, alis nigris.*

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Media. Antennae nigrae basi ferruginea. Caput atrum, corpus hirtum, nigrum, cyaneo nitidum. Pedes quatuor postici ferruginei femoribus nigris. Alae nigrae.

flavipes. 9. *S. laevis atra, pedibus flavi, femoribus nigris.*

Habitat in America. *Dom. Blackburn.*

Magnitudo *S. cyaneae.* Caput fuscum antennis nigris.

Thorax niger puncto flavo ante alas. Abdomen petiolatum, atrum, nitidum, immaculatum. Alae fuscocaudentes. Pedes flavi femoribus nigris.

Figulus. 10. *S. laevis atra, abdomine petiolato, labio segmentorumque marginibus lucidis.* *Syst. Ent.* 347. 6. *Linn.*

Syst. Nat. 2. 942. 11. *Fn. Sv.* 1650.

Habitat Vpfaliae in parietum lignorum foraminibus.

Larua apoda, pallida.

funata. 11. *S. abdomine petiolato nigro, primo segmento lunula flava.* *Syst. Ent.* 347. 7. *

Sphex asiatica ferruginea, thorace variegato, abdominis petiolo macula vtrinque ad basin flava. *Linn.*

Syst. Nat. 2. 942. 3. *Mus. Lud. Vlr.* 405. ?

Sphex flavo maculata nigra, alis fuscis, abdominis petiolo longissimo, thorace abdominalisque basi pedibusque flavo maculatis. *Deger Inf.* 3. 580. 4. tab. 30. fig. 4.

Sphex caementaria. *Drury Inf.* 1. tab. 44. fig. 6—8.

Habitat in Antigua Insula.

fervens. 12. *S. nigra, abdomine petiolato ferrugineo, alis fuscis.*

Syst. Ent. 347. 9. *Linn.* *Syst. Nat.* 2. 942. 6. *Mus.*

Lud. Vlr. 406.

Habitat in India.

Abdominis petiolorum niger,

jamaicensis. 13. *S. abdomine petiolato nigro, segmento primo toto rufi liquis margine flavi.* *Syst. Ent.* 347. 10. *

Habitat in Iamaica Insula.

14. *S. nigra*, capite petioli basi pedibusque ferrugineis. *erythrocephala.*
 Habitat in Malabar. *Mus. Dom. Banks.*
Satura S. spirificis, at paullo maior. Antennae fuscae
 basi ferrugineae. Caput ferrugineum maxillis apice
 atria. Thorax hirtus, ater, lobo antico puncto que
 ante alas ferruginosis. Abdomen longe petiolatum,
 atrium, petiolo dimidiato ferrugineo. Pedes ferru-
 ginei. Alae cyaneae.
15. *S. atra*, thorace hirto immaculato, petiolo vniarticu- *spirifex.*
 lato flavo, longitudine abdominalis. *Syst. Ent.* 347. II.
Linn. Syst. Nati. 2. 942. 350. 1.
Reaum. Inj. 6. tab. 28. fig. 5;
Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 11.
Suter-Hell. Inj. tabl. 7. fig. 2.
S. Sphex aegyptia nigra; petiolo abdominalis pedum-
 que articulatis flavis. *Linn. Syst. Nati.* 2. 942. 10.
Mus. Lud. Vir. 406.
 Habitat in Europa australi; Aegypto, in cylindris spirali-
 bus sub testis.
16. *S. nigra*, thorace hirto maculato, abdominalis petiolo *madra-*
spatana.
 Habitat in Malabar. *Mus. Dom. Banks.*
Affinis S. spirificis, at triplo minor. Caput cum anten-
 nis nigrum labio pube argentea. Thorax hirsus, ni-
 ger, punctis duobus, anticus, vnico ante alas, lineola-
 que transversa loco scutellii flavis. Abdomen atrium
 petiolo elongato flavo. Pedes quatuor, anteriores flavi
 femoribus basi nigris, postici flavi, femoribus tibiis-
 que apice nigris.
17. *S. nigra*, thorace maculato, abdomine coerulecente, *clavus,*
 petiolo elongato rufo, fascia nigra. *Syst. Ent.* 348.
 12. o
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
18. *S. viridi cyanea*, thoracis lobo anteriore distincto, alis *lobata.*
 subferrugineis. *Syst. Ent.* 348. 13. *
- Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
19. *S. viridis nitida*, femoribus quatuor posticis compressa *compre-*
fus ferrugineis.
Habitat

446 CLASS. III. SYNSTATÆ. Sphex:

Habitat in Malabar. *Müf. Dom. Banks.*

Affinis *S. lobatae*, at triplo minor. Antennæ fuscae. Caput et thorax viridiacnea, nitida thorace antice attenuata lobo distincto. Abdomen petiolatum; ouatum, magis cyaneum. Pedes antici fusci femoribus in medio crassioribus. Postici quatuor cyanei femoribus compressis ferrugineis. Alae fuscae.

ichneumo. 20. *S. fulua*, abdomine nigro, basi ferrugineo. *Syst. Ent.* 348. 14.

Apis ichneumonea rostro corneo recto, abdomine petiolato, thoracis suturis auro nitentibus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 959. 36.

Apis antennis filiformibus, capite thoraceque nigris auro maculatis, abdomine brunneo, apice nigro, pedibus testaceis. *Degeer. Ins.* 2. 2. 105. tab. 32, fig. 13. Habitat in America meridionali.

Sphex. 21. *S. nigra*, abdominis petiolo femoribusque posticis in crassis flavis.

Chrysis sispes atra, abdomine brevissimo, pedibus posticis clavatis denticulatis rufis. *Syst. Ent.* 359. 15.

Sphex sispes. *Linn. Syst. Nat.* 2. 943. 13. *En. Sc.* 1657. *Vespa* femoribus posticis crassis globosis ferratis dentato donatis, abdominis globosi petiolo tenui longo. *Geoff. Ins.* 2. 380. 16.

Sphex signifex. *Sulz. Hist. Ins.* tab. 27. fig. 1.

Habitat in Europa australiori.

Forte propria generis animalculum. Antennæ ab hoc genere differunt. Femora postica clavata, dentata, flava, macula magna nigra.

punctata. 22. *S. flava nigro punctata* femoribus posticis clavatis dentatis, abdomine conico.

Habitat in Europa.

Singulare insectum hic colloco ad ulteriorem examinationem. Caput mihi deest. Thorax flavius punctis maculisque nigris. Abdomen subpetiolatum, rotundum, flavius apice nigritus. Pedes flavi, femoribus posticis globosis, dentatis, puncto apicis bascosque nigris. Alae albae immaculatae.

**Abdo-

* Abdomine sessili.

23. *S. nigra*, abdōmine apice ferrugineo, alis cyanis. *Syst. vespiformis.*
Ent. 348. 15. *
Habitat in Malabar. *Dr. Koenig.*
24. *S. atra* immaculata, alis nigris. *Syst. Ent. 349. 16. * morio.*
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
Varietatem vidimus finilliam fronte cinerascente articuloque primo antenarum ferrugineo.
25. *S. atra* cyanæ, thoraci lobo antico fulvo. *Syst. Ent. collaris.*
349. 17. *
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
26. *S. atra*, fronte thoracisque lobo antico flavis. *Syst. frontalis.*
Ent. 348. 18. *
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
27. *S. glabra* atra, abdōmine apice ferrugineo, alis albidis. *analis.*
Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*
Paullo maior *S. fusca*. Corpus totum atrum, immaculatum solis abdominis ultimis segmentis ferrugineis.
Alae albidas paullo cyaneo nitidae. *stygia.* 2. 2.
28. *S. glabra* atra, abdōmine apice ferrugineo, alis nigris. *fimilis.*
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Differt manifeste a praecedente duplo minore. Corpus totum glabrum, atrum ultimis duobus abdominis segmentis supra ferrugineis. Alae omnes obscurae, nigræ. Pedes nigri femoribus apice tibiisque ferrugineis.
29. *S. glabra* atra, abdōmine basi ferrugineo. *Syst. Ent. fusca.*
349. 19.
Sphex fusca atra laevis, abdōminis segmentis tribus anticis subferrugineis. *Linn. Syst. Nat. 2. 944. 16.*
Fn-Sv. 1652.
Sphex nigra, antennis filiformibus. *Degeer Ins. 2. 2.*
147. tab. 28. fig. 6. *Ins. 2. 2.*
Ichneumon ater, abdōmine subsessili, segmentis tribus anticis rufis, alis nigricantibus. *Geoff. Ins. 2. 854. 74.*

Vespa

Vespa Ichneumon maior, capite, thorace et pedibus nigris, abdominis anteriore parte rubra, posteriore nigra. *Raj. Inf.* 254. 9.

Goed. Inf. 1. tab. 58.

Habitat in Europae fabuletis, larvas attrahens, sepelient.

viatica. 30. *S. pubescens nigra*, alis fuscis, abdomine antice ferrugineo, cingulis nigris. *Syst. Ent.* 349. 20. *Linn.* *Syst. Nat.* 2. 943. 15. *Fn. SV.* 1651.

Sphex nigra hirta, antennis filiformibus, petiolo breui, alia fuscis, abdomine antice rufa, a posteriori nigra. *Degeer Inf.* 2. 2. 153. 6. tab. 28. fig. 16.

Ichneumon niger, abdominis segmentis tribus antice fuluis, alis nigris. *Geoff. Inf.* 2. 354. 74.

Flysch. Inf. 2. tab. 12. fig. 13.

Habitat in Europae fabuletis, larvas imposito duò sepiens.

angula- 31. *S. nigra*, fronte, thoracis itriga antica abdoinisque ta. segmentorum marginibus cinereis. *Syst. Ent.* 350. 21.*

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

nigra. 32. *S. nigra*, abdome sessili, segmentorum marginibus lucidis. *Syst. Ent.* 350. 22.

Habitat in Europae fabulosis.

punctum. 33. *S. nigra*, uno puncto albo.

Habitat in Italia. *D. Allioni.*

Parua. Duplo praecedente minor. Corpus totum nigritum. Abdomen terminatur puncto albo, paruo. Alae hyalinae, immaculatae.

gibba. 34. *S. nigra*, abdome ferrugineo, apice fuscis, laterantibus apice fuscis. *Syst. Ent.* 350. 23. *Linn.* *Syst. Nat.* 2. 946. 13. *Fn. SV.* 1658. *Scop. Carn.* 570.

Habitat in Europae fabuletis.

fasciata. 35. *S. nigra*, antennis rubis, alis albis, fasciis dubius fuscis. *Syst. Ent.* 350. 24.*

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

CLASS. III. SYNISTATA: Sphex. 449

36. *S. cinerea*, abdominis segmentis basi atris, apice fu- *cinerea*.
scis. *Syst. Ent.* 350. 25. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
37. *S. nigra*, abdominis segmento secundo ferrugineo. *tropica*.
Syst. Ent. 350. 26.
Sphex tropica nigra, oculis albis, abdominis segmen-
to secundo latiori ferrugineo. *Linn. Syst. Nat.* 2.
945. 27. *Mus. Lud. Vtr.* 408.
Habitat in America meridionali.
38. *S. thorace tomentoso aureo*, abdomine ferrugineo, *fugax*.
alis flavescentibus, fascia fusca. *Syst. Ent.* 350. 27. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
39. *S. ferruginea*, thorace postice aureo, alis flavescenti- *nitida*.
bus. *Syst. Ent.* 351. 28. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
40. *S. atra*, abdominis segmentis vtrinque puncto albo, *rufipes*.
alis apice fuscis. *Syst. Ent.* 351. 29. *Linn. Syst. Nat.*
2. 945. 29. *Fn. Sv.* 1659.
Habitat in Europae fabuletis.
Varietatem vidi thorace postice ferrugineo, vir tamen
distinctam.
41. *S. atra*, capite thoraceque rufis. *Syst. Ent.* 351. 30. *nigricor-*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.* *nis*.
42. *S. nigra*, abdomine rufo, apice atro, alis apice fuscis, *exaltata*.
puncto albo. *Syst. Ent.* 351. 31. *
Habitat in Europa.
43. *S. atra*, thorace antice fascia cinerea, abdomine rufo, *abdomi-*
alis apice fuscis. *Syst. Ent.* 351. 32. *
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.* *nalis*.
44. *S. nigra*, antennis, tibiis alisque testaceis, his apice *capensis*.
fuscis. *Syst. Ent.* 347. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 942. 4.
Mus. Lud. Vtr. 407.
Habitat in Africa.
45. *S. atra*, alis cyaneis. *sigrita*.
Habitat in Malabarria. *Mus. Dom. Banks.*
Fabr. Spec. Inf. *Ef.* *Statura*.

450 CLASS. III. SYNISTATA. Sphex.

- Statura et magnitudo omnino praecedentis. Corpus totum atrum, immaculatum. Alae cyaneae, nitidae.
- turcica.* 46. S. nigra, thorace antice fascia cinerea, abdomine rufo, alis nigris. *Syst. Ent.* 351. 33. *
- Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
- villosa.* 47. S. nigra, abdomine villoso testaceo, alis atris. *Syst. Ent.* 352. 34. *
- Habitat in Malabarica. *D. Koenig.*
- flava.* 48. S. atra, dorso anoque ferrugineis, alis flavis apice fuscis. *Syst. Ent.* 352. 35. *
- Habitat in India orientali.
- bicolor.* 49. S. atra, capite abdominis apice aliquo flavis, his apice fuscis. *Syst. Ent.* 352. 36. *
- Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- flavicornis.* 50. S. atra, labio antennis pedibusque ferrugineis. Habitat in Malabarica. *Mus. Dom. Banks.*
- Maior *S. ruficornis.* Caput nigrum labio antennisque totis ferrugineis. Corpus atrum, immaculatum. Alae cyaneae. Pedes ferruginei femoribus basi nigris. Tibiae posticae ferratae.
- ocellata.* 51. S. atra, pedibus testaceis, alis cyanis, anticis macula ocellari ferruginea.
- Habitat in Africa aequinoctiali.
- Magna. Antennae nigrae articulo primo crassiori piceo. Caput nigrum oculis pallidis oreque ferrugineo. Thorax et abdomen glabra, atra, immaculata. Alae omnes cyaneae, anticis macula media ferruginea puncto cyaneo. Pedes omnes testacei. Tibiae posticae ferratae.
- ruficornis.* 52. S. cyanea, antennis rufis, *Syst. Ent.* 352. 37. *
- Habitat in America meridionali.
- coerulea.* 53. S. coerulea, alis apice albicantibus. *Syst. Ent.* 352. 38. *
- Sphex coerulea* alis ferrugineis basi nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 947. 38.
- Sphex auripennis nigra coeruleo nitida, alis ferrugineo aurcis*

CLASS. III. SYNISTATA. Tiphia. 451

aureis basi nigris apice albicantibus, antennis apice ferrugineis. *Deger Inſ. 2. 2. 585. tab. 30. fig. 1.*
Sphex rubra. *Drury Inſ. 2. tab. 39. fig. 6.*
 Habitat in America meridionali.
 Variat alibi ferrugineis basi nigris, et nigris macula media ferruginea. Apex alarum semper albicat.

113. T I P H I A.

1. *T. nigra, femoribus quatuor posticis angulatis rufis, femorata.*
*Syst. Ent. 353. 1. **
 Habitat in Anglia.
2. *T. nigra, thorace maculato, abdomine fasciis quinque flavis, secunda interrupta.* *Syst. Ent. 353. 2. **
 Habitat in Europa, Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
3. *T. thorace nigro flavo vario, abdome flavo, variegata.*
 Habitat in Sibiria. *Pallas. Mus. Dom. Banks.*
 Media. Antennae nigrae. Caput nigrum ore flano fronteque pube argentea. Thorax niger margine antico macula magna ante alas scutelloque flavis. Abdomen flavum fascia vna alterave attra. Anus incurvus, atter.
4. *T. nigra, abdome vtrinque maculis quinque flavis, haemorano pedibusque rufis.* *Syst. Ent. 353. 3. ** *rhopidalis.*
 Habitat in America meridionali. *D. v. Rohr.*
5. *T. nigra, thorace macula dorsali rufa.* *Syst. Ent. 353. 4. ** *ephippium.*
 Habitat in America meridionali. *Dom. v. Rohr.*
6. *T. hirta nigra, thorace antice rufescente, abdominis radula, segmento secundo tertioque flavis.* *Syst. Ent. 354. 5. **
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
7. *T. nigra, abdome fasciis tribus flavis, ano pedibusque ferrugineis.* *Syst. Ent. 354. 6. ** *tricincta.*
 Habitat in America meridionali. *Dom. v. Rohr.*
8. *T. atra, thorace antice cinereo villoso, poslice retuso, collaris, alie cyaneis.* *Syst. Ent. 354. 7. **
 Habitat in Malabarria. *D. Koenig.*

Ff. T.

pedestris. 9. T. aptera nigra flavo variegata, thorace compresso.
Syst. Ent. 354. 8. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

II4. S C O L I A.

atratia. 1. S. hirta nigra, alis ferrugineis apice nigris. *Syst. Ent.*
 355. 1. *
 Habitat in America. *Dom. Drury.*

morio. 2. S. atra, alis cyaneis.
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Corpus medium atrum, immaculatum. Alae cyaneas,
 puncto paruo transuerso ad marginem crassorem
 alae anticae.

nigrita. 3. S. atra, alis albis, costa atra.
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura praecedentis, tota atra, immaculata. Alae omnes
 albæ in margine exteriori late atro, qui tamè in aliis
 posticis apicem haud attingit.

macula-ta. 4. S. hirta nigra, abdomine maculis quatuor fulvis. *Syst. Ent.*
 355. 2. *
Sphex maculata. Drury. Inf. 2. tab. 39. fig. 2.
 Habitat in America boreali.

flavifrons. 5. S. atra, fronte flava, abdomine maculis quatuor flavis.
Syst. Ent. 355. 3. *
Sphex bidens. Sulz. Hist. Inf. tab. 27. fig. 4.
 Habitat in Italia. *D. Allioni.*

omaculata. 6. S. hirta atra, abdomine maculis trium parium flavis.
ta. Habitat in Italia. *D. Allioni.*
 Statura omnino praecedentium, at paulo minor. Corpus atrum macula flava ante et pone oculos. Abdomen maculis sex flavis, quarum posteriorē fere cōcunt.

maculata. 7. S. hirta atra, abdomine maculis duabus luteis, antennis flavis.
ta. Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Teats.*
 Præcedentibus minor. Antennæ flavae primo articulo nigro. Corpus hirtum, nigrum. Maculae duae glabrae,

brac, Juteae in tertio abdominis segmento. Alae apice fuscæ.

8. S. hirta ferruginea, alis apice fuscis. *Syst. Ent.* 355. 4.* *ferruginea.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

9. S. hirta nigra, abdomine fasciis quatuor flavis. *Syst. radula.*
Ent. 355. 5.*

Sphex plumipes. Drury Ins. 1. tab. 44. fig. 5.
Habitat in America borealiji

10. S. cinereo hirta, abdomine cyaneo; fascijs quinque fasciata.
flavis.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Magna. Antennæ nigrae. Caput et thorax pubescens,
cineræ testa. Abdomen cylindricum, cyaneum, ni-
tidum fasciis quinque flavis, posterioribus obsole-
tioribus. Anus tridentatus. Alae fuscescentes. Pedes
hirti, fuscæ.

11. S. hirta atra, abdomine fasciis duabus flavis, alis cya- *cineta.*
neo atris. *Syst. Ent.* 356. 6.*

Sphex radula. Sulz. Ins. tab. 27. fig. 4.
Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*

12. S. hirta atra, vertice fulvo. *Syst. Ent.* 356. 7.* *verticalis.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

13. S. atra, abdomine punctis quatuor rufis, alis cyaneis. *apustula-*
to. Habitat in Malabaria. *Mus. Dom. Banks.*
Statura praecedentium tota atra. Abdominis segmen-
tum secundum et tertium exinde rufo, po-
steriori maior. Alae omnes cyaneæ, nitidae.

14. S. nigra, abdomine medio rufa apice nigro, punctis *5puncta-*
quinque albis.

Habitat in Germania.

Paria. Antennæ petiolatae, nigrae. Caput nigrum,
puncto paruo albo in orbita oculorum. Thorax ni-
ger. Antice vtrinque puncto albo. Abdominis segmen-
tum primum atrum, 2. 3. rufa, reliqua atra punctis
quinque albis 2. 2. 1. quorum duo intermedia mil-
gutissima. Pedes brues, nigri.

454 CLASS. III. SYNISTATA: Chrysis.

- 4guttata*. 15. S. atra, abdome punctis quatuor albis, aliis hyalinis.
Habitat in Germapiâ. Dom. de Hattorf.
Affinis S. coliae 4punctatae, at paullo minor. Antennae pes
tiolatae, nigrae, subtus ferrugineae. Caput nigrum frân-
te alba. Thorax niger, immaculatus. Abdomen
atrum, nitidum punctis vtrinque duobus transuersa-
libus albis. Alae hyalinae, immaculatae. Pedes nigri.
- 4punctata*. 16. S. atra, abdome punctis quatuor albis, aliis ferrugi-
tae, neo fuscis. Syft. Ent. 356. 8. *
Habitat in Italia.
- sexcincta*. 17. S. nigra flavo maculata, abdome atro, strigis sex
flavis. Syft. Ent. 356. 9. *
Habitat in America. Dom. & Rohr.
- interru-*
pita. 18. S. nigra cinereo hirta, abdome atro, fasciis sex fla-
uis, anticis tribus interruptis, ano tridentato.
Habitat in Italia. D. Allioni.
Affinis videtur S. coliae 7cinctae. Antennae nigrae. Caput
cinereo hirtum labio basi vtrinque lineola flava.
Thorax niger, cinereo pubescens, punctis tribus scut-
tellaribus flauis. Abdomen pubescens, atrum, fla-
sciis sex flauis, anticis tribus interruptis, quarto vtrin-
que puncto nigro. Anus dentibus tribus validis. Pe-
des nigri, tibiis quatuor anticis supra flauis. Alae
albidae costa anteriorum ferruginea.
- 7cincta*. 19. S. cinereo hirta, abdome coeruleento, fasciis septem
flavis, ano tridentato. Syft. Ent. 356. 10. *
Habitat in noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.

C H R Y S I S

- splendida*. 1. C. coerulea nitida, ano quadridentato. Syft. Ent. 357. 1.
Habitat in Malabarâ. D. Koenig, in noua Hollandia.
Mus. Dom. Banks.
Corpus totum coeruleum viridi coloris nicens.
- emarag-
dula*. 2. C. viridis nitida, ano sextentato coeruleo. Syft. Ent.
357. 2.
Habitat in America boreali. Mus. Dom. Banks.

CLASS: III. SYNISTATA. Chrysis 455

3. C. coerulea nitida, abdomine aureo, ano quadridentato coeruleo. *calens.*

Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo praecedentis. Antennae fuscae. Caput et

thorax coerulea, nitida scutello prominente conicauo.

Abdomen aureum nitidum ano coeruleo quadridentato. Pedes coerulei apice fuscus.

4. C. viridis nitens, abdomine vtrinque macula ocellari oculata. *aurata*.

ano sexdentato coeruleo. *Syst. Ent.* 357. 3.*

Habitat in Malabaria. *D. Koenig.*

5. C. viridis nitida, abdominis secundo segmento vtrinque *lyncea*.
ocello coeruleofcente, scutello prominulo acuto. *Syst.*

Ent. 357. 4. *

Habitat in Africa aequinoctialis. *Mus. Dom. Drury.*

6. C. glabra nitida, thorace abdominisque primo segmento *carnea*.
to viridibus, reliquis carnis, ano serrato. *Syst. Ent.*

357. 5. *

Habitat in Italia. *D. Allioni.*

7. C. glabra nitida, thorace abdominisque primo segmento *fulgida*.
todecoeruleis, reliquis aureis, ano quadridentato.

Linn. Syst. Nat. 2. 948. 7. *Fa. Sv.* 1669.

Habitat in Europa.

Paullo maior C. ignita.

Fons Oris. Silv. 1.

8. C. glabra nitida, thorace viridi, abdomine auro apice *ignita*.
quadridentato. *Syst. Ent.* 358. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2.

947. 1. *Fa. Sv.* 1665.

Chrysis viridis nitida, thorace postice coeruleo, abdo-

mine aureo quadridentato. *Degeer Ins.* 2. 2. 155. 1.

tab. 28. fig. 17, 18.

Vespis thorace viridi coeruleo, abdomine inaurato po-

ne cupido dentato. *Geoff. Ins.* 2. 382. 20.

Frisch. Ins. 9. tab. 10. fig. 1.

Sulz. Ins. tab. 19. fig. 121.

Schaeff. Elem. tab. 40.

Icon. tab. 74. fig. 7, 8.

Habitat in Europae muris.

F. f. 4

9. C.

456 CLASS. III. SYNISTATA. Chryfis.

- bidentata.* 9. C. glabra nitida, cyanea, thorace bidentato, abdomineque segmentis duobus primis aureis. *Syst. Ent.* 248. 7. *Linn. Syst. Nat.* 2. 947. 2.
Chrysis cyanea nitida, abdomine macula magna nigra, alis apice fuscis. *Degeer. Inf.* 2. 2. 159. 2. tab. 29. fig. 3-4.
 Habitat in Europa.
 Anus dentibus tribus brevissimis.
- fucinella.* 10. C. glabra viridis nitens, thorace fascia coecinea, abdomine aureo subtridentato. *Syst. Ent.* 358. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 947. 3.
 Habitat in Europa boreali.
- lucidula.* 11. C. glabra viridis nitens, thorace antice abdomineque aureis, ano integro. *Syst. Ent.* 358. 9. *1.
Vespa viridi coerulea, abdomine thoracisque antica parte tuberculatis. *Geoff. Inf.* 2. 382. 19.
Sphex nobilis. *Scop. carn.* 792.
 Habitat in Europa australiori.
- feruida.* 12. C. glabra aurea nitida, abdomine subtus atro.
 Habitat in Italia. *D. Allioni.*
 Parua magnitudine C. auratae. Caput, thorax, abdomen aurea, glabra, nitida, sub alis cyanea. Abdomen subtus atrum. Pedes atri.
- aurata.* 13. C. glabra nitens, thorace viridi, abdomine aureo, ano bidentato. *Syst. Ent.* 359. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 948. 4. *Fn. Sv.* 1666.
Vespa thorae viridi coeruleo, abdomine aurato, cupero pone inermi. *Geoff. Inf.* 2. 383. 27.
Schaeff. Icon. tab. 42. fig. 5. 6.
 Habitat in Europae muris.
- cyanea.* 14. C. glabra nitens, thorace abdomineque coeruleis, ano tridentato. *Syst. Ent.* 359. 11. *Linn. Syst. Nat.* 2. 948. 5. *Fn. Sv.* 1667.
Vespa coerulea nitens. *Geoff. Inf.* 2. 384. 24.
Schaeff. Icon. tab. 81. fig. 5.
Scop. carn. 697.
 Habitat in Europae muris.

15. 5. C.

CLASS. III. SYNISTATA. Thyphus. 457.

15. C. viridis nitens, ano quadridentato coeruleo. *Syst. amethystinae.*
*Ent. 359. 12. **
Habitat in noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.
16. C. viridis nitens, thorace postice bidentato, ano quadridentato. *Syst. Ent. 359. 13. **
Habitat in America. Mus. Dom. Banks.
17. C. aurea, abdomine ferrugineo apice cyanea. *Syst. semiaurata.*
*Ent. 359. 14. **
*Sphex semiaurata viridis nitida, abdomine ferrugineo
 apice nigro. Linn. Syst. Nat. 2. 946. 35. Fn. Sv. 1661.
 Vespa capite thoraceque rubro cupreо, abdomine ruso
 pone nigro. Geoff. Ins. 2. 384. 24.
 Habitat in Europa boreali.*

116. T H Y N N V S.

1. T. abdomine atro, segmento secundo tertio quartoque dentatus.
 pupulis duobus albis. *Syst. Ent. 360. 1. **
Habitat in noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.
2. T. abdomine nigro, segmentis fascia interrupta flavaua, emarginata, scutello emarginato. *Syst. Ent. 360. 2. **
Habitat in noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.
3. T. ater, abdominis segmentis margine villoso cinereis, integer.
 ano integro. *Syst. Ent. 360. 3. **
Habitat in noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.

117. L E V C O S P I S.

1. *Lencopsis. Syst. Ent. 361.* *dorsifera.*
Sphex dorsifera. Sulz. Hist. Ins. tab. 27. fig. II.
Habitat in Italia. D. Allioni.

118. B E M B E X.

1. B. labio superiori rotundato integro, corpore nigro signata.
 flavoque vario. *Syst. Ent. 361. 1.*
*Vespa signata thorace supra nigro, lineis quatuor fascio-
 lisque.*
 R. 5

lisquæ duabus flauis. Linn. Syst. Nat. 2. 952. 241
Mus. Lud. Vlr. 410.

Vespa signata. Sulz. Hist. Ins. tabl. 27, fig. 91. 16 H.
Habitat in America meridionali.

punctata. 2. B. labio superiori integro, abdominis segmentis atris,
punctis quatuor flauis. Syst. Ent. 361. 241. 251.
Habitat in Brasilia. Mus. Dom. Banks.

rostrata. 3. B. labio superiori conico fiso, abdomine atro fasciis
glaucis repandis. Syst. Ent. 362. 3.

Apis rostrata labio superiori conico infexo, abdomi-
nis fasciis glaucis repandis. Linn. Syst. Nat. 2. 957.

25. En. Sv. 1700. Iter Göt. 336.
Habitat in Europæ monticolo atenosis, in singulis ni-
dis unico pullo.

fasciata. 4. B. labio rotundato; nigra, abdomine fasciis sex flauis
anterioribus quinque interruptis.

Habitat in Italia. D. Allioni;
Magnitudo praecedentis. Antennæ nigrae articulo pri-
mo subtus flauo. Caput cinereo pubescens; labio ro-
tundato flauo. Thorax fuscus, cinereo pubescens
immaculatus. Abdomen atrum, nictilium fasciis sex
flauis, anterioribus quinque interruptis. Pedes flau-
ui temporibus nigri;

119. V E S P A.

cincta. 1. V. nigra, thorace obscure maculata, abdomine atro
fascia ferruginea. Syst. Ent. 362. 1. *

Sphex tropica. Sulz. Hist. Ins. tabl. 27, fig. 5.

Habitat in Malabaria. D. Koenig.

Varietas minor thorace immaculata e Promontorio hom-
sp. Mus. Dom. Banks.

ephippi. 2. V. abdomine ferrugineo, segmento secundo maiori
um. atro, scutello tridentato. Syst. Ent. 362. 2. *

Habitat in noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.

orientalis. 3. V. ferruginea, abdomine fascia flava utrinque bipun-
cta. Syst. Ent. 363. 3. *

Vespa

Vespa orientalis fusca, abdominis segmento tertio quartoque flavis, punctis duobus nigris. *Linn. Mant.* 540.

Vespa turcica. *Drury Inf.* 2. tab. 39. fig. 1, 2.

Habitat in Oriente.

V. ferruginea, abdomine atro, fasciis tribus interruptis *tricincta*.

flavis. *Syst. Ent.* 363. 4.

Habitat in America. *Mus. Dom. Banks*.

V. nigricans, abdominis primo et secundo segmento basi *analis*, ferruginea, sexto, toto flavo. *Syst. Ent.* 363. 5.

Habitat ad Cap. Bon. sp. *Mus. Dom. Banks*.

V. thorace ligeolis nigris tribus, corpore ferrugineo, *carolina*, alis antice nigricantibus. *Syst. Ent.* 363. 6. *Linn.*

Syst. Nat. 2. 948. 1.

Habitat in America boreali.

Magnitudo *V. crabronis*,

V. ferruginea, abdomine aliquo atris, mandibulis porrectis capite longioribus. *Syst. Ent.* 363. 7.

Vespa cornuta rostro corneo subulato, abdomine atro, segmento secundo maiore. *Linn. Syst. Nat.* 2. 951.

20. *Mus. Lud. Vir.* 409.

Apis cornuta. *Drury Inf.* 2. tab. 48. fig. 3.

Habitat in Africa aequinoctiali.

Mandibulae semper porrectae, in altero sexu cornutae.

V. thorace nigro antice rufo immaculata, abdominis incisuris puncto nigro-duplici contiguo. *Syst. Ent.* 364.

8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 948. 3. *Geoff. Inf.* 2. 368. 1.

Vespa nigra luteaque, capite postice, thorace antice, antennarumque primo articulo testaceis. *Degeer Inf.* 2.

2. 132. tab. 27. fig. 9, 10.

Scop. carn. 824.

Mouff. Inf. 50.

Raj. Inf. 250.

Frisch. Inf. 9. tab. 11. fig. 1.

Swammerd. Bibl. Nat. tab. 26. fig. 9.

Requum. Inf. 6. tab. 18. fig. 7, 8.

4. tab. 10. fig. 9.

Schaeff. Icon. tab. 53. fig. 5.

tab. 136. fig. 3.

Habitat sub arborum radicibus. Apibus infidatur.

- vulgaris*. 9. V. thorace vtrinque lineola interrupta, scutello quadruplicato, abdominis incisuris punctis nigris distinctis. *Syst. Ent.* 364. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2. 949. 4. *Fn. Sv.* 1671.
Vespa thorace lineolis trium parium differentium hauecentum. *Geoff. Inf.* 2. 369. 2.
Vespa nigra luteaque, antennis totis nigris. *Deger Inf.* 2. 2. 111. tab. 26. fig. 7.
Vespa vulgaris *Raj. Inf.* 256.
Scopol. carniol. 825.
Reaum. Inf. 6. tab. 12. fig. 7. 8.
Frisch. Inf. 9. tab. 12. fig. 2.
Swammerdam Bibl. tab. 26. fig. 8.
Schaeff. Elem. tab. 130.
— — *Icon.* tab. 35. fig. 4.
Habitat sub Europae tectis, praedatur Muscas, furatur mel Apum.
- gallica*. 10. V. thorace vtrinque lineola, scutello sexmaculato; abdominis incisuris flavis: secunda bimaculata. *Linn. Syst. Nat.* 2. 949. 7.
Habitat in Europa australiori.
Affinis *V. vulgari*, at minor.
- rufa*. 11. V. thorace vtrinque lineola, scutello bipunctato, abdome flavo antice ferrugineo. *Syst. Ent.* 364. 10.
Linn. Syst. Nat. 2. 948. 5. *Fn. Sv.* 1672.
Habitat in Europa boreali.
- norvegii*. 12. V. thorace vtrinque lineola, scutello immaculato, abdome segmentis margine flavis, secundo vtrinque macula rufa.
Habitat in Norwegia. *Dom. Lund.*
Affinis praecedentibus. Caput nigrum ore flavo. Thorax pubescens niger lineola vtrinque flava. Scutellum omnino impunctatum. Abdomen atrum segmentorum marginibus flavis. Macula magna rufa in secundo segmento.
- maculata*. 13. V. nigra, thorace albo maculato, scutello quadruplicato, abdome postice albo. *Syst. Ent.* 364. 11.
Linn. Syst. Nat. 2. 948. 2. *Amoen. acad.* 6. 412. 91.

Vespa

CLASS. III. SYNISTATA. Vespa. 461

Vespa nigra, thoracis lateribus apiceque abdomine que postice sulphureo maculatis. *Deger Inf.* 3. 584. 9. tab. 29. fig. 13.

Habitat in America boreali.

14. V. nigra, thorace flavo maculato, abdomine fasciis arenaria. sex dentatis luteis: prima linearis interrupta *Syst. Ent.* 365. 12. *

Habitat in Americae arenosis, fauos struens planos, horizontales, incubentes, cellis hexagono prismaticis, deorsum spectantibus. Delectatur fructibus dulcibus, eorumque succis expressis. *Mus. Dom. Banks.*

15. V. thoracis dorso nigro: lineis duabus flavis, scutello lineatg. flavo, lineola nigra. *Syst. Ent.* 365. 13. *

Habitat in America *Dom. Drury.*

16. V. flava, thoracis dorso nigro: punctis quatuor fer. carnifex. rugineis. *Syst. Ent.* 365. 14. *

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

17. V. fusca, capite ferrugineo, antennis medio nigris, lanio. *Syst. Ent.* 365. 15. *

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

18. V. fusco ferruginea, fronte flauescente, antennis vni- schach. coloribus.

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Nimis praecedenti affinis. Antennae ferrugineae, immaculatae. Corpus totum fusco ferrugineum, immaculatum; abdominis apice tamen paullo pallidore. Frons flauicata. Alae ferrugineae.

19. V. fulca, genubus, antennarum apicibus margineque annula- primi segmenti flavis. *Syst. Ent.* 366. 16. *Linn. Iris.*

Syst. Nat. 2. 550. 9. *Amoen. acad.* 6. 413. 93.

Vespa nigro-fusca, thoracis lateribus rubris, abdomi- ne: falcis tarsisque flavis. *Deger Inf.* 3. 383. 7. tab. 29. fig. 11.

Habitat in America boreali.

20. V. fusca, abdomine cinerascente, segmenti primi humilis. margine flauescente.

Habi-

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
 Nimirum praecedenti affinis. Caput et thorax fusca ferrugineo paullo mixta. Labium mox flavescens, mox fuscum. Abdomen cinerascens, obscurum margine primi segmenti tenuissime flavo. Alae ferrugineo fuscae. Pedes ferruginei femoribus fusci.

espida. 21. V. nigra, thorace lobo antico punctisque duabus ab domine apice ferruginea. *Syst. Ent.* 366. 17. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

neftuans. 22. V. thoracis dorso atro, scutello quadripunctato, ab domine atro, segmento primo et secundo maculis duabus albis.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Magna. Caput nigrum labio oreque ferrugineis. Maxillae porrectae, exsertae fere longitudine antennarum. Antennae ferrugineae. Thorax subitus ferrugineus dorso atro. Macula ytrinque pallida in margine antico. Puncta quatuor alba in scutello, quorum duo postica eleuata, fere spinosa. Abdomen ovatum, atrum primo segmento basi ferrugineo apice maculis duabus albis. Segmentum secundum maculis duabus maioribus transuersis albis. Alae et pedes ferruginei.

calida. 23. V. nigra, abdomine apice fulvo. *Syst. Ent.* 366. 18. *
Vespa calida nigra, abdominalis apice antennisque fulvis, Linn. *Syst. Nat.* 2. 952. 27.
 Habitat in Africa aequinoctiali.

haemorrhoidalis. 24. V. nigra, thorace antice abdomineque postice ferrugineis, alis flavis basi atris. *Syst. Ent.* 366. 19. *
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. *Mus. Dom. Banks.*

albifrons. 25. V. atra, labio abdominalisque fascia blueta. *Syst. Ent.* 366. 20. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

toncinna. 26. V. nigra, abdomine ferrugineo, segmento secundo toto atro. *Syst. Ent.* 367. 21. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

27. *V. atra*, scutello abdominalisquæ fascia bascos albis vinciata. *Syst. Ent.* 367. 22. *
- Vespa quadridentata* atra, thorace quadridentato, scutello primoque segmento abdominalis nivis. *Linn.*
- Syst. Nat.* 2. 951. 15. *Amoen. acad.* 6. 413. 92. At thorax in nostra omnino inermis.
- Vespa cincta*, nigra, alis fulvo-violaceis, thorace maculis tribus, abdominali fascia sulphureis. *Deger* *Ins. 3. 584. 8. tab. 29. fig. 12.*
- Habitat in America.
28. *V. nigra*, labio pedibusque rufis. *Syst. Ent.* 367. 23. * *rufipes.*
- Habitat in Insulis Oceani pacifici. *Mus. Dom. Banks.*
29. *V.* thorace postice lineolis duabus flavis, abdominali marginato ferrugineo, segmento primo tertioque nigris, marginis flavo. *Syst. Ent.* 367. 24. *
- Habitat ad Cap. Bon. Spec. *Mus. Dom. Banks.*
30. *V. ferruginea*, abdominali segmento secundo nigro: ocellata. macula, vtrinque ocellari lutea.
- Habitat in Italia. *Dr. Atoni.*
- Statuta *V.* dorsalis. Caput cum antennis obscure ferrugineum. Thorax ferrugineus macula magna dorsali nigra. Abdomen ouatum segmento primo ferrugineo, secundo nigro vtrinque macula magna ocellari lutea, reliqua brevissima, ferruginea. Alae ferrugineac apice nigræ. Pedes ferruginei.
31. *V. ferruginea*, abdominali primo segmento macula dorsalis nigra marginaque flavo. *Syst. Ent.* 367. 25. *
- Habitat in America boreali. *Lewin.*
32. *V. nigra*, thorace punctis duobus, scutello bipunctata-parietum. to; abdominali fasciis quinque flavis, prima remotissima. *Syst. Ent.* 368. 26. *Linn. Syst. Nat.* 2. 949. 6. *Fn. Sv.* 1673. et 1679.
- Vespa nigra*, abdominali fasciis quinque flavis, prima remotissima. *Geoff. Ins.* 2. 376.
- Roe. Ins.* 2. *Vesp.* tab. 17. fig. 8.
- Frischi. Ins.* 9. tab. 12. fig. 1.
- Habitat in foraminibus parietum ligneorum.

- Habitat in Europa boreali.
Antennae nigrae. Labium flavum.
39. *V. nigra, thorace maculato, abdomine fasciis duabus acinæta.*
flavis.
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.* Ca-
 paria præcedente distingue. *Antennæ nigrae. Ca-*
 put nigrum puncto inter antennas duobusque ad ba-
 sin labii flavis. Thorax niger punctis duobus anticus,
 duobus ante alas quatuorque loco scutelli flavis. Ab-
 domen glabrum, atrum fasciis duabus flavis.
40. *V. abdominalis fasciis quatuor flavis, terita interrupta. aruenis.*
Syst. Ent. 368. 30. Linn. Syst. Nat. 2. 250. 12. Fn.
Sv. 1678.
- Vespæ primo abdominis segmento pyriformi fasciis que*
tribus flavis. Geoff. Inf. 2. 375. 7. 1779. 1. 1.
Dögeer Inf. 4. 2. 146. 3.
Schaeff. Icon. tab. 93. 8.
- Habitat in Europæ muris.
41. *V. nigra, thorace linea punctis duobus scutelloque campe-*
flavis, abdomine fasciis quatuor flavis, prima inter- fbris.
rupta. Syst. Ent. 369. 31.
Vespæ campestris nigra, thorace litoris quatuor abdo-
minisque fasciis quatuor flavis, prima interrupta.
Linn. Syst. Nat. 2. 950. 13. Fn. Sv. 1677.
- Habitat in Europæ parietibus.
42. *V. nigra, abdomine atro nitido, fasciis sex flavis. sexfascia-*
Habitat in Italia. D. Allioni. ta.
 Parua. Antennæ supra nigrae, subtus flavæ. Caput
 nigrum labio punctoque inter antennas flavis. Tho-
 rax niger striæ marginis anterioris flavæ. Abdomen
 atrum, nitidum segmentis marginè flavis, fascias sex
 constituentibus. Pedes flavi, femoribus nigris.
43. *V. ferruginea, abdomine fasciis quinque flavis, anten- tricolor.*
nis medio nigris, apice flavis. Syst. Ent. 369. 32.
- Habitat in Iamaica.
44. *V. thoracæ maculato, abdomine fasciis quatuor punctis bipuncta-*
que duobus primi segmenti flavis. Syst. Ent. 369. 33.
- Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
Fabr. Spec. Inf. Eg.
45. *V.*

Habitat in Europa boreali.

Antennae nigrae. Labium flavum.

39. V. nigra, thorace maculato, abdomine fasciis duabus acutis.
flavis.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Parva à precedente disting. Antennae nigrae. Caput nigrum puncto inter antennas duabusque ad basin labii flavis. Thorax niger punctis duobus anticus, duobus ante alas quatuorque loco scutelli flavis. Abdomen glabrum, atrum fasciis duabus flavis.

40. V. abdominalis fasciis quatuor flavis, terrena interrupta. *arvensis.*
Syst. Ent. 369. 30. *Linn. Syst. Nat.* 21. 250. 12. *Fn.*
Sv. 1678.

Vespa prae abdомinis segmento pyriformi fasciisque tribus flavis. *Geoff. Ins.* 2. 375. 7. *Degeer Ins.* 2. 2. 146. 3.
Schaeff. Icon. tab. 93. 8.

Habitat in Europae muris.

41. V. nigra, thorace lineola punctis duobus scutelloque campestris, abdomine fasciis quatuor flavis, prima interrupta. *campestris.*
Syst. Ent. 369. 31.

Vespa campestris nigra, thorace litoris quatuor abdominisque fasciis quatuor flavis, prima interrupta.
Linn. Syst. Nat. 7. 950. 13. *Fn. Sv.* 1677.

Habitat in Europae parietibus.

42. V. nigra, abdomine atro nitido, fasciis sex flavis. *sexfasciata.*
Habitat in Italia. *D. Allioni.*
Parva. Antennae supra nigrae, subtus flavae. Caput nigrum labio punctoque inter antennas flavus. Thorax niger striga marginis anterioris flavus. Abdomen atrum, nitidum segmentis margine flavus, fascias sex constituentibus. Pedes flavi, femoribus nigris.

43. V. ferruginea, abdomine fasciis quinque flavis, anten- tricolor.
nis medio nigris, apice flavis. *Syst. Ent.* 369. 32. *Fn.*
Habitat in Iamaica.

44. V. thorace maculato, abdomine fasciis quatuor punctis bipunctata.
que duobus primi segmenti flavis. *Syst. Ent.* 369. 33. *Fn.*
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
Fabr. Spec. Ins. Gg 45. V.

466 CLASS. III. SYNISTATA. Vespæ.

- flavipes*. 45. V. thorace maculato, abdomine fasciis tribus punctatis, que duobus primi segmenti flauis. *Syst. Ent.* 369. 34. *
- Habitat in America. *Dom. Lewin.*
- variabilis*. 46. V. nigro ferrugineoque varia, abdomine flavo, segmento primo macula, secundo toto nigra. *Mus. Dom. Banks.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
Statura praecedentium. Caput et thorax ferrugineo nigroque varia. Labium interdum flavescentia. Maculae duas flavae sub scutello. Abdomen flavicant. Primum segmentum macula magna nigra, secundum totum atrum, tertium basi atrum. Reliqua flava. Pedes ferruginei.
Variat rarius colore abdominalis magis nigro.
- cinerascens*. 47. V. nigra, thorace postice virinque subspinoso, alis violaceis. *Syst. Ent.* 369. 35. *
- Habitat in America. *Dom. v. Rohr.*
- testacea*. 48. V. thorace nigro, lobo antico ab domineque ferrugineis, dorso nigro.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Media. Antennæ ferruginea. Caput nigrum lable postneque oculos flavum. Thorax niger lobo antico et postico ferrugineus. Abdomen sessile, ferrugineum linea dorsali late nigra. Alae anticae subhyalinae, bafi ferrugineas. Pedes ferruginei femoribus politis atrio.
- lateralis*. 49. V. obscura, ab domine atro, lateribus albidis.
Habita ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
Magnitudo et statura praecedentis. Caput obscure ferrugineum antennæ apice nigra. Thorax obscure ferrugineus dorso nigro. Abdomen glabrum atriu lateribus late albidi. Pedes obscure ferruginei.
- flavescentia*. 50. V. ferruginea, alis apice macula fulca. *Syst. Ent.* 370. 36. *
- Habitat in India orientali. *D. Koenig.*
- gibbosa*. 51. V. capite thoraceque maculatis, ab domine varioloso quadrifasciato, primo segmento gibbosso. *Syst. Ent.* 370. 37. *
- Habitat in America. *Dom. Lewin.*

52. V. scutello fasciis duabus lineolisque quatuor flagis, *americana*.
abdomine fasciis flavis, uno fusco. *Syst. Ent.* 370. 38.^{*}
- Habitat in Americae meridionalis insulis.
53. V. abdominis primo segmento infundibuliformi, secundo campanulato maximo. *Syst. Ent.* 379. 39.^{*}
- Linn. Syst. Nat.* 2. 950. II. *Fn. Sv.* 1676.
- Vespa nigra*, abdominis articulo primo infundibuliformi, secundo campanulato maximo. *Graeff. Ins.* 2. 377. tab. 16. fig. 2.
- Sycop. carn.* 830.
- Frisch. Ins.* 9. tab. 9.
- Habitat in Europas hortis.
- Abdomen nigrum fasciis flavis.
54. V. nigra flavo variegata, abdominis petiolo incuruo, *arcuata*.
maculis quatuor flagis. *Syst. Ent.* 371. 40.^{*}
- Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
55. V. nigra flavo variegata, abdominis petiolo ferrugineo, *campaniformis*. apice nigro, maculis duabus flagis. *Syst. Ent.* 372. 41.^{*}
- Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
56. V. ferruginea flavoque varia, abdominis petiolo in petiolata.
curvo ferrugineo, fascia atraria. *Mus. Dom. Banks.*
- Habitat in Malabarria. *Mus. Dom. Banks.*
- Media Antennae ferrugineae, vinceratae. Caput ferrugineum, fascia verticis inter oculos atra. Thorax ferrugineus lobo antico flavo. Abdominis petiolus elongatus, incuruus, ferrugineus basi fasciaque apicis atris. Segmentum secundum ferrugineum, apice atrum, reliqua flavescentia. Pedes ferruginei.
57. V. abdomine flavo basi nigro, petiolo incuruo, fetu pyriforme, fasciis duabus nigris. *Syst. Ent.* 371. 42.^{*}
- Habitat in China. *Drury.*
58. V. nigra flavo variegata, abdominis petiolo bipunctato pomiforme, secundo segmento fascia interrupta omnibusque marginis flavis.
- Habitat in Italia. *D. Almon. Spec.*

Statura et magnitudo V. coarctatae. Antennæ nigrae primo articulo subtus flavo. Caput nigrum labio flavo, puncto medio nigro. Thorax niger fascia antiga, puncto magno sub alis maculisque quinque scutellaribus flavis. Abdominis primum segmentum elongatum, infundibuliforme punctis duobus marginisque flavis, secundum campaniforme, maximum, nigrum, fascia media interrupta margineque flavis, reliqua brevissima margine flavo. Pedes flavi.

grisea. 59. V. cinerea, abdominis petiolo ferrugineo, lateribusque flavo maculatis. *Syst. Ent.* 372. 43. Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

cineracea. 60. V. cinereo fusca, abdominis immaculati petiolo elongato incurvo ferrugineo. Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.* Statura et summa affinitas V. griseae; at paullo minor et abdominis latera immaculata. Alae nigrae.

macilenta. 61. V. cinerascens, abdominis nigricantis petiolo ferrugineo, secundo segmento maculis duabus cinereis. Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.* Statura praecedentium, at duplo minor. Antennæ ferrugineae dorso nigro. Caput et thorax cinerascentia, subuilla dorso obscuriore. Abdominis petiolum elongatus, incurvus, ferrugineus, immaculatus. Secundum segmentum ferrugineum apice maculis duabus griseis, reliqua nigricantia. Pedes ferruginei. Alae albidae.

tabida. 62. V. nigra flavo maculata, abdominis petiolo nigro, secundo segmento basi flavo. Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.* Corpus paruum. Antennæ nigrae. Caput nigrum labio flavo. Thorax niger marginæ antico punctis duobus sub alis, duobus transuersim loco scutelli linearisque duabus sub scutello apuis. Abdomen atrum petiolo elongato, incurvo, immaculato. Segmentum secundum basi flavum, tertium vix basi levicat. Pedes flavi femoribus posticis nigritatibus.

CLASS. III. SYNISTATA. Crabro. 460

63. V. abdominis ferrugineo petiolo nigro, fascia flavo. attenuata.
Syst. Ent. 372. 44. *

Habitat in America meridionali. Dom. Drury.

64. V. coerulea, ore ferrugineo, aliis fuscis. Syst. Ent. cyanea.
372. 45. *

Habitat in Brasilia. Nidus cordatus cortice tenuissimo
tectus Anacardii orientalis truncis adhaeret. Mus.
Dom. Banks.

65. V. nigra, thorace antice ferrugineo, abdome conico conica.
fauo, segmento secundo fascia, reliquis basi nigris.
Vespa conica nigra, thorace antice ferrugineo, abdo-
mine conico fauo, segmento secundo et sexto basi
nigris. Syst. Ent. 372. 46. *

Habitat in America meridionali, in Italia. D. Allioni.

66. V. nigra, abdominis petiolo pedibusque rufis. Syst. arietis.
Ent. 373. 47. *

Habitat in Americae meridionalis insulis. D. v. Röhr

67. V. scutello quadripunctato, abdominis segmentis mar- biglumis.
gine albis, secundo punctis duobus albis. Syst. Ent.
373. 48. Linn. Syst. Nat. 2. 951. 17. En. Sv. 1680.
Habitat in Europa, nidum e fistulis aggregatis ad latera
rupium striens.

68. V. nigra, abdome fauo, segmentis triangulo dorsali triangu-
lum. nigro. Syst. Ent. 373. 49.

Habitat Hafniæ.

126. C.R.A.B.R.O.

1. C. abdome fasciis duabus fauis, ano tridentato, glis tridenta-
nigris margine albis. Syst. Ent. 373. 1. *
Habitat in Europa australi.

2. C. thorace postice bidentato, abdome fasciis tribus spinosus.
fauis. Syst. Ent. 373. 2. *
Habitat in Europa australiori.

3. C. thorace immaculato, abdome maculis quinque fofoius.
quinque lutescentibus, pedibus nigris. Syst. Ent. 374. 3.

G 3 Sphex

- Sphex foxxoria.* Linn. Syst. Nat. 2. 946. 32. Fn. Sv. 1662.
Habitat in Europae montibus fabulosis.
Maculae abdominis posticæ connatae in fasciam.
- Subterra-* 4. C. thorace maculato, abdomine vtrinque maculis quinque flavis, pedibus ferrugineis. Syst. Ent. 374. 4. *
Habitat Hafniae.
- macula-* 5. C. thoracè maculato, abdome atro, maculis vtrinque quatuor, tibialisque flavis.
Habitat in America boreali. Mus. Dom. Banks.
Medius. Antennæ nigrae primo articulo flavo. Caput nigrum labio argenteo. Thorax niger striga antica, puncto sub alis scutelloque flavis. Abdomen atrum, nitidum, maculis vtrinque quatuor transversis flavis.
Femora nigra, tibiae flavae.
- fascipes.* 6. C. niger, thorace maculato, abdome flavo, segmentorum marginibus quoque nigris.
Habitat in Italia. D. Allioni.
Medius. Antennæ nigrae, Caput nigrum labio flavo fronteque pube argentea. Thorax niger striga marginali antica, punctis sub alis strigaque marginali posteriora duplicata flavis. Abdomen flavum segmentorum marginibus ultimoque segmento toto atris. Pedes flavi.
- sexcinctus.* 7. C. thorace maculato, abdome fasciis sex flavis, primis interruptis. Syst. Ent. 374. 5. *
Habitat in Germania. Dom. de Hattorf.
- cibrari-* 8. C. niger, abdome fasciis flavis, intermediis interruptis, tibiis anticis clypeis concavis. Syst. Ent. 374. 6.
Sphex cibraria. Linn. Syst. Nat. 2. 945. 23. Fn. Sv. 1675.
Sphex abdomen fasciis duabus interruptis, pedibus anticis clypeatis. Degener Ins. 2. 2. 139. tab. 28. fig. 1.
Vespa Ichneumon antennis reflexis, pedibus anterioribus velut clypeatis. Raj. Ins. 255. 14.
Apis tibiis anticis lamella cibriformi. Vdm. Diff. 94. Roland. Abt. Holm. 1751. 56. tab. 3. fig. 1.
Naturforsch. 2. tab. 2.
Schaeff. Icon. tab. 177. fig. 6.

Sulz.

CLASS. III. SYNISTATA. *Crabro.* 471

Sulz. Hist. Inf. tab. 27. fig. 6.

Habitat in Europae floribus.

Sexus alter pedibus simplicibus, alter clypeatis ad arcuatum cohaesione in copula.

9. *C. niger*, abdomine punctis flauis, pedibus anticus con- *clypeatus*.
cauo clypeatis. *Syst. Ent.* 375. 7.

Sphex clypeata. *Linn. Syst. Nat.* 2. 945. 24.

Apis nigra, abdomine fasciis sex flauis, primis duabus
interruptis, tibiis anticus lamellis integris. *Schreb.*

Inf. II. tab. I. fig. 8.

Habitat Halee Saxonum.

10. *C. niger*, abdominis fasciis tribus flauis, primis inter- *vagus*.
ruptis tibialis flauis. *Syst. Ent.* 375. 8.

Sphex vagus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 946. 36. *Fn. Sv.* 1661.

Scop. carn. 785.

Habitat in Europae floribus.

Variat thorace maculato et immaculato.

11. *C. niger*, scutello flavo, abdominis segmentis tribus *mystacea*-
marginis flauis, primo interrupto, tibiis ferrugineis. *mus.*

Syst. Ent. 375. 9.

Sphex mystacea. *Linn. Syst. Nat.* 2. 944. 21. *Fn. Sv.*

1653.

Habitat in Europae floribus frequens.

12. *C. laevis* ater, thorace maculato, abdomine antice fa- *dimidiatus*-
scia, punctis duobus apicem flauis.

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Parvus. Caput atrum labio argenteo, primoque antennarum articulo subtus flauo. Thorax niger, lineola antica, punctis duobus lineolaque scutelli flauis. Abdomen antice atrum fascia punctisque duobus flauis, postice flauum, frigis obscurioribus. Pedes flavi semoribus nigris.

13. *C. laevis* ater, abdomine pedibusque ferrugineo fla- *diadema-*
uis, labio albo.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Parvus. Caput nigrum labio albo et inter antennas
macula tridentata alba. Thorax niger margine antico,

472 CLASS. III. SYNISTATA. Andrena.

tico, puncto sub alis maculisque duabus transuersis
loco scutelli flavis. Abdomen flavum dorso magis
ferrugineo primoque segmento nigro. Pedes flave-
scentes,

femora- 14. C. flavius nigro maculatus, femoribus posticis crassissi-
tus. *Syst. Ent.* 375. 10. *
Habitat in America meridionali. *Dom. v. Rohr.*

tricinctus. 15. C. ater, scutello punctis duobus sub scutello, abdomi-
nisque fasciis tribus flavis. *Syst. Ent.* 375. 11. *
Habitat in America meridionali. *Dom. v. Rohr.*

*vniiglu-
mis.* 16. C. scutello mucronato, abdominis segmentis tribus.
punctis duobus albis. *Syst. Ent.* 376. 12. *
Vespa vniiglumis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 951. 18. *Fn. Sv.*
1681.
Habitat in Europae floribus, in primis umbellatis.

*leucofto-
ma.* 17. C. ater glaber, labio argenteo. *Syst. Ent.* 376. 13.
Vespa leucoftoma atra glabra, labio argenteo, palmis
fuscis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 946. 36. *Fn. Sv.* 1663.
Habitat in Europae floribus.

121. A N D R E N A.

*coerule-
fascia.* 1. A. fusca subvillosa, abdome coerulecente, incisura-
rarum marginibus albicantibus. *Syst. Ent.* 376. 1.
Apis coeruleofascia. *Linn. Syst. Nat.* 2. 955. 21. *Fn. Sv.* 1695.
Habitat in Europa.
Margines segmentorum abdominis latere in primis albi.

labiata. 2. A. villosa nigra, abdominis segmento secundo tertio
que pubescente. *Fabre.*
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.* In Italia. *D. Allioni.*
Corpus totum villosum, nigrum, abdominis segmentis
duobus solis ferrugineis. Labium flavum.
Variat rarius abdominis apice ferrugineo fuscō nec
nigro.

3. A. aenea, grisecente pubescens. *Syst. Ent.* 376. 2. *aenea.*
Apis aenea. Linn. *Syst. Nat.* 2. 955. 20. *Syst. Ent.*
 1695.
Apis tofa viridi cuprea. *Geoff. Inf.* 2. 415. 15.
 Habitat in Europa, in America paullo maior.
4. A. thorace pubescente, abdomine ferrugineo segmentum marginatum marginibus cinereis, primo segmento atro. *ta.*
Gen. Inf. Mant. 247. *
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
5. A. thorace ferrugineo, abdomine cincrascente. *Syst. heluola.*
Ent. 376. 3.
Apis heluola rufa villosa oblonga subtus albida, Linn.
Syst. Nat. 2. 955. 16. *Fn. Sv.* 1693.
 Habitat in Europae floribus.
6. A. thorace villoso ferrugineo, abdomine atro immaculato. *bicolor.*
Syst. Ent. 376. 4. 4. *
 Habitat in Daniae memoribus.
7. A. thorace nigro postice villoso ferrugineo, abdomine tricolor. *atros, segmentorum marginibus nigris.* *Syst. Ent.*
 377. 5. *
 Habitat in America boreali.
8. A. capite thoraceque viridi pubescentibus, abdomine tincta; atro, segmentorum marginibus cyaneis. *tincta.*
 Habitat in Malabarria. *Mus. Dom. Banks.*
 Magna. Antennae nigrae. Caput fuscum, viridi pubescentem ore pallido. Thorax viridi pubescentem. Abdomen atrium segmentorum marginibus late cyanis. Pedes nigri tibiis dorso ferrugineo ciliatis.
9. A. atra, abdomine segmentorum marginibus nigris. *nigrita.*
Syst. Ent. 377. 6. *
 Habitat in America.
10. A. cingreto pubescentis, abdomine atro, fasciis quatuor albis. *fasciata.*
Syst. Ent. 377. 7. *
 Habitat in America.
11. A. subpubescens fusca, abdomine fasciis quatuor coeruleis. *zonata.*
Syst. Ent. 377. 8.

Apis zonata. Linn. *Syst. Nat.* 2. 955. 19. *Mus. Lud.*
Vit. 415.

Habitat in India orientali.

Affinis *A. cinctae*, at distincta.

pilipes. 12. A. atra glabra, pedibus posticis albo ciliatis, alijs fuscis.

Habitat in Italia. *D. Allioni.*

Statura et magnitudo *A. haemorrhoidalis* tota glabra, atra, thorace obscuro, abdomine nitido. Aliae omnes fuscae. Pedes nigri postici albo ciliati.

haemorrhoidalis. 13. A. nigra, ano ferrugineo. *Syst. Ent.* 377. 9.
Habitat in Sicciae nemoribus.

gulosa. 14. A. nigra, abdomine flavo basso nigro, lingua longissima. *Syst. Ent.* 377. 10. *
Habitat ad Cap. bon. spei. *Doin. Drury.*

bidentata. 15. A. abdomine fusco, cingulis quinque albidis, ano bidentato. *Syst. Ent.* 377. 11. *
Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.* Nidum in muris e foliis conuolutis arborum struens.
Pedes antici elongati, flavi tarsis ciliatis.

virescens. 16. A. capite thoraceque viridi aeneis, abdomine nigro. *Syst. Ent.* 378. 12. *
Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*

cingulata. 17. A. thorace rufa, abdomine atro, fasciis quatuor coerulecentibus. *Syst. Ent.* 378. 13. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

succincta. 18. A. thorace hirsuto fulvo, abdomine nigro, cingulis quatuor albis. *Syst. Ent.* 378. 14.

Apis succincta. Linn. *Syst. Nat.* 2. 955. 18. *Fa. Sv.* 1694.

Apis nigra, thorace hirsuto fulvo, abdomine glabro, incisuris albis. *Geoff. Ins.* 2. 411. 7.

Schaeff. Icon. tab. 32. fig. 5.

Habitat in Europae floribus.

Varietas minor thorace magis nigricante fasciisque prima abdominis absoluta.

122. *Apis*

122. A.P.I.S.

1. *A. hirsuta atra, tarsis anticis explanatis flauis, intus ciliatis.* *Syst. Ent.* 378.
Apis latipes. Drury Inf. 2. *tab. 48. fig. 2.*
Habitat in China.
2. *A. hirsuta atra, alis violaceis.* *Syst. Ent.* 2. 379. 2. *violacea.*
Linn. Syst. Nat. 2. 959. 38. *Mus. Lud.* *Vit.* 415.
Geoff. Inf. 2. 416. 19.
Apis gigas nigra nitida; oculis fuscis; alis violaceo viridibus aeneo nitentibus. Degeer Inf. 5. 76. 10.
tab. 28. fig. 15.
Bombylius lusitanicus e nigro coerulescens. Petiv. gazoph. tab. 12. fig. 5.
Reaum. Inf. 6. *tab. 5. fig. 1. 2.*
Scopol. carn. 812.
Habitat in truncis exsiccatis Europae australioris et Indiae, quos perforat, longitudinaliter excavat, ibique plures nidos a fundo incipiens polline herbarium melle mixto replet, et uniuicue omnium concredit. Nidi distinguuntur 4. 5. annulis lignis. Nymphae caput deorsum spectat, ut in vndo exitum quaerat, apis perfecta.
3. *A. hirsuta atra, fronte abdominisque lateribus cinereis, nigrita.*
Syst. Ent. 379. 3.
Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. Dom. Banks.
4. *A. hirsuta atra, abdome supra flauescente.* *Syst. Ent.* *carolina.* 379. 4. *Linn. Syst. Nat.* 2. 959. 40.
Habitat in America.
5. *A. hirsuta nigra, thorace cingulo flavo; ane albo.* *Syst. terrestis.*
Ent. 379. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 959. 41. *Vit.* *Sys 2709.*
Bombylius maior niger, linea duplice transuersim ducta lutea; alia supra scapulas, alia per medium abdominis; imo abdome albo. Raj. Inf. 247. 5.
Goez. Inf. 2. *tab. 46.*
Bradl. nat. *tab. 26. fig. 1. D.*
Reaum. Inf. 6. *tab. 3. fig. 1.*
Frisch. Inf. 9. *tab. 13. fig. 1.*

Sulz. *Ins.* tab. 19. fig. 124.

Schaeff. *ELEM.* tab. 20. fig. 6.

Icon. tab. 69. fig. 7.

Habitat in Europae terra, profunde nidificans, strenue mellificans.

Varietas quadruplo minor in pratis Kiloniensibus frequens.

crypta- 6. *A. hirsuta nigra, abdominis fascia flava, ano albo;*
rum. *Syst. Ent.* 379. 6. *

Habitat Hafniac. *Dom. Mohr.*

ruderata. 7. *A. hirsuta atra, thorace flavo, fascia atra, abdome*
antice flavo, ano albo. *Syst. Ent.* 380. 7. *

Habitat Hafniac. *Dom. Mohr.* In Madera. *Mus. Dom. Banks.*

memorum. 8. *A. hirsuta atra, thorace fascia interrupta flava, ano*
pallido. *Syst. Ent.* 380. 8. *

Habitat Hafniac. *Dom. Mohr.*

soroensis. 9. *A. hirsuta atra, ano albo.* *Gen. Ins. Mant.* 248. *

Habitat in sylvis Soroensisibus. *Dom. de Slangbush.*
 Statura omnino praecedentium, at tota astra solo albo.

surina- 10. *A. hirsuta nigra, abdome excepto, primo segmento*
mensis. *flavo.* *Syst. Ent.* 380. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2. 961. 52.

Apis abdomen flavum hirsuta nigra, abdome excepto, primo segmento flavo, tibiis posticis dilatatis.
Degeer Ins. 3. 574. 6. tab. 28. fig. 9.

Drury Ins. 1. tab. 43. fig. 4.

Habitat Surinami.

virginica. 11. *A. hirsuta pallida, abdome excepto primo segmento*
atro. *Syst. Ent.* 380. 10. *Linn. Mant.* 1540.

Drury Ins. 1. tab. 43. fig. 1.

Habitat in Virginia.

antiquen- 12. *A. hirsuta atra, thorace abdomeque antice flavis.*
fis. *Syst. Ent.* 380. 11. *

Habitat in Antigua Insula. *Dom. Drury.*

A sequente manifeste differt.

A. hirsuta nigra, thorace antice flavo, abdomine flava-america-
no, ano nigro. *Syst. Ent.* 380. 12. *Sy. Nat.* 2. 960. *Apis syluarum.*
Habitat in America boreali. *Dom. Lewin.*

14. A. hirsuta nigra, thoraci dorso flavo, abdomine vi. *africana.*
rescente, segmento primum flavo.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Sugra praecedentium. Caput nigrum pubescere
scente, Antennae nigrae, apice ferruginea. Thor-
ax flavissimus, limbo antico nigro. Abdomen vi-
rescens. Segmento primi flavissimo. Alio fuscac.
Pedes nigri.

15. A. hirsuta nigra, thorace abdomeque antice flavis, *hortorum.*
ano albo. *Syst. Ent.* 380. 13. *Linn.* *Syst. Nat.* 2. 960.

42. *Fn. Sp. 1791.* *lom. 2100m. 29°V. 29°C. dūl. 2210m.*

Habitat in Europe hortis. *A. hirsuta nigra.*
Affinis A. hortorum, ut capite minor. et ceteris A. s.

16. A. hirsuta nigra, thorace antice flavo, ano rubro. *arbusco-*
rum. *Gen. Inf. Mant.* 247. 3. *lom. 2100m. 29°V. 29°C. dūl. 2210m.*
Apis pratarum. *Linn.* *Syst. Nat.* 2. 960. 43. *Fn. Sv.*
1711.

Habitat in Daniae nemoribus. *Dom. de Slangbush.* In
Italia. *Dr. Allioni.* *lom. 2100m. 29°V. 29°C. dūl. 2210m.*

17. A. hirsuta attra, ano fulvo. *Syst. Ent.* 381. 14. *Linn.* *lapida-*
ria. *Syst. Nat.* 2. 960. 44. *Fn. Sy. 1791.* *Goffr. Inf.* 2. 417.

Bombylius maximus. *totuſ niger, exceptis duobus ex-*
tremis abdominis annulis rufis. *Raj. Inf.* 646. 11.
Scopol. carn. 813.

Frisch. Inf. 9. tab. 45. fig. 21. su

Reaum. Inf. 6. tab. 1. fig. 1 — 4.

Schaeff. Icon. tab. 69. fig. 9.

Habitat in lapidum aceruis; strenue mellificans.
Varietas triolo minor. vir distincta.

18. A. hirsuta pallida, thoraci fascia abdomineque po. *syluarum.*
fice nigra, ano rufa. *Syst. Ent.* 381. 15. *
Apis syluarum *hirsuta pallida, thoraci fascia nigra,*
ano

- ano rubro. *Linn. Syst. Nat. 2. 960. 45.* *En. Sv. 1713.*
Scopol. carn. 822.
Habitat in Europae nemoribus.
- bryorum.* 19. *A hirsuta flava, abdomen virescente.* *Syst. Ent. 381.*
16. ♀.
*Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.**
- musco-* 20. *A hirsuta fulua, abdomen flavo.* *Syst. Ent. 381. 37.*
Linn. Syst. Nat. 2. 960. 46. *En. Sv. 1714.*
Bombylius medius; dorso longis pilis rufis vestito;
mellificus, vulgatissimus; in gramine nidum con-
*struens. *Raj. Inf. 246. 3.**
Frisch. Inf. 9. tab. 26. fig. 8.
Schaeffl. Icon. tabl. 69. fig. 6.
Radumi. Inf. 6. tabl. 28 fig. 3. 4.
Habitat sub Europae muscis mellificans.
- hypno-* 21. *A. hirsuta fulua, abdominis fascia nigra, ano albo.*
Syst. Ent. 381. 18. *Linn. Syst. Nat. 2. 960. 47.* *En.*
Sv. 1715. *ab. 3. postice nigra, apice cincta 2. 3.*
Apis nigra thoracis basi et apice abdominalisque basi
*fulvis, ano albo. *Groff. Inf. 2. 48. 2.**
Scopol. carn. 820.
Rugam. Inf. 6. tab. ali fig. 4. 1.
Habitat sub Europae muscis.
- sibirica.* 22. *A. hirsuta flava, thoraci fascia annoque fulua.*
*Habitat in Siberia. *Dr. Pallas. Mus. Dom. Banks.**
Caput vti totum corpus atrum. Thorax flavus hirtus;
fascia fulua inter alas. Abdomen flavus hirtus bin-
fuluo.
- prato-* 23. *A. hirsuta flava, thorace fascia nigra.* *Syst. Ent. 381.*
*19. **
Apis fragrans. Pall. Iter 1. 474. 751.
*Habitat in Daniae nemoribus, in Siberia. *Pallas.**
*Feminae odore rosco, fragrantissimae. *Pallas.**
- lucorum.* 24. *A. hirsuta flava, ano albido.* *Syst. Ent. 381. 20.* *Linn.*
Syst. Nat. 2. 961. 48. *En. Sv. 1716.*
Habitat in Europae floribus.
25. *A.*

CLASS. III. SYNISTATA; *Apis*, 479.

25. *A. hirsuta atra*, tibiis posticis ferrugineis. *Syst. Ent.* aceruo-
rum.
Apis aceruum hirsuta atra. *Linn. Syst. Nat.* 2. 961.
 50. *Fn. Sv.* 1717.
Schaeff. Icon. tab. 78. fig. 5.
 Habitat in Europa sub terra.
26. *A. hirsuta atra*, ano fusco. *Syst. Ent.* 382. 22. *Linn.* subter-
ranea.
Geoff. Ins. 2. 416. 261.
Bombylius minor praecedenti concolor, abdomine imo
 pallidius nitente seu fulvo. *Raj. Ins.* 246. 2.
 Habitat in Europae floribus.
27. *A. hirsuta atra*, scutello, abdomineque pallescentibus, minorum.
 ano rufo. *Gén. Ins. Mant.* 248.
 Habitat Kiloniae. *Dom. de Scheftedt.*
28. *A. hirsuta heluola*, femoribus basi nigris. *Syst. Ent.* brasilia-
 382. 23. *Linn. Syst. Nat.* 2. 961. 49. norum.
 Habitat in America.
29. *A. hirsuta coerulecente atra*, thorace supra flavo. *aestuans.*
Syst. Ent. 382. 24.
Apis aestuans hirsuta nigra, thorace flavo. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 961. 53. *Mus. Lud. Vlr.* 416.
Apis leucothorax hirsuta nigra, thorace luteo, alis
 nigro violaceis, abdomine glabro. *Deges. Ins.* 3. 573.
 4. tab. 28. fig. 7.
 Habitat in America, noua Hollandia, Cap. b. spei.
30. *A. hirsuta nigra*, abdomine postice flavo. *Syst. Ent.* tropica.
 382. 25. *Linn. Syst. Nat.* 2. 961. 54. *Mus. Lud. Vlr.*
 416.
 Habitat in regionibus australioribus.
31. *A. hirsuta cinerea*. *Syst. Ent.* 382. 26. * *senilis.*
 Habitat in Dania nemoribus.
- A. thorace hirto atro antice flavo*, abdomine nudo *seminuda*,
 atro, fascia interrupta hirta.
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
 Media. Caput vix pubescens, atrum. Thorax valde
 hirtus.

- hirtus ater, antice fascia flava. Abdomen ovatum, atrum, nitidum in medio, fascia interrupta hirta. Pedes atri.*
- lagopoda.* 33. *A. grisea, pedibus anticis dilatato ciliatis, tibiis posticis clauatis, ang. emarginato. Syst. Ent. 383. 27. Linn. Syst. Nat. 2. 957. 27. Fn. Sv. 1702. Sulz. Hist. Inf. tab. 27. fig. 17.*
Habitat in Europae floribus.
- pilipes.* 34. *A. grisea, pedibus intermediis fasciculato pilosis. Syst. Ent. 383. 28. P.*
Apis plumipes. Pall. Spicil. Zool. fasc. 9. 24. tab. 1. fig. 14.
Habitat in Anglia. Dom. Lewin.
- plumipes.* 35. *A. thorace fulvo, abdomine nigro, apice fulvo, tibiis posticis compresso dilatatis hirsutis atris.*
Habitat in India. Mus. Dom. Teats.
Antennae nigrae, labium flavum, frons nigra, linea flava. Vertex lana fulua, subtus lana alba. Thorax tectus lana fulua. Abdominis primum et secundum segmentum atrum, reliqua fulua lateribus albo maculatis. Pedes antici albo villosi, reliqui quatuor atri tibiis valde compressis, dilatatis, hirtis.
- rennula-* 36. *A. pubescens, thorace ferrugineo, abdomine fusco petria. Pedibus vndique villosis. Syst. Ent. 383. 29. Linn. Syst. Nat. 2. 957. 23. Fn. Sv. 1698. 12.*
Habitat in terra fabulosa Europae.
- mellifica.* 37. *A. pubescens, thorace subgriseo, abdomine fusco, tibiis posticis ciliatis intus transversè striatis. Syst. Ent. 383. 30. Linn. Syst. Nat. 2. 955. 22. Fn. Sv. 1697. 1.*
Apis gregaria. Geoff. Inf. 2. 407. 1.
Apis domestica sive vulgaris. Rabe. Inf. 140. 1.
Swammerd. Bibl. Nat. tab. 17. fig. 1. operaria.
fig. 2. femina.
fig. 4. mas.
Roum. Inf. 5. tab. 21, 22, 23. fig. 1. operaria.
fig. 2. mas.
fig. 3. femina.
Sulz. Inf. tab. 19. fig. 133.
Habitat in Europae arboribus cauis, frequentius culta.

CLASS. VII. SYNISTATA. Apls. 281

48. *Aurigra*, thorace postice abdomineque antice tomento disiuncta.
toto fusco; alis fuscis.
Habitat in America.
Magnitudo A. mellifcae. Caput nigrum. Thorax nigro postice tomento denso fuscus. Abdomen cyaneum, nitidum, segmento primo tomento fuscum tectum. Pedes nigri. Alae fuscæ.
49. *A. nigra*, thorace postice abdomineque antice tomento rufipes.
toto ferrugineis, alis testaceis, apice fuscis. on
Habitat in Africa æquinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Magua. Caput nigrum, immaculatum. Thorax antice niger, immaculatus, postice tomento ferrugineo te-
ctus. Abdomen nigrum segmento primo toto, secun-
doque marginè ferrugineo tomentosus. Alae omnes
testaceæ, apice fuscae. Pedes ferruginei.
50. *A. atra*, thorace rufa, alis spicæ fuscis. *Syst. Ent. thoracica.*
383. 31. ♀
Habitat in Daniae nemoribus.
51. *A.* thorace hirsuto albicante, fascia nigra, ab domine fuscis.
coerulecente, ano cinereo. *Syst. Ent.* 383. 32. * *frons.*
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
52. *A. nigra*, thorace hirsuto albicante, fascia nigra, ab domine coerulecente. *Syst. Ent.* 384. 33. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 953. 5. *En. Sv.* 1688.
Schaff. Icon. tab. 22. fig. 5. 6.
Habitat in Europæ floribus.
53. *A.* thorace villoso cinereo, ab domine coerulecente, analis.
ano nigro. *Syst. Ent.* 384. 34. *
Habitat in America. *Dom. Drury.*
54. *A. thorace villoso ferrugineo, ab domine atro*, lateri haemor-
bus glauco maculatis, ano ferrugineo. *rhoa.*
Habitat in Germania. *Dom. &c. Hattorf.*
Caput cum antennis nigrum fronte cinereo pubescente.
Thorax niger, lata ferruginea tectus. Abdomen atrum
nitidum maculis lateralibus glaucis anque rufo. Pe-
des nigri tibialis posticis rufo hirtis.

Fabr. Spec. Inf.

H h

45. A.

482 CLASS. III. SYNISTATA. *Apis.*

- manicata*. 45. A. cinerea, abdomine nigro, maculis lateralibus flavis, ano quinquedentato. *Syst. Ent.* 384. 35. *Linn. Syst. Nat.* 2. 958. 28. *Fn. Sv.* 1701.
Apis, abdomine fasciis flavis, interruptis spicis, spina quintuplici recurva armato. *Geoff. Ins.* 2. (498) 3.
Swammerd. Bibl. Nat. 26. fig. 4.
Schaeff. Icon. tab. 32. fig. 11., 12.
Habitat in Europae arboribus cauis.
- florenti*- 46. A. abdomine maculis flavis lateralibus subtus hirsutissima, segmentis tribus vtrinque dentatis. *Syst. Ent.* 384. 36. *
Habitat in Europa australi. *Mus. Comp. Excell. Dom. Tott.*
- Ireos*. 47. A. thorace hirto ferrugineo, abdomine atro, fasciis tribus interruptis albis, tarsis posticis angulato dilatatis.
Apis Ireos. *Pall. Iter* 2. 2. pag. 731. 93.
Habitat in floribus Iridis Russiac. *Mus. Dom. Banks.*
Maior A. maculata. Os et labium flava. Abdominis segmentum primum lana ferrugincea, a. 3. 4. fascia interrupta alba. Pedes flavi tarsis posticis basi valde angulatis.
- maculata*. 48. A. nigra, thorace maculato, abdomine maculis vtrinque sex transuersis flavis, ano integro.
Habitat in Italia. *D. Allioni*.
Caput nigrum ore punctisque verticalibus flavis. Thorax niger, subpubescens maculis lateralibus flavis. Abdomen glabrum, atrum, nitidum maculis vtrinque sex transuersis flavis. Femora rufa. Tibiae supra flavae, subtus nigrae.
- inter- rupta*. 49. A. pubescens nigra; abdomine strigis quinque flavis, anticis duabus interruptis, ano bidentato.
Habitat in Italia. *D. Allioni*.
Statura omnino praecedentis, at thorax magis pubescens nec maculatus. Caput nigrum clypeo punctoque supra oculos flavis. Abdomen glabrum, nigrum, strigis quinque flavis obsoletis anticis interruptis. Anus bidentatus.

50. A. nigra, abdominis segmentis maculis quatuor flavi. *variegata.*
transueris.
Habita in Italia. D. Aliqui.
Affinis A. maculatae. Capit fuscum labio utrinque ma-
culae flavae et puncto parvo pone oculos. Thorax
fuscus linea marginali maculisque duabus scutellari-
bus flavi. Abdomen globosum; atrum maculis qua-
tuor flavi in singulo segmento subtus pilosus hic-
tum. Pedes flavi femoribus supra nigri. Abus integer.
51. A. lutea, fascia bafeos alarum atca. Syst. Ent. 384. *fasciata.*
Linn. Syst. Nat. 2. 388. 39. Linn. Syst. Nat. 2. 954. 10.
Habitat in Africa.
Abdominis prima duo segmenta atra lateribus albis.
52. A. fronte bicorni, capite nigro, abdomine hirsuto ru- *bicornis.*
b. Syst. Ent. 384. 38. Linn. Syst. Nat. 2. 954. 10.
Habita in Europa.
53. Apis fulva, abdomine rufescente, fronte alba. Syst. Ent. 385. 39. *rufa.*
Linn. Syst. Nat. 2. 954. 19. Linn. Syst. 390.
Apis sylvestris parva, abdomine brevior, et tota superiore
parte lanugine rufa vestita; thorace lanugine albican-
te. Raj. Ins. 242. 72. folio 10. tab. 22. fig. 15. n. 15.
Sulz. Hist. Ins. tab. 27. fig. 15. n. 15.
Habita in Europa frequenter in floribus. In Europa.
Antennae corpore breviores, nigrae, iugum angusti.
54. A. thoraco ferrugineo, abdomine nigro albo fasciato, *lanata.*
Ventre lana nigra. Syst. Ent. 385. 40. 41. eup.
Habitat in America.
55. A. nigra, abdomine hirto, supra fulvo, subtus niveo. *bicolor.*
Habita in India orientali. Mus. Dom. Bank. Statura A. centricularis, at tuisor. Antennae breves, cy-
lindricae, nigrae. Caput nigrum fronte tomento ci-
nereo. Thorax ater puncto villoso albo, subalio po-
stice tomento fulvo. Abdomen supra tomento fulvo,
subtus albo densiori testum. Pedes cibereo, tomentosi
plantis tomento fulvo. Alac anticae obscurae.
56. A. atra, thorace abdominisque cinereo hirsuta, ventre *villosa.*
lana atra. Syst. Ent. App. 828. *
Habitat in India orientali. Dom. Edler.

- pubescens*. 57. A. corpore cinereo pubescente immaculata;
Habitat in Italia. *D. Allioni*.
Parua, corpore toto pubescente tecto; Abdominis
segmenta marginis albidiota.
- myristacea*. 58. A. nigra, abdomine toto ferrugineo. *Syst. Ent.* 585. 41.
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks*.
- centuncularis*. 59. A. nigra, ventre lana fulga. *Syst. Ent.* 385. 42. *Linn.*
Apis nigra, abdomen supra lineis albis subtus lana
fulga. *Geöff. Ins.* 2. 419.
Apis parva nigra, abdomen supino nigro glabro spen-
dente, prono lanagine rufa densa vestito. *Ker. Ins.*
- punctata*. 60. A. nigra; cinerea; villosa; abdomine nigro, segmentis
vixque puncto albo, scutello integro. *Syst. Ent.*
385. 43. *Scutellata*.
Habitat in Angliae floribus.
- cincta*. 61. A. thorace cinereo villoso, abdomine fulvo, segmentis
marginibus fulvis. *Cincta*.
Habitat in Africa aequinociali. *Mus. Dom. Banks*.
Magna. Caput et thorax fulca; cinereo nigris segmentis
abdominis primis; idem cinereo hictona; fulvo;
qua fusca marginibus fulvis, subtus fulvo; villosum.
Pedes fuscis plantis quatuor posticis fulvo; villosi.
Alae fuscas.
- bombifera*. 62. A. cyanæ nitida; abdomine aeneo. *Syst. Ent.* 386. 44.
lans. Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks*.
- muscaria*. 63. A. cocculecens, ano albido. *Syst. Ent.* 386. 45.
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks*.
- haemorrhoidalis*. 64. A. atra, abdomine aeneo, ano rufo. *Syst. Ent.* 386. 46.
Habitat in Americae meridionalis insulis.
- dentata*. 65. A. viridis nitida; alis nigris; femoribus posticis dentis.
Syst. Ent. 386. 47. *Linn. Syst. Nat.* 2. 954. 144.
Mus. Lud. Vlr. 413.

CLASS. III: SYNISTATAE API. 485

Sulz. *Hist. Ins.* tab. 27, fig. 16.

Habitat in Americae meridionalis insulis.

66. A. *viridis* nitida, alis hyalinis, abdомине cordato, tibiа posticis dilatatis. *Linn.* *Syst. Nat.* 2, 955, 15.
Degger. *Ins.* 3, 572, 3, tab. 23, fig. 5. A.
Habitat Surinami.

67. A. thorace hirto cinerascente, abdомине cyaneo, uno versicolor.
rufescente. *Syst. Ent.* 386, 48. *
Habitat in Americae meridionalis insulis. *D. v. Rohr.*

68. A. fusca, abdомине cingulis quibus albidis, uno qua- 4dentata, tridentato, intermedio blavidis. *Syst. Ent.* 386, 49.
Linn. *Syst. Nat.* 2, 958, 29. *Fn. Sv.* 1703. A.
Swamom. Bibl. Nat. tab. 16, fig. 4. A.
Habitat in Europa.

69. A. thorace cinereo, abdомине rufo, pedibus politis lanipes.
hirutissimis. *Syst. Ent.* 386, 50. *
Habitat in Americae meridionalis insulis. *D. v. Rohr.*

70. A. fusca, abdомине glabro ferrugineo, vtrinque nigro coeruleo maculato. *Syst. Ent.* 387, 51. A. *multiguttata* tiens.
Habitat in Lippiae hortis.

71. A. scutello tridentato, abdомине conico acutissimo, tridentato segmentorum marginibus albis. *Syst. Ent.* 387, 52. *
Habitat in Americae meridionalis insulis. *D. v. Rohr.*

72. A. fulca, abdомине conico acutissimo, legmentorum conica marginibus albis, scutello inermi. *Syst. Ent.* 387, 53.
Linn. *Syst. Nat.* 2, 958, 32. *Fn. Sv.* 1703. A.
Vespa sylvestris caudata, abdомине nigro, annulis flavi distincto. *Raj. Ins.* 252, 4. A.
Regum. Ins. 6, tab. ii, fig. 2, 3, 4.

- Habitat in Europae floribus, in nova Hollandia aliis evanescit. *Muf. Dom. Banks.*

73. A. cinerea, abdомине cylindrico nigro, fasciis sex al- sexcincta.
pedibus flavi. *Syst. Ent.* 387, 54. * A
Habitat in America.
Maior A. horisomni.

486 CLASS. III. SYNISTATA. Apis.

- quadri-* 74. A. nigra, abdomine cylindrico, fasciis quatuor albis cincta. *Gen. Ins. Mant.* 248. *Gen. Ins. Mant.* 248. *Habitat in Soroea Danorum. Dom. de Slangbusch.*
- maxillo-* 75. A. nigra, maxillis prominentibus, antennis thorace breviioribus, abdomine cylindrico subtus luteo hirsuto. *Linn. Syst. Nat.* 2. 954. II. *Habitat in Europa et floribus.* *Affinis praecedenti. Abdominis segmenta margine interrupta alba.*
- flori-* 76. A. hirsuta, abdomine cylindrico incurvo, ano bidentato. *Syst. Ent.* 387. 55. *Apis florijomnis nigra, abdomine subcylindrico incurvo, ano bidentato, tibiis posticis apice spinosis. Linn. Syst. Nat.* 2. 954. 13. *Fn. Sv.* 1794. *Scop. carn.* 796. *Habitat in Europa, in floribus pernoctans.*
- annulata.* 77. A. nigra, fronte annulisque pedum albis. *Syst. Ent.* 387. 56. *Linn. Syst. Nat.* 2. 958. 33. *Fn. Sv.* 1706. *Habitat in Europa et floribus frequens.* *Parua moschum spirat.*
- albipes.* 78. A. fusca, abdominis medio rufa, tibiis albis. *Habitat in Italia. D. Allion. Caput et thorax parua, omnino A. annulata. Caput et thorax fusca, parum pubescentia. Abdominis segmentum secundum apice, tertium totum, quartumque balerum. Pedes niger, tibialis albis macula, baleros fuscus. Variat interdum segmento secundo, tertioque nullis macula media nigra.*
- tumulo-* 79. A. antennis filiformibus longitudine corporis nigra, maxillis fuscis. *Syst. Ent.* 388. 57. *Linn. Syst. Nat.* 2. 951. 12. *Fn. Sv.* 1685. *Iter Gotl.* 3361. nr. 1000. *Sulz. Hist. Ins.* tab. 37. fig. 14. *Habitat in Europa et floribus.*
- longicor-* 80. A. antennis longitudine corporis filiformi subique- nis. *Syst. Ent.* 388. 58. *Linn. Syst. Nat.* 2. 953. *Fn. Sv.* 1684. *Apis*

CLASS. III. SYNISTATA. Nomada. 487.

Apis hirsutie flavescentia, fronte flava, antennis articulatis compressis corpori aequantibus. Geoff. Inf. 2. 413. 10.

Apis sylvestris domesticae similis, antennis longis nigris. Raj. Inf. 243. 1.

Eucera longicornis. Scop. Ann. Hist. nat. 4. p. 8. 1.
Scop. carn. 794.

Swammerd. Bibl. tab. 26. fig. 6.

Habitat in Europae floribus.

Lingua septemfida.

§1. A. antennis ferrugineis longitudine corporis hirsuti *glaucia*.
glauca. Syst. Ent. 388. 59.

Habitat in Oriente. Prof. Forskahl.

§2. A. antennis nigris longitudine corporis, thorace cinereo, abdomen nigro. Syst. Ent. 388. 60.

Habitat in Saxoniae floribus.

Lingua septemfida.

123. N O M A D A.

1. N. thorace, ab domine pedibusque albo nigroque varii, *histrionis*.
scutello emarginato. Syst. Ent. 388. 1.

Habitat in India orientali. D. Koenig. In noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.

2. N. nigra cinereo/villosa, ab domine atro, vtrinque albo scutella.
punctata, scutello porrecto bidentata.

Habitat in Siberia. D. Pallas. Mus. Dom. Banks.

Præcedente minor. Capitum nigrum fronte albo pubescens.

Thorax niger sancte cineris pubescens.

Scutellum postice productum emarginato bidentatum.

Abdomen totum glabrum, atrum, segmento

i. punctis vtrinque duobus, reliqui vtrinque unico

albissimis pedes nigri, tibiale macula magna alba. Alae

anticae fuscae liture marginali alba.

3. N. thorace ab domine que albo variegata, pedibus ferrugineis. Syst. Ent. 389. 2.

Apis variegata. Linn. Syst. Nat. 2. 957. 24. Fn. Su.

1699.

Hab.

Habi-

488. CLASS. III. SYNISTATA. Formicæ.

Habitat in Europa; pernoctat in Geraniis phæci rostri,
mordicus apprehensis. *F. S. 1707.*
Variat scutello albo, et ferrugineo.

ruficornis. 4. N. antennis, pedibus punctisque quatuor scutelli ferru-
gineis, abdome luteo variegato. *Syst. Ent. 389. 3.*
Apis ruficornis antennis pedibus duobus punctisque
thoracis ferrugineis, abdome luteo variegato. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 958. 34. *F. S. 1707.*
Habitat in Europæ floribus.
Thorax ferrugineo lineatus.

Fabricia. 5. N. nigra, abdome glabro ferrugineo, maculis dua-
bus flavis. *Syst. Ent. 389. 4.*
Apis Fabriciana. *Linn. Syst. Nat. 2. 955. 17.*
Habitat Uppsaliæ.

gibba. 6. N. nigra, abdome rufa apice nigra. *Syst. Ent. 389. 5.*
Nomada succincta. *Scop. Ann. Hist. nat. 4. 45. 2. **
Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

Hattorfiana. 7. N. nigra, abdомinis secundo segmento ferrugineo,
maculis tribus nigris. *Syst. Ent. 389. 6. **
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

cingulata. 8. N. cinereo villosa, abdome glabro nigro, segmento
secundo tertioque ferruginosis. *Syst. Ent. 390. 7. **
Habitat in Sueciae nemoribus.

124. FORMICA.

herculea. 1. F. nigra, abdome ornato; pedibus ferrugineis. *Syst.*
Ent. 391. 1. *Linn. Syst. Nat. 2. 962. 1.* *F. S. 1720.*
Formica magna, hippomyrmex. *Linn. It. Gotl. 232.*
Formica maxima. *Raj. Ins. 69.*
Scop. carn. 83.

Habitat in Europæ, Americae truncis putrefactibus
vagabunda.

fusaraginosa. 2. F. viridis, thorace flavo sublineato. *Syst. Ent. 392. 2.*
Habitat in India. *Dom. Edler.*

rufipes. 3. F. hirta atra, pedibus rubis. *Syst. Ent. 391. 2. **
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

4. F.

4. F. atra, capite rufo, squama petiolari didyma. *Syst. erythrcephala.*
Ent. 391. 3.
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
5. F. nigra, abdome cinerascente, squama petiolari didyma.
Ent. 392. 2.
 Habitat in Italia. *D. Allioni.*
 Statura F. rufae. Caput nigrum antennis piceis. Thorax gibbus, niger, immaculatus. Abdomen rotundatum, pube cinerea nitidum. Squama petiolaris ouata, didyma, vel potius late emarginata. Pedes nigri, tibiis piceis.
6. F. nigra, thorace compresso, pedibusque ferrugineis. *rufa.*
Syst. Ent. 391. 4.
Formica rufa thorace compresso toto ferrugineo, capite abdomeque nigris. *Linn. Syst. Nat. 2. 962. 3.*
Fn. Sv. 1721.
Formica ferruginea capite abdomeque brunneis squamaque petiolari. *Degeer. Inf. 2. 2. 305. 1. tab. 41.*
fig. 1. 2.
Formica fusca, thorace fulvo. *Geoff. Inf. 2. 428.*
7. F. media, rubra. *Rat. Inf. 69.*
 Habitat in Europae, Americae aceris acerofisi, sylvaticis, pungens aculeo obsoleti.
- Formicarum res publica consistit maribus feminisque alatis, incurvis, gulac deditis, spadonibusque numerosis, apteris, indefessis. Haec corradunt quisquiliis in aceruum, sustentant mares feminaque sub nuptiis, at peractis puerperis parentes expellunt, retentis liberis pro conseruatione familiae.
7. F. atra, abdouine pubescente. *Syst. Ent. 392. 5.* *pubescens.*
 Habitat in Hungaria. *Mus. Tottianum.*
8. F. nigra nitida, ano piceo. *Syst. Ent. 392. 6.* *nigra.*
Formica nigra tota nigra, nitida, tibias cinerascentibus. *Linn. Syst. Nat. 2. 963. 6.* *Fn. Sv. 1723.*
Formica nigra squama petiolari plantis antennisque dimidiato ferrugineis. *Degeer. Inf. 2. 2. 343. 4. tab. 42. fig. 16.*
Formica atra. *Geoff. Inf. 2. 429.*

490 CLASS. III. SYNISTATA. Formicæ.

Formica minor & fusco nigricans. *Raj. Ins. 69.*

Swammerd. Bibl. Nat. tab. 16, fig. I.—II.

Scop. carn. 834.

Habitat in Europæ terra.

fusca. 9. F. nigra, ore thoracis apice pedibusque ferrugineis.

Formica fusca cinereo fusca, tibiis pallidis. *Linn. Syst. Nat. 2. 963. 4. Fn. Sv. 1722. Geoff. Ins. 2. 42. 5.*

Formica nigra nitida, squama petiolari. *Degeer Ins. 2. 321. 3. tab. 42. fig. 12.*

Formica media nigro colore splendens. *Raj. Ins. 69.*

Habitat in Europæ sylvis.

ribra. 10. F. testacea, oculis puncto que sub abdomine nigrid.

Linn. Syst. Nat. 2. 963. 7. Fn. Sv. 1725.

Formica ferruginea, aculeo spinisque duabus thoraci.

Degeer Ins. 2. 2. 328. 6. tab. 43. fig. 1.

Formica minima rufa. *Raj. Ins. 69.*

Leuwenh. Epist. 9. Sept. 1687. p. 107. fig. 8.

Habitat in Europæ sylvaticis sub lapidibus.

obsoleta. 11. F. supra nigra, subtus testaceo rufa, ab domine sub globo. *Syst. Ent. 392. 7. Linn. Syst. Nat. 2. 963. 6.*

Fn. Sv. 1724.

Habitat in Europæ terra.

4puncta- 12. F. thorae compresso ferrugineo, ab domine atro; punctis quatuor niueis. *Syst. Ent. 392. 8.*

Formica 4punctata rubra, ab domine nigro, punctis quatuor albis. *Linn. Mant. 1. 541.*

Habitat in Alsatia, capt. d. 15. Maj.

virescens. 13. F. pallida, capite ab domine que virescentibus. *Syst. Ent. 392. 9.*

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Hanks.*

sacchari- 14. F. nigra, pedibus, antennis maxillisque rufis. *Syst. Ent. 392. 10. Linn. Syst. Nat. 2. 963. 10.*

Formica minima sacchariora. *Brown. Iam. 440.*

Habitat in America, intra culmos sacchari nidificans, quos destruit.

CLASS: III. SYNISTATA. Formica. 491

15. *F. nigra*, thorace postice semōribusque ferrugineis, *macula-*
abdomine pallido maculato.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Media. Caput magnum, atrum maxillis brevibus,
multidentatis. Antennae apice piceae. Thorax
compressus, antice niger, postice ferrugineus. Ab-
domen quatum, pilosum, nigrum lateribus pallido
maculatus. Pedes nigri femoribus ferrugineis.
16. *F. atra*, capite, antennis planisque ferrugineis, petiole barbara.
petiolo binodi. *Syst. Ent.* 393. 12. *Linn. Syst. Nat.* 2.
962. 2.
Habitat in Africa.
17. *F. nigra*, thorace rufo postice bidentato, petiolo bicincta aegyptia
nodi. *Syst. Ent.* 393. 12.
Habitat in Aegypto. *Prof. Forstahl.*
18. *F. nigra*, capite maxime rufo, petiolo binodi. *Syst. binodis.*
Eph. 393. 33. *Linn. Syst. Nat.* 2. 964. 12. — 13.
Habitat in Aegypto. *Prof. Forstahl.*
19. *F. thorace punctis elevatis*, petiolo binodi, corpore omnino
testaceo, abdomine minuto. *Linn. Syst. Nat.* 2. 964. 12. — 13.
Formica pusilla rufa, abdomine sulco, pedibus testa-
ceis, thorace bidentato. *Deger. Ins.* 3. 611. 9. tab. 31.
fig. 23. 24.
Habitat Sukinam.
20. *F. flava*, abdomine quato pubescente. *flava.*
Formica flava. Squama petiolaris. *Deger. Ins.* 2. 2. 326.
1. 5. tab. 42. fig. 24 — 28.
Habitat in Europae borealis sylvis.
Parua, magnitudine tamen differt.
21. *F. nigra*, abdominalis petiolo binodi, scutello bidentato. *caespit-*
tum. *Syst. Ent.* 393. 14. *Eph.* 394. 14. *Linn. Syst. Nat.*
Formica caespitum abdominalis petiolo binodis; priori
subtus thoraceque supra bidentato. *Linn. Syst. Nat.*
2. 963. 11. *Eph.* 1726.
Formica ferruginea, capite abdominalique aculeatis
rufo, thorace bipinosa. *Deger. Ins.* 2. 2. 334. 7. tab.
43. fig. 21. 22.
Formi-

492 CLASS. III: SYNISTATA. Formica.

Formica binodis. Linn. *Amoen. acad.* 6. 413. 94.

Sulz. Hijk. Inf. tab. 17. fig. 20. 21. 22.

Ast. Haenens. 10. n. tab. 1. fig. 1. 2. 3.

Scopol. carn. 837.

Hamb. Mag. 5. 393.

Habitat in Europæ pratis siccioribus sub museis. Mares feminaeque examinant medio Augusti, meridie calido, more Phryganearum in aere choreas agentes turma volatili, depluentes per paria iuncta. *Linn.*

tuberum. 22. F. rufa, capite abdominisque fascia nigra, petiolo binodi. *Syst. Ent.* 393. 15. *

Habitat in Suecia.

australis. 23. F. nigra, thorace inermi, squama petiolari bispinosa. *Syst. Ent.* 393. 16. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

bidentata. 24. F. thoracis gibbere bidentato, capite ouato, antennis ferrugineis, articulo infimo nigro. *Linn. Syst. Nat.* 2. 964. 13.

Formica rufo fusca, antennis ferrugineis, articulo infimo nigro, capite ouato, thoracis gibbere bidentato, petiolo squama erecta. *Degter. Inf.* 3. 690. 1, tab. 31. fig. 1. 2.

Habitat Surinami.

biscutata. 25. F. thorace bidentato, squama petiolari dupliqueata. *Syst. Ent.* 394. 17. *

Habitat Cajennæ. *Dr. Mallet.*

eleasta. 26. F. nigra, thorace bidentato, abdominis petiolo subtus vnidentato. *Syst. Ent.* 394. 18.

Habitat in India orientali.

attelaboi. 27. F. thorace bispinosa nigra, pedibus ferrugineis, capite postice attenuato. *Syst. Ent.* 394. 19.

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Ammon. 28. F. thorace bispinoso, squama petiolari spinis duabus incurvis. *Syst. Ent.* 394. 20.

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

CLASS. III. SYNISTATA. Formica. 493.

29. F. thorace quadrispinoso, squama petiolari spinis *bihamata* duabus arcuatis. *Syst. Ent.* 394. 21. 8. *ta.*
Formica bihamata; *Drury Ins.* 2. tab. 38. fig. 7. 8.
Sulz. Hif. Ins. tab. 27. fig. 19.
 Habitat in Insula St. Iohannis Indiae.
30. F. thorace anticè bispinosa, squama petiolari quadri-*militaris*, spina. *spinosa.*
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Corpus magnum. Caput magnum, gibbum, nigrum, inter antennas vtrinque carinatum. Thorax gibbus, fasciis anticè vtrinque spina acuta valida. Squama petiolaris spinis quatuor erectis, validis, lateralibus paullo minoribus. Abdomen globosum, pubescent, nigrum. Alae fulcae.
31. F. thorace quadrispinoso, capite didymo magno, vtrinque postice marginato. *Syst. Ent.* 395. 22. *Linn. Syst. Nat.* 2. 964. 15.
Formica migratoria fusca carinata, capite didymo magno vtrinque postice spinoso; thorace quadrispinoso. *Deger. Ins.* 3. 604. 5. tab. 21. fig. 11.
Formica magna. *Margr. Bruf.* 252.
Morsia. *Nat.* tab. 18. fig. maiore.
Seb. Mus. 4. tab. 99. fig. 6.
 Habitat in America meridionali.
32. F. thorace sexspinosa, capite didymo maximo. *Syst. Edens.*
Ent. 395. 23. *Linn. Syst. Nat.* 2. 964. 14.
Formica rufa capite didymo magno vtrinque postice spinoso, thorace sexspinoso. *Deger. Ins.* 3. 608. 6.
 tab. 31. fig. 14. 21. 17. 19.
 Habitat in America meridionali.
33. F. thorace quadrispinoso, capite depresso marginato *atra*.
 vtrinque bispinosa. *Syst. Ent.* 395. 24. *Linn. Syst. Nat.* 2. 965. 16.
Formica quadridens atra nitida, capite magno depresso marginato vtrinque bispinosa, thorace quadrispinoso. *Deger. Ins.* 3. 609. 7. tab. 31. fig. 17.
Tapital. *Margr. Bruf.* 252.

Seb.

Sib. Mus. 4. tab. 99. fig. 7.

Habitat in America meridionali.

- gulosa.* 34. F. rufa, abdomine apice nigro primo segmento contracto, mandibulis porrectis. *Syst. Ent.* 395. 25. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- hamata.* 35. F. ferruginea, capite maximo pallido, mandibulis porrectis hamatis.

Habitat Caiennae. *Mus. Dom. Teats.*

Media. Caput maximum lindrotundum, pallidum, hirtum, basi quinque spina parua, conica. Maxillae porrectae, capite longiores, hamatae, acutae, nigrae. Antennae nigrae basi ferrugineae. Corpus ferrugineum thorace inermi petioloque binodolo.

- haemato-* 36. F. squama petiolari conica acutissima, capite subdido, mandibulis porrectis. *Syst. Ent.* 395. 26. * *Linn.*
Syst. Nat. 2. 965. 17.

Formica maxillofa alata nigro fusca, pedibus maxillis que porrectis rufis, squama petiolari conica. *Degeer.*
Ins. 3. 601. 2. tab. 31. fig. 3.

Habitat in America meridionali.

- maxillo-* 37. F. thorace sexdentato capite flavescente, mandibulis longitudine capitis. *Syst. Ent.* 396. 27. * *Linn.*
Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*

125. M.V.T.I.L.L.A.

- occidenta-* 1. M. coccinea, abdomine cingulo nigro. *Syst. Ent.* 396.
415. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 966. 1.

Petiv. Mus. 404.

Gazoph. tab. 13. fig.

Felic. 404 tab. 41 fig. 42.

Catesb. Carol. 3. p. 15. tab. 15.

Sulz. Ins. tab. 19. fig. 93. 2.

Habitat in America septentrionali.

Aeuleus reconditus, punctorius.

- antiquen-* 2. M. coccinea, abdominis apice nigro, frigis albis. *Syst.*
Ins. 2. *Ent.* 396. 2. *

Habitat in Antigua insula. *Dom. Drury.*

- america-* 3. M. atra, abdomine maculis quatuor flavescentibus, lineisque tribus albis. *Syst. Ent.* 396. 2. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 966. 2.

Sphex

CLASS. III. SYNISTATA. *Mutilla.* 495

- Sphex americana* aptera nigra, abdomine maculis rufis, quatuor lineisque tribus albis. *Deger Inf.* 3. 591.
8. tab. 30. fig. 10.
Habitat in America australi.
4. *M. nigra*, abdomine linea dorsali punctorum albido-formicatum. *Syst. Ent.* 397. 4. *
Mutilla Dom. Banks.
Habitat in noua Hollandia.
5. *M. atra*, abdomine punctis duobus bascos striga interrupta lineolaque postica lauis. *Syst. Ent.* 397. 5. *
Mutilla Dom. Drury.
Habitat in America.
6. *M. coerulescens*, abdomine macula magna aurea. *Syst. aurata*,
Ent. 397. 6. *
Mutilla Dom. Banks.
Habitat in noua Hollandia.
7. *M. nigra*, thorace rufo, abdominis segmentis margine europaea albis. *Syst. Ent.* 397. 7. *
Mutilla europaea nigra, abdomine fasciis duabus albis, thorace antice rufo. *Linn. Syst. Nat.* 4. 966. 4.
Fab. Sv. 1727.
Sulz. Hist. Inf. tab. 27. fig. 23. 24.
Apis aptera. *Vdm. Diff.* 98; tab. 17.
Habitat in Europae sylvis acerofis.
8. *M. nigra*, antennis rufis, ano albido. *Syst. Ent.* 397. 8. * *ruficornis*.
Habitat in noua Hollandia.
9. *M. nigra*, thorace supra rufo, abdomine coeruleo, fasciis duabus albis. *Syst. Ent.* 397. 9.
Mutilla atrata atra, abdomine fascia alba, thorace immaculato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 966. 5.
Habitat in Africa.
Alae fuscantes.
10. *M. nigra*, abdomine maculis quatuor albis, thorace rufo. *Syst. Ent.* 398. 10. *Mutilla*. *Syst. Nat.* 2. 967. 6.
Habitat in Europa australiori.
11. *M. abdome basi apiceque nigro*, medio rufo, fascia vermiculata, puncto nigro. *Syst. Ent.* 398. 11. *
Habitat in America meridionali.
12. *M. glabra nigra*, ore, thorace, abdomineque subtus rufis. *Syst. Ent.* 398. 12. *
Habitat in Oriente.

CLAS.