

JOH. CHRIST. FABRICII

HIST. NAT. OECONOM. ET CAMERAL. P. P. O. SOC. IMP.  
NAT. CURIOS. HAFN. NORW. BEROL. LIPS. OECON. LUND.  
PETROP. TAURIN. JENENS. LOND. HIST. NAT. NEC NON  
PARIS. AGRICULT. HIST. NAT. ET PHILOM. MEMBR.

# S U P P L E M E N T U M

ENTOMOLOGIAE SYSTEMATICAЕ.

---

H A F N I A E ,

A B U D P R O F T E T S T O R C H .

M D C C X G V I I I .

v

Entomologiam nunc virilem vegetamque laetus obseruo. Video scientias heroes systemata elaborare, classes condere generaque noua introducere. Gratus certe labor, quo scientiae nitor magnopere augetur. Plures tamen fundamento ludicro inaedificant, systemata saepius diuersissima iungere tentant, et eo ipso filum systematis ariadneum amittunt. Characteres classium generumque omnino omnes iisdem semper partibus desumendi sunt et hoc primum et firmum artis est fundamentum. Instrumenta cibaria introduxi, constantissima inaeni at nullo modo cum aliis aliisque partibus iungenda. Mixta semper chaos praebent et lacefitus demonstrationem fuscipiam.

Video Entomologes species innumeras depingere, describere, aut obseruationibus adumbrationibusque scientiam illustrare, quo maiorem vigorem et certitudinem attingit. Nimia verboitate vero crambeque decies co-

Eta paginas polluunt et scientiae nitorem pin-  
guedine obruunt.

Supplementum hoc Entomologiae syste-  
maticae nunc offero. Continet genera phu-  
rima noua, characteribus certis firmata, con-  
tinet species numerosas, differentiis vitis di-  
stinctas, adiectis synonymis, locis, obserua-  
tionibus.

Agonatorum classem in primis et nomi-  
ne et charactere e speciminibus bene conser-  
uatis ab amicissimo Daldorffio ex India orien-  
tali allatis mutauit, diuisi et classes magis na-  
turales characteresque firmiores obtinuit.  
Vale L. B. et laboribus nostris faue.

Kiliae,  
20. Febr. 1798.

CLASSIS IV.  
PIEZATA.

*MAXILLA CORNEA, COMPRESSA, SAEPE  
ELONGATA.*

O R Y S S U S.

*Os clypeo rotundato, porrecto, integro.*

*Palpi quatuor, inaequales.*

*anteriores* porrecti, filiformes, quinquearticulati: articulo tertio longiori, cylindrico maxillae dorso inserti.

*posterioribus* breuiores, triarticulati: articulis duobus baseos cylindricis, ultimo sublongiori, ouato labii medio interiori inserti.

*Mandibula brevis, crassa, cornea, edentula.*

*Maxilla coriacea, compressa, apice membranacea, rotundata.*

*Labium membranaceum, apice coriaceum, elongatum, rotundatum, integrum.*

*Antennae laterales maris articulatae, feminae 10articulatae, filiformes.*

BANCHUS.

*Os clypeo breni, corneo, rotundato, integro.*

*Palpi quatuor porrecti, inaequales, filiformes.*

O

*anteriores* longiores, sexarticulati: articulis cylindricis, aequalibus adhaerentes maxillae dorso.

*postiores* paullo breuiores, quadriarticulati: articulis cylindricis aequalibus adnati labii medio.

*Mandibula magna*, lata, fornicata, apice truncata, dentata.

*Maxilla brevis*, membranacea, rotundata, integra.

*Labium basi cornuum*, cylindricum, apice membranaceum, rotundatum, integrum.

*Antennae* setaceae.

### O P H I O N.

*Os clypeo brevi rotundato*, integro.

*Palpi* quatuor elongati, inaequales, filiformes.

*anteriores* longiores, sexarticulati: articulis cylindricis, subaequalibus adhaerentes maxillae dorso.

*postiores* quadriarticulati: articulis cylindricis adnati labii apice.

*Mandibula porrecta*, cornea, incurva apice bidentata.

*Maxilla brevis*, membranacea, rotundata, integra.

*Labium breve*, ouatum, membranaceum, integrum, apice paipigerum.

*Antennae* setaceae.

### F O E N U S.

*Os clypeo brevi, rotundato, emarginato.*

*Palpi* quatuor breves, subaequales, filiformes.  
*anteriores* vix maxilla longiores, sexarticulati:  
 articulis cylindricis, subaequalibus adhae-  
 rentes maxillae dorso.  
*posteriorres* paullo breuiores, quadriarticulati ad-  
 natii labii medio.  
*Mandibula* cornea, arcuata, acuta, edentula.  
*Maxilla* brevis, membranacea, compressa, api-  
 ce rotundata, intus unidentata.  
*Labium* breve, membranaceum, transuersum, in-  
 tegrum.  
*Antennae* breues, filiformes.

### S P H E X.

Os lingua porrecta, trifida.  
*Clypris* brevis rotundatus, corneus, integer.  
*Palpi* quatuor porrecti, subaequales, filiformes.  
*anteriores* vix longiores, sexarticulati: articu-  
 lis cylindricis adhaerentes maxillae dorso.  
*posteriorres* quinque articulati: articulis cylindri-  
 cis, aquilibus adnati labio pone medium.  
*Mandibula* incurva, obtusa, cornea, in medio  
 unidentata.  
*Maxilla* elongata, compressa, cornea, integralia-  
 ciniam exteriorem linguae vaginantem con-  
 stituens.  
*Labium* maxilla paullo longius, basi corneum, cy-  
 lindricum, apice membranaceum, depres-  
 sum, in medio sita parua, subulata sufful-  
 tum apice emarginatum.  
*Antennae* filiformes.

### O 2

*S. speciosa*, *ichneumonea*, *grossa* aliae *labium*  
maiis, magis emarginatum gerunt at vix di-  
stinctum genus.

## POMPILUS.

*Os* clypeo brevi, corneo, rotundato, integro.

*Palpi* quatuor porrecti, inaequales, filiformes,  
*anteriores* longiores, sexarticulati: articulis tri-  
bus anterioribus subrhomboidibus, reli-  
quis longioribus, cylindricis maxillae dorso  
adhaerentes.

*postiores* breuiores, quadriarticulati: articulis  
tribus subrhomboidibus: ultimo evato ad-  
nati labii apice.

*Mandibula* recta, cornea, medio unidentata.

*Maxilla* brevis, compressa bifida: lacinia exterio-  
re cornea, rotundata, interiore membrana-  
cea, obtusa.

*Labium* breve longitudine maxillarum, corneum,  
rotundatum, integrum apice palpigerum.

*Antennae* breves, setaceae.

CYNIPS. *Palpi inaequales, subcapitati.*

*Labium corneum, integrum.*

*Antennae moniliformes.*

1—2. *C. atra nitida ab domine compresso, tibiis compressa.*

ferruginea.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Magna in hoc genere. Corpus totum atrum, nitidum, immaculatum tibiis solis rufis. Abdomen valde compressum.

10—11. *C. atra nitida thorace pedibusque pallide flava.* *Quercus Ilicis.*

Habitat in Galla parua, depressa, associata, monothalamia Ilicis Gallo Provinciae Muf. Dom. Bosc.

Parua. Caput atrum, nitidum. Thorax striatus, pallide flavius. Abdomen compressum, atrum, nitidum. Alae elongatae, albae. Pedes pallidi.

10—11. *C. grisea ab domine ferrugineo nitido: Quercus macula dorsali atra.* *radicis.*

*Cynips quercus radicis* Bosc. Journ. de Phys.

1794. fig.

Habitat in Galla lignea, polythalamia dura in radicibus Quercus Roboris.

Statura et summa certe affinitas *C. Quercus Terminalis* at galla omnino differt.

10—11. *C. ferrugineo flava, alis hyalinis immaculatis.* *Quercus terminalis.*

Reaum. Ins. 3. tab. 41. fig. 1—5.

Habitat in Galla magna, fungosa, rotundata,  
polythalama ramulos Quercus terminante  
Mus. Dom. Bosc.  
Media tota flava alis hyalinis.

*Serratulae.* 15 — 6. C. atra nitida antennis verticillato pilosis.  
Reaum. Inf. 3. tab. 1.

Habitat in Galla lignea, rotundata, utrinque  
attenuata, polythalama capitis Serratulae ar-  
vensis Galliae Mus. Dom. Bosc.

Media, tota atra; nitida alis solis albis. An-  
tennae filiformes, nigrae, verticillatae, pilo-  
sae. Abdomen compressum, ascendens.  
Pedes nigri tibiis obscure piceis. *Variat* for-  
te sexu maior antennis minus verticillatis, vix  
tamen distincta.

### TENTHREDO. *Palpi* filiformes.

*Labium* trifidum.

*Antennae* clavatae  
aut filiformes.

*laeta.* 10 — 11. T. antennis clavatis nigra abdominis seg-  
mentis margine laterali flavis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
Statura et magnitudo T. sericeae. Caput, an-  
tennae, thorax nigra, immaculata. Abdo-  
men nigrum segmentis baseos utrinque mar-  
gine, reliquis margine toto flavo. Alae al-  
bidae costa basi flavecente.

*furcata.* 28 — 29. T. antennis furcatis pectinatisque nigra  
abdomine rufo.

*Tenthredo furcata* Vill. 3. tab. 7. fig. 16. 17.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bosc.

Statura et magnitudo omnino T. Juniperi. Antennae nigrae usque ad articulum primum bitidae: laevis pectinatis. Caput et thorax nigra. Abdomen ferrugineum articulo primo et secundo nigris. Alae hyalinae. Pedes ferruginei. Variat sexu antennis haud furcatis.

31—2. T. antennis septemnodiis nigra antennis *pallicornis*.

scutello abdominalisque segmentis apice albidis.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bosc.

Magnitudo T. flanicornis. Caput nigrum labio mox albo, mox nigro. Thorax ater marginé antico utrinque puncto maiori, terminali, albo. Scutellum album. Abdomen segmentis basi nigris, apice late pallidis. Pedes flavi femoribus nigris.

33—4. T. antennis septemnodiis atra thorace *segmentaria* immaculato, abdominalis segmentis apice tibiae albisque albis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Magna. Caput cum antennis atrum. Thorax ater, immaculatus. Abdomen atrum segmentorum margine albo. Pedes nigri, tibiae albis.

36—7. T. antennis septemnodiis nigra abdomen *figma*, segmentis intermediis rufis; scutello stigmateque alarum albis.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Boſc.

Affinis omnino T. nassatae. Antennae supra nigrae, subtus piecae. Caput atrum. Thorax at puncto calloſo ante alas marginē albo in dō. Scutellum album et puncta duo parva sub scutello. Abdomen nigrum tegumento 3. 4. 5. 6. rufis. Alae hyalinae flagitate ordinario, albo. Pedes rufi.

*abdominalis.* 38—9. T. antennis septemnodis atra, abdome rufo basi atro.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Boſc.

Caput atrum ore rufi. Antennae supra nigrae, subtus rufae. Thorax ater. Abdomen breue, rotundum, rufum segmentis anticis duobus atris. Alae basi nigrae, apice obscurae. Pedes rufi.

*melanocephala.* 38—9. T. antennis septemnodis flava capite atro. Habitat in Gallia Mus. Dom. Boſc.

Statura parua T. Alii. Caput cum antennis atrum. Thorax rufus scutello subangustato. Abdomen parum pallidius. Alae incombentes, hyalinae. Pedes flavi.

*velox.* 47—8. T. antennis septemnodis atra ore antenarum apice punctoque femorali albis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Distincta omnino a praecedentibus et minor.

Antennae nigrae, apice albae. Caput atrum ore albo. Thorax ater, immaculatus. Abdomen breue, depresso, atrum, immaculatum. Pedes ferruginei femoribus posticis basi atris puncto albo. Alae hyalinae.

51—52. *T. antennis septemnodiis atra scutello zincta,*

abdominis cingulis duobus anque albis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statuta omnino praecedentis at distincta et alia.

Antennae breves, nigrae articulo primo eras-  
fiori albo. Capitum nigrum ore albo. Tho-  
rax niger macula utrinque ante alas scutello-  
que albis. Abdomen atrum cingulis duobus  
anque albis. Pedes albi, postice nigri fe-  
moribus tibialisque basi albis.

58—9. *T. antennis septemnodiis atra abdominis strigosa.*

tegmento quarto rufo, penultima duabus  
utrinque linea albida.

Habitat in Gallia Msl. Dom. Bosc.

Statuta omnino *T. blanchae*. Capitum atrum la-  
bio albo. Thorax niger puncto ante alas  
scutelloque albis. Abdomen cylindricum, ni-  
gri utrinque quinto ferrugineo, septimo  
et octavo utrinque lineola glacea. Pedes ru-  
fi tibialis basi auctio nigro.

60—1. *T. antennis septemnodiis atra thorace ab- fera,*

abdomine et scutello utrinque postice albo punctatis.

*T. blanchae f. f.* Sepp. Pl. et Fp. Inf. tab. 22.

G. II. fol. 2. Tenth. 13.

Habitat in Gallia Msl. Dom. Bosc.

Allius videtur *T. r. spinicollis*. Antennae ni-  
graes. Capitum nigrum labio albo. Thorax  
niger pagellis duobus anticeis scutelloque al-  
bis. Abdomen nigrum utrinque lineolis dua-  
bus approximatis pone medium anque al-  
bis. Pedes nigri femoribus posticeis macula

magna baseos tibiisque omnibus albis. Alae obtuseae.

*punctata*. 71—2. T. antennis multiarticulis nigra capite punctis thorace margine abdomine strigis albis.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bofe.

Statura omnino T. sylvatica. Caput magnum atrum punctis quinque albi, in orbem positis. Thorax niger margine antico albo. Abdomen planum, atrum strigis 4—5 albis, obsoletis. Pedes ferruginei femoribus macula nigra.

ORYSSUS. *Palpi* postici breviores filiformes.

*Labium* elongatum, rotundatum, integrum.

*Antennae* filiformes.

*coronatus*. 1. O. thorace maculato ab domine apice rufo: puncto anali albo.

*Sphex abietina* Scopol. Ent. carn. 788.

Habitat in Galliae arboribus Dom. Latreille.

Corpus medium statura Sitex. Antennae nigrae articulo 2. 3. 4. hyperne albis. Caput nigrum orbita oculorum alba. Thorax scaber, niger puncto utique ante alas albo. Abdomen basi nigruus apice rufum puncto anali albo. Alae albae ante apicem nigrae. Pedes albi femoribus nigris.

Faemina aculeo conuoluto, elongato.

2. O. thorace immaculato, abdomine basi nigro *Vespertilio.*  
apice rufo.

*Sirex Vespertilio* Ent. syst. 2. 129. 19.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura et summa affinitas praecedentis at paulo maior.

ICHNEUMON. *Labium cylindricum,*  
apice membranaceum, emarginatum;  
medio palpigerum.

*Antennae setaceae.*

17—18. I. scutello albo, thorace maculato ater *natatorius.*  
abdominis segmento secundo tertioque pun-  
ctis duobus albis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Corpus magnum, atrum. Antennae atrae an-  
nulo in medio albo. Caput atrum orbita oculorum albida. Thorax niger punctis duobus  
ante alas scutelloque flavicantibus. Abdomen  
atrum, nitidum segmento secundo punctis  
duobus maioribus basi coenibus, tertio  
punctis duobus distinctis flavicantibus. Pe-  
des rufi.

19—20. I. scutello albo ater thorace maculato, ab- *expelleri-*  
domine rufo: primo segmento nigro. *us.*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Difert manifeste ab. I. pilorio minor. Caput  
atrum mandibulis rufis, apice nigris. Tho-  
rax ater, nitidus punctis duobus ante alas

albis. Scutellum nivium. Abdomen oblongum, planum, rufum primo segmento atro. Pedes rufi femoribus nigris.

*laminato-* 33—4. I. scutello albo thorace maculato ater labio albo: lineis tribus nigris.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Magnus. Antennae nigrae, immaculatae. Caput atrum labio albo lineis tribus abbreviatis, nigris. Orbita oculorum alba. Thorax niger puncto calloso ante alas, puncto sub alas lineaque utrinque ad marginem dueta scutelloque albis. Abdomen atrum. Pedes albo nigroque varii.

*nugatorius.* 39—40. I. scutello albo, thorace maculato ater abdominis segmento secundo tertioque basi fulvis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura omnino I. fasciatur. Antennae subtus rufae. Caput atrum orbita oculorum fasciaque labii fulvis. Thorax ater puncto sub alas albo, sub scutello bipinotus. Abdomen oblongum, atrum segmento secundo tertioque basi fulvis. Petiolus canaliculatus. Alae flavescentes. Pedes ferruginei femoribus atris.

*fauatorius.* 54—5. I. scutello albo fulvis antennis abdominalisque ultimis segmentis atris.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Magnus. Antennae totae atrae. Caput fuluum oculis stemmatibusque verticalibus atris.

Thorax fulvis interdum immaculatus, in-

terdum dorso nigro. Scutellum album. Abdomen oblongum, planum, fuluum ultimis duobus segmentis atris, nitidis. Alae flavescentes. Pedes fului femoribus posticis apice atris.

- 55—6. I. scutello albo, thorace maculato, abdo *similatori-*  
mine rufo: petiolo nigro. *us.*

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bosc.

Affinis I. fusorio at minor. Antennae porrectae, nigrae. Caput nigrum orbita oculorum parva, alba. Thorax niger lineolata ante utrinque scutelloque albis. Abdomen ovatum, rufum petiolo nigro. Pedes rufi femoribus nigris.

- 57—8. I. scutello albo: puncto fulvo niger tho- *oculatorius.*  
race ante scutellum fulvo flavoque vario.

Habitat Paritiis Mus. D. Bosc.

Medius. Caput nigrum sub antennis oculorumque orbita albis. Thorax niger ante scutellum flaves: maculis tribus magnis, oblongis, obscure fuluis: intermedia minore, pone scutellum niger. Scutellum album macula magna media fulua. Abdomen longiusculum, atrum segmentorum marginibus vix fuluis. Alae hyalinae. Pedes rufi.

- 63—4. I. scutello albo, thorace immaculato, ab- *erectorius.*  
dominis segmento secundo tertioque rufis.

Habitat Kiliae.

Statura et magnitudo I. luctatorii at distinctus et aliis. Caput et thorax atra, immaculata. Scutellum album. Abdominis primum

segmentum nigrum linea dorsali eleuata, 2.  
3. rufa, reliqua nigra. Pedes rufi tibiis po-  
sticis basi albis.

*truncator.* 81—2. I. niger thorace pedibusque ferrugineis.  
Habitat Parisis Mus. Dom. Bosc.

Parvus. Antennae subferrugineae fascia media  
alba. Caput nigrum mandibulis palpisque  
albidis. Thorax laevis, ferrugineus, im-  
maculatus. Abdomen longitulum, tubey-  
lindricum, atrum aculeo breuissimo. Alae  
vix abdominalis longitudine, hyalinae. Pe-  
des rufi.

*luteator.* 87—8. I. ferrugineus abdome apice atro: ano  
albo.

Habitat Halac Saxonum Dom. Hybner.

Medius. Antennae primo articulo ferrugineo  
basi fuscae, apice nigrae, in medio aliquo an-  
nulatae. Caput et thorax ferruginea, im-  
maculata. Abdomen ferrugineum, apice  
atrum ano supra albo. Pedes ferruginei, po-  
sticis geniculis atris.

*brunneator.* 28—9. I. ferrugineus capite atro.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Parvus. Antennae porrectae annulo lato albo.  
Caput atrum, immaculatum. Corpus fer-  
ruginosum. Alae hyalinae, nitidae.

*abreuiator.* 89—90. I. ater abdome rufo apice atro: striga  
alba, alis breuissimis.

Habitat in Kiliae muris Dom. Weber.

Medius. Antennae basi rufae, medio albae, api-

*ee nigrae.* Caput et thorax atra, immaculata. Abdomen rufum ano late nigro: striga postica nivea. Alae brevissimae, ouatae, albidae. Pedes rufi femoribus posticis apice nigris.

- 92—3. *I. ferrugineus* capitis vertice atro, alis fuscis: *laminator.*  
costa dimidiata ferruginea.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Affinis videtur *I. castrator* at duplo maior. Caput ferrugineum antennis, vertice nuchaque atris. Thorax ferrugineus puncto paruo, dorsali, atro. Abdomen planum, depresso, ferrugineum aculeo exerto, nigro. Alae fuscae, basi pallidiores costa ferruginea, in medio stigmate magno, ferrugineo utrinque atro notato. Pedes ferruginei.

- 92—3. *I. ferrugineus* antennis capitis vertice thoricisque dorso nigris, alis fuscis: stigmate nigro; puncto flauescente.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura et magnitudo *I. desertor.* Antennae nigrae. Caput ferrugineum vertice nigro. Thorax niger margine antico et laterali, ferrugineo. Abdomen ferrugineum aculeo breui, atro: setis lateralibus brevioribus. Alae fuscae stigmate flavo utrinque nigro terminato. Pedes ferruginei femoribus tibiisque posticis apice puncto nigro.

- 93—4. *I. niger* ab domine coccineo, alis albidis: *fasciator.*  
fascia lata nigra.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

**Medius.** Caput et thorax atra, nitida, immaculata. Abdomen rufum. Anus forte niger inhi decit. Alae albidae fascia media laeta, nigra. Pedes nigri.

**spinator.** 100—1. I. ferrugineus vertice atro abdominis segmentis punctis duobus alarumque macula apicis nigris.

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Dillorff.

**Medius.** Antennae nigrae, basi fluae. Caput ferrugineum vertice atro. Thorax ferrugineus linea dorsili, antice atra. Abdomen ferrugineum segmento singulo punctis duabus parvis, nigris. Alae hyalinae macula magna vertex apicem sulca. Pedes ferruginesci.

**serrator.** 106—7. I. ater aliis fascis: lunula pallida, abdominalis segmento primo secundo tertioque rufis, femoribus politis ferratis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

**Major.** Caput cibielevatum et thorax atra im- maculata. Alae suæ tenula obsoleta, pallida ad marginem crassi-rem. Abdomen clauatum segmento primo elongato, cylindri- co, secundo tertioque rufis. Aenanus or- tudine corporis. Pedes rufi femoribus atris puncto apicis albo, polita ferrata.

**urinator.** 111—12. I. niger thorace antice ruso, abd. in- ne ruso: maculis cornalibus nigris, aliis fascis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura parua I. denigratoris. Antennae nigrae.

Caput nigrum, innaculatum. Thorax an-

tice rufus, postice niger. Abdomen rufum maculis dorsalibus baseos nigris. Alae fuscæ. Pedes nigri.

III—12. I. ater abdomine rufo: linea dorsali *minutator*. atra, alis fuscis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Corpus paruum, atrum, immaculatum. Abdomen rufum linea dorsali atra. Alae fuscæ. Pedes rufi femoribus basi nigris.

III—12. I. niger abdomine ferrugineo alis fuscis: macula flava basi pallidioribus. *elector*.

Habitat Cajennæ Dom. Richard.

Distincta omnino ab. I. denigrator corpore pallido maiore, minus atro, abdomine magis elongato ferrugineo, aculeo nigro. Alae basi pallidiores, apice fuscae stigmate marginali magno, flavo. Pedes nigri.

127—28. I. niger abdomine obscure ferrugineo: *carinator*. petiolo bicarinato nigro.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Medius. Caput nigrum, sub antennis album linea media nigra. Thorax niger puncto ante alas aliquo sub alis albis. Abdomen obscure rufum petiolo breui lineis duabus elevatis carinato, nigro. Pedes rufi, postici nigri.

131—2. I. ater thorace antice pedibusque ferrugineis: *calculator*.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Medius. Caput nigrum ore flavo. Thorax antice rufus, postice sub scutello subtusque ni-

ger. Abdomen subpetiolatum, atrum aculeo exerto fere longitudine corporis. Pedes rufi, postici atri tibiis basi albis. Alae hyalinae stigmate atro.

Alium ecaudatum abdomine sessili ex Italia accepti, an distinctus?

*firmator.* 135—6. I. ecaudatus ater abdominis segmento secundo tertioque rufis, ultimis apice albis.  
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
Statura et magnitudo I. castigatoris. Caput atrum sub antennis punctis pallidis. Thorax ater, immaculatus. Abdominis primum segmentum incrassatum, atrum, 2. 3. ferruginea, ultima margine albo. Pedes ferruginei, postici nigri.

*tripunctata.* 135—6. I. ecaudatus ater thorace immaculato, abdomine punctis tribus albis.  
Habitat in Gallia Dom. Coquebert.  
Medius. Corpus atrum. Puncta duo alba in segmento secundo et unicum in quinto. Femora postica rufa.

*exhaustator.* 138—9. I. niger abdomine rufo basi apiceque nigro: aculeo recurvo falcato.  
Habitat Kiliae Dom. Weber.  
Parvus. Caput et thorax nigra, immaculata mandibulis solis ferruginea. Abdomen breve, petiolatum, apice compressum, truncatum, rufum basi apiceque nigrum. Aculeus longitudine abdominalis recurvus, arcuatus, niger. Pedes ferruginei femoribus com-

presso. Alae obscurae macula marginali atra.

177—8. I. ater abdominis segmento secundo maximo ferrugineo, pedibus rufis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Medius. Caput, antennae, thorax nigra, immaculata. Abdomen nitidum, basi apicèque attenuatum, nigrum segmento secundo maximo, campanulato, ferruginoso. Alae hyalinae puncto costali nigro. Pedes rufi.

182—3. I. ater ab domine depresso piano, pedibus rufis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Corpus paruum, atrum, immaculatum. Abdomen singulare in hoc genere breve, depresso, planum. Alae obscurae. Pedes omnes rufi.

162—3. I. ater ab domine piceo: aculeo falcato, emarginator, pedibus rufis alis abbreviatis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Medius. Caput et thorax atra immaculata. Abdomen oblongum, piceum, nitidum aculeo longitudine abdominis, rigido, falcato. Alae breves at bene explicatae, obscurae puncto magno costali nigro. Pedes rufi.

189—90. I. fusco ferrugineo que varius ab domine clavatus. ne clavato ferrugineo: lunulis lateralibus flaguis nigro innatis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

**Maximus** in hoc genere. Antennae lateae. Caput et thorax ferrugineo fusco que varia.

*Abdomen compressum, clavatum anno dilatato ferrugineum lunula magna flavâ macula nigra innata utrinque in singulo segmento; primo toto flavo. Aculeus corpore longior. Pedes flavi.*

*ferrugineus.* 189—90. I. fulvus abdominis segmentis utrinque puncto flavo.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

*Magnus.* Caput fulvum mandibulis stemmate tibusque nigris. Thorax fulvus lineis duabus dorsalibus, fere obsoletis, nigris puncto que sub alis flavo. Abdomen petiolatum, fulvum utrinque punctis 4—6 flavis. Aculeus niger longitudine abdominis. Alae albidæ macula ordinaria flava.

*teflaceus.* 189—90. I. luteus abdome ouato depresso, alis stigmate luteo.

Habitat in Germania Dom. Daldorff.

*Medius.* Corp̄s totum luteum, immaculatum. Antennæ paullo obscurores articulo primo luteo. Alae hyalinae stigmata lutea. Abdomen ouatum, depresso segmentis distin-ctis. Aculeus brevissimus.

*bidens.* 203—4. I. ater abdominis segmentis ultimis marginé albis, petiolo bidentato.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

*Medius.* Antennæ ferrugineæ. Caput nigrum sub antennis flavum macula magna, frontali, trianguli nigra. Thorax niger, immaculatus. Abdomen petiolatum, ouatum, atrum segmentorum marginibus in primis ul-

timis albis. Petiolus in medio denticulis duobus paruis, elevatis. Pedes rufi plantis posticis fuscis. Alae hyalinae stigmate flavo.

- 205—6. I. flavius capitis vertice thorace sub scutellō aculeoque nigris, alis puncto marginali flavo.

Habitat Kiliae Weber.

Parvus. Antennae flavae, nigro annulatae.

Caput flavidum vertice nigro. Thorax flavius puncto elevato marginis antici atro, sub scutello niger. Abdomen ovatum, flavidum aculeo brevi, nigro. Alae hyalinae macula marginali, ordinaria, flava. Pedes flavi.

- 207—8. I. ater abdominali petiolo ferrugineo, *umbratus*.  
alis fuscis: striga media apiceque albis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Corpus parvum I. cincti. Antennae ferrugineae. Caput nigrum. Thorax niger, sub scutello ferrugineus. Abdomen atrum, nitidum petiolo toto ferrugineo. Aculeus exsertus longitudine abdominis. Alae fuscae striga media apiceque albis. Pedes nigri.

- 211—12. I. cyaneus abdome basi fulvo apice *splendens*. nigro.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura praecedentium. Caput cyaneum, nitidum antennis nigris. Thorax cyaneus, immaculatus. Abdomen basi fuluum, apice nigrum. Pedes nigri.

*Ichneumones* hi minores forte proprii generis at characterem eruere nondum valui.

*stigmati-* 212—13. I. thorace aeneo nitido, abdomenne fla-  
*zans.* uo; dorso nigro.

Habitat in Galliae larvis Dom. Bosc.

Statura praecedentium. Caput viride, nitens,  
sub antennis flauum. Thorax viridis, nitens,  
innoculatus. Abdomen ovatum, flauum  
dorso nigro. Aculeus exsertus, niger longi-  
tudine corporis. Pedes flavi. Alae albae  
puncto magno subcostali, nigro.

*flavus.* 213—14. I. ater abdome falcato: segmento ter-  
tio rufo.

Habitat Halee Saxonum Dom. Hybner.

Magnus in hac familia. Antennae omnino fi-  
liformes, nigrae. Caput et thorax atra, im-  
maculata. Abdomen breue, falcatum, api-  
ce valde compressum, dilatatum, atrum  
segmento tertio rufo. Pedes ferruginei.

*fulgens.* 213—14. I. thorace capreo postice viridi, abdo-  
mine compresso atro: fascia fulua.

Habitat in Galliae larvis. Mus. Dom. Bosc.

Statura praecedentium. Caput cupreum an-  
tennis breibus, nigris: articulo primo sub-  
tus flavescente. Thorax cupreus, nitidus,  
postice viridis. Abdomen magnum, com-  
pressum, nigrum fascia lata, flava. Acu-  
leus exsertus longitudine corporis. Pedes  
rufi.

*obsoletus.* 218—19. I. niger capite viridi, abdome nigro  
aenco, alis albis: puncto fusco.

Habitat in Italia Mus. Dom. Bosc.

Paruus. Caput viride sub antennis, nigrum.

Antennae nigrae. Thorax niger, obscurus.

Abdomen nigro aeneum, nitidum aculeo  
longitudine abdominalis. Alae albae puncto  
costali fusco. Pedes flavi femoribus aeneis.

218—19. I. pallidus capitis thoracisque dorso vi- *dorsalis*.  
ridi aeneo alis macula transuersa fusca.

Habitat in Gallia Dom. Bosc,

Caput pallidum antennis nigris maculaque qua-  
drata verticis viridi aenea. Thorax pallidus  
dorso viridi aeneo, nitido. Abdomen com-  
pressum, pallidum dorso obscuro. Aculeus  
exsertus, niger. Alae albae macula magna,  
transuersa, fusca. Pedes pallidi.

218—19. I. nigro cyaneus thorace obscure aeneo. *cyaneus*.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bosc,

Paruus. Caput et abdomen nigro cyanea, ni-  
tida. Thorax obscure aeneus. Antennae  
breues, crassae. Pedes atri.

220—1. I. obscure aureus ab domine depresso cy- *depressus*.  
aneo, alis apice fuscis; macula fasciaque po-  
stica albis.

Habitat Parisiis Dom. Bosc.

Paruus. Antennae capite concolores puncto  
apicis atro. Caput et thorax obscure aurea,  
vix nitida. Abdomen depresso, cyaneum,  
nitidum. Alae albae; apice fuscae puncto  
marginali magno fasciaque terminali albis,  
Pedes flavi.

220—1. I. viridi aeneus nitidus ab domine purpu- *purpurascens*.  
rascente: primo segmento aeneo.

## Habitat Parisis Mus. Dom. Bosc.

*Parvus.* Caput viride antennis nigris. Thorax viridi aeneus, nitidus, immaculatus. Abdomen purpurascens segmento primo magno, viridi aeneo. Pedes flavi.

*aleuarius.* 232—3. I. flanus thorace postice abdominisque dorso nigris.

Reaum. Inf. 2. tab. 35. fig. 7.

Geoff. Inf. 2. Ichn. 3.

Habitat in Galliae Phalaenae crataegatae larvis.

Exiens nec folliculos numerosos, aggregatos, albos, opereculo clausos.

Corpus paruum. Antennae setaceae, nigrae.

Caput et thorax flava thorace postice fusco.

Abdomen flavum dorso nigro. Alae hyalinae.

*verticilla-*  
*tus.* 235—6. I. ater antennis verticillatis, aliis albis.

Habitat in Germania.

Duplo maior I. pectinicorni. Antennae filiformes, nigrae articulo singulo pilis verticillato. Caput et thorax atra, immaculata. Abdomen subpetiolatum, breve, compressum, adscendens, atrum. Alae albae. Pedes nigri, apice ferruginei.

*feilans.* 247. I. apterus niger pedibus cinerascentibus.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Minutus, totus niger pedibus solis cinerascentibus.

BANCHUS. *Palpi quatuor elongati: articulis cylindricis.*

*Labium basi cylindricum, corneum, apice membranaceum, rotundatum integrum.*

*Antennae setaceae.*

1. B. niger abdomine subfalcato: basi subtus in *venator*, carnata, pedibus rufis.

*Ichneumon venator* Ent. syst. 2. 168. 143. Linn.

syst. nat. 2. 935. 36. Fn. Su. 1612.

Habitat in Europae nemoribus.

2. B. ater abdominis segmentis margine rufis, scutello eleuato unispinoso.

*Ichneumon hastator* Ent. syst. 2. 167. 141.\*

Habitat in Europae hortis.

3. B. ater abdomine clauato fornicate immacula-fornicatorio, pedibus rufis.

*Ichneumon fornicator* Ent. syst. 2. 168. 144.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Banchi corpus medium, oblongum, glabrum, immarginatum, agile, capite exerto, rotundato, transverso, oculis magnis, oblongis, lateralibus, subprominulis, antennis longiusculis, approximatis, inter oculos insertis: articulo primo clauato, vertice stemmatibus tribus, thorace eleuato, gibbo, scutello parvo, gibbo, abdomine vix petiolato; compresso, apice acuto absque aculeo, alis abdomine breavioribus, pedibus cursoriis, tarsis quinque articulatis, colore vario.

*variegator.* 4. B. niger thorace variegato, abdomine compresso clavato, segmentorum marginibus flavis, scutello acuminato.

*Ichneumon variegator* Ent. syst. 2. 173. 164.  
Habitat in Suecia.

*compressus.* 5. B. abdomine compresso: segmentorum marginibus flavis, antennis pedibusque luteis.

*Ichneumon compressus* Ent. syst. 2. 180. 195.

*varius.* 6. B. luteus pectore atro vario.

*Ichneumon varius* Ent. syst. 2. 181. 196.  
Habitat in Germania Dom. Smidt.

*pictus.* 7. B. niger flauo varius scutello subspinoso.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Simillimus omnino praecedenti, cuius varietatem olim credidi. Antennae luteae. Caput nigrum sub antennis flavidum: linea frontali nigra. Orbita oculorum postice flava. Thorax niger punctis duobus anticus, duobus sub alis, scutello valde acuminato, punctis tribus sub scutello paruis tribusque inferioribus maioribus: intermedio transuerso flavis. Abdomen compressum nigrum: fasciis plurimis flavis. Pedes flavi.

*falcatorius.* 8. B. scutello flauicante thorace variegato, abdome ferrugineo basi apiceque nigro.

*Ichneumon falcatorius* Ent. syst. 2. 148. 59.  
Habitat Hafniae.

*hiffrio.* 9. B. scutello flauicante, thorace variegato, abdome rufo.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

*Statura praecedentis at minor. Antennae porrectae, nigrae. Caput nigrum, sub antennis flauum. Thorax niger margine lineisque duabus dorsalibus basi abbreviatis, apice hamatis, flavis. Scutellum flauicans puncto nigro. Alae hyalinae. Abdomen compressum, rufum anno subfuso. Pedes rufi.*

**OPHION.** *Palpi quatuor porrecti: articulis cylindricis.*

*Labium ouatum, membranaceum, integrum.*

*Antennae setaceae.*

\* *Antennis luteis.*

1. *O. luteus thorace striato. luteus.*

*Ichneumon luteus* Ent. syst. 2. 178. 186. Linn.

syst. Nat. 2. 937. 55. Fn. Su. 1628.

Geoff. Inf. 2. 330. 72.

Goed. Inf. 2. tab. 37.

— — tab. 20. fig. 6.

Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 12.

Ophionis corpus medium, elongatum, glabrum, immarginatum, agile, capite exerto, rotundato, transuerso, oculis magnis, ouatis, lateralibus, subprominulis, antennis longitudine corporis, approximatis, inter oculos insertis: articulo primo crassiusculo; vertice stemmatibus tribus, thorace eleuato, gibbo, scutello parvo, subacuminato, abdomine elongato, petiolato, falcato, postice clavato, aculeo breuissimo, vix exerto, alis quatuor planis, posterioribus brevioribus, pedibus longiusculis, cursoriis, tarsis quinque articulatis, colore vario.

Schaeff. Icon. tab. 29. fig. 16. 17.

Sulz. Ins. tab. 18. fig. 118.

Habitat in Europae larvis.

*ramidulus.* 2. O. luteus abdomine apice nigro.

*Ichneumon ramidulus* Ent. syst. 2. 178. 187.

Linn. Fn. Su. 1629.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

*flavus.* 3. O. luteus vertice atro, abdomine apice fusco.

*Ichneumon flavus* Ent. syst. 2. 179. 188.

Habitat in Americae meridionalis Insulis Dom. v. Rohr.

*glaucopterus.* 4. O. luteus pectore anoque nigris.

*Ichneumon glaucopterus* Ent. syst. 2. 181. 198.

Linn. syst. nat. 2. 938. 57. Fn. Su. 1630.

Schaeff. Icon. tab. 82. fig. 3.

Habitat in Europae hortis.

*relicetus.* 5. O. obscure ferrugineus abdomine nigro basi ferrugineo.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Statura omnino O. circumflexi at alias videtur.

Caput, thorax, antennae obscure ferruginea.

Abdomen falcatum, atrum, nitidum, basi ferrugineum. Alae breues, obscurae. Pedes ferruginei tibiis posticis apice nigris.

*circumflexus.* 6. O. niger abdomine antice flavo, pedibus posterioribus nigro geniculatis, scutello flavo.

*Ichneumon circumflexus* Ent. syst. 2. 181. 199.

Linn. syst. Nat. 2. 938. 59. Fn. Su. 1631.

Habitat in Europae nemoribus.

7. O. obscurus thoracis dorso luteo: lineis tribus *obscuratus*.

ab breuiatis puncto que fuscis, abdominis lateribus flavo maculatis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura et magnitudo O. lutei. Antennae obscure luteae. Caput flavescens, immaculatum. Thoracis dorsum flavescens lineis tribus latis, fuscis, lateralibus antice abbreviatis, intermedia postice puncto que terminata. Abdomen obscurum maculis lateralibus flavis. Pedes obscuri.

8. O. ater alis cyaneis. *morio.*

*Ichneumon morio* Ent. syst. 2. 180. 194.

Habitat in America boreali Mus. Dom. Banks.

9. O. niger abdominis segmento tertio quartoque *flavifrons*.

rufis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Medius. Antennae ferrugineae. Caput nigrum sub antennis flavum. Thorax niger puncto parvo calloto ad basin alarum. Abdomen nigrum segmento tertio, quartoque rufis. Pedes rufi.

10. O. niger antennis pedibusque ferrugineis. *amiculus.*

*Ichneumon amiculus* Ent. syst. 2. 181. 197.

Habitat in Anglia Mus. Dom. Banks.

\* \* *Antennis nigris.*

11. O. niger thorace submaculato abdominis seg. *falcator.*

mento secundo tertio quartoque rufis.

*Ichneumon falcator* Ent. syst. 2. 174. 170.

Habitat in Succia.

*pugillator.* 12. O. thorace immaculato, abdomine rufo basi apiceque nigro, pedibus tenuibus ferrugineis.

*Ichneumon pugillator* Ent. syst. 2. 174. 171.

Linn. syst. Nat. 2. 936. 50. Fn. Su. 1624.

Geoff. Inf. 2. 332. 24.

Degeer Inf. 1. tab. 6. fig. 12.

Habitat in Bombyx Ziczac larva.

*saltator.* 13. O. ater abdomine brevissimo, pedibus posticis elongatis.

*Ichneumon saltator* Ent. syst. 2. 175. 173.

Habitat in Anglia Mus. Dom. Banks.

*erigator.* 14. O. ater thorace immaculato, abdomine breui: segmento tertio pedibusque rufis.

*Ichneumon erigator* Ent. syst. 2. 175. 174.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

*jocator.* 15. O. niger thorace immaculato, abdomine ferrugineo: petiolo segmento secundo margine, tertio basi nigris.

*Ichneumon jocator* Ent. syst. 2. 175. 175.

Habitat Kiliae.

*compensa-* 16. O. ater thorace immaculato, abdomine brevissimo: segmento secundo tertio quartoque rufis.

*Ichneumon compensator* Ent. syst. 2. 176. 176.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

*mercator.* 17. O. ater thorace immaculato, abdomine breui: segmento secundo apice tertio toto quartoque basi flavis.

*Ichneumon mercator* Ent. syst. 176. 177.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

18. O. ater thorace immaculato, abdomine bre- *flagellator*.  
ui, segmento secundo tertioque nigris, pe-  
dibus rufis: femoribus posticis nigris.

*Ichneumon flagellator* Ent. syst. 2. 176. 178.

Habitat Kiliae.

19. O. niger thorace maculato abdomine falcato *cunctator*.  
rufo: petiolo nigro, fronte plantisque po-  
sticis flavis.

*Ichneumon cunctator* Ent. syst. 2. 176. 179.

Habitat Kiliae.

20. O. ater abdome compresso acutissimo ferru- *cultellator*.  
gineo, scutello acuminato.

*Ichneumon cultellator* Ent. syst. 2. 167. 142.

*Ichneumon leucospoides* AEt. Berol. 6. 345. tab.  
8. fig. 5. 6.

Habitat in Germaniae Pino. Dom. de Loewen-  
skjold.

21. O. nigro ferrugineo que varius abdome atro, *foliator*.  
alis abbreviatis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Parvus. Caput et thorax nigro obscureque fer-  
ruginoso varia. Abdomen falcatum, atrum,  
nitidum aculeo breuissimo, exerto. Alae  
abbreviatae, hyalinae. Pedes ferruginei fe-  
moribus basi nigris.

FOENUS. *Palpi breues: articulis cylindricis.*

*Labium breue, membranaceum, transuersum.*  
*Antennae filiformes.*

*jaculator.* 1. F. nigra ab domine falcata medio rufa, tibias posticis clavatis basi apiceque albis.

*Ichneumon jaculator* Ent. syst. 2. 177, 183. Linn.

syst. Nat. 2. 937. 52. Fn. Su. 1626.

Geoff. Inf. 2. 328. 16.

Degeer Inf. 1. tab. 36. fig. 10.

Reaum. Inf. 4. tab. 10. fig. 14.

Habitat in Apum Sphegumque larvis.

*affector.* 2. F. niger ab domine falcato: maculis tribus lateribus rufis, tibias posticis clavatis rufis.

*Ichneumon affector* Ent. syst. 2. 178, 184. Linn.

syst. Nat. 2. 937. 35. Fn. Su. 1627.

Geoff. Inf. 2. 329. 17.

Habitat in Europae hortis.

Foeni corpus elongatum, glabrum, immarginatum, agile, capite rotundato, insidente collo elongato, attenuato, oculis magnis, oblongis sub prominulis, lateribus, stemmatibus tribus verticalibus, antennis brevibus cylindricis: articulo primo distincto, thorace elevato, gibbo, pectore antice in collum porrecto, scutello lato, transuerso, ab domine petiolato, compitello, incurvo, clavato, sub scutello inserto, aculeo feminae longitudine abdominis, aliis quatuor brevibus, planis, pedibus curforiis, tibias posticis compressis, clavatis, tarsis quinque articulatis.

EVANIA. *Palpi postici incurvi: articulo tertio quadrato.*

*Labium cornuum, apice membranaceum, integrum.*

*Antennae setaceae.*

2—3. *E. nigra albo maculata ab domine rufo apicem variegata.*  
capite nigro: maculis tribus albis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura omnino *E. maculatae*. Antennae nigrae. Caput nigrum, sub antennis album macula media nigra. Thorax niger margine antico in medio interrupto scutelloque albis. Abdomen breue, sessile, basi rufum, apice nigrum lunulis duabus pone medium maculaque anali albis. Pedes rufi geniculisi nigris.

2—3. *E. nigra albo varia ab dominis segmentis histrio.*  
margini flavis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura omnino praecedentium. Antennae nigrae subtus ferruginea. Caput nigrum, sub antennis album. Thorax niger margine antico, maculis duabus utrinque sub margine, scutello, puncto sub scutello albis. Abdomen nigrum segmentorum marginibus albis. Pedes rufi.

3—4. *E. atra thorace rufi, ab dominis segmentis ruficollis.*  
margini albis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Q

*Parua.* Caput nigrum orbita oculorum alba.

Thorax rufus pectore nigro. Abdomen atrum, nitidum segmentorum marginibus albis: primo interrupto. Pedes rufi, postice nigri.

*cincta.* 5—4. *E.* nigra abdominis fascia media cinerea.

Habitat in Mogador Dom. Schousboe.

Statura parua praecedentium. Caput et thorax nigra, immaculata. Abdomen sessile, cylindricum fascia media cinerascente. Pedes nigri.

*petiolata.* 5—6. *E.* flavescentis ab domine petiolato brevissimo derto imposito atro.

Habitat in Americae Insulis Mus. Dom. Lund. Statura et magnitudo *E. minutae*. Antennae nigrae. Caput flavescentis, cinereo pubescens. Thorax flavescentis scutello atro. Abdomen petiolatum, compressum, brevissimum, atrum petiolo elongato, flavo. Pedes flavi geniculis nigris.

### CHALCIS. *Palpi aequales.*

Antennae breues, cylindraceae, scire fusiformes: articulo primo subcrassiori.

*conica.* 1—2. *C. atra* ab domine conico acutissimo, femoribus posticis incrassatis: linea dorsali alba.

Habitat Cajennae in nido Vespa nidulantis, ubi uti videtur eius larvis vietit. Figura Reaum. Inf. 6. tab. 20—24. sub nomine Abeille

cartonnier cum hac convenit, nec Vespam  
representat.

Magna in hoc genere. Caput atrum orbita  
oculorum albicante. Thorax ater, immacu-  
latus. Abdomen elongatum, conicum, pa-  
rum, compressum, acutum, nigrum. Fe-  
mora postica incrassata, compressa, atra li-  
nea dortali alba. Tibiae incuruae, albae.

12. C. thorace nigro: lineolis scutelloque flauis, *nigricornis*.  
femoribus posticis flauis nigro maculatis.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Statura omnino C. maculatae. Caput flauum  
vertice antennisque nigris. Thorax niger  
margin'e antico lineolis quatuor obliquis: la-  
teribus interruptis, flauis. Scutellum fla-  
uum linea abbreviata nigra. Abdomen bre-  
ue petiolatum, flauum fascia media anoque  
ferrugineis. Pedes flavi femoribus posticis  
incrassatis, dentatis utrinque maculis dua-  
bus nigris.

SPHEX. Os lingua porrecta, trifida.

*Labiun* emarginatum, seta in-  
structum.

*Antennae* filiformes.

1. S. glabra atra thorace sub alis maculis duobus *binodis*,  
argenteis, abdominis petiolo biarticulato.

Habitat Cajennae Mus. Dom. Bosc.

Statura S. fibulosa at paullo minor. Caput  
atrum, immaculatum. Thorax laevis, ater

Q 2

maculis utrinque duabus sub aliis. Abdominis petiolus elongatus, biarticulatus, niger. Abdomen paruum, ouatum, paullo cyaneo nitidum. Alae breues, obscurae.

*hemiptera.* 11—12. *S. villosa nigra* abdominis petiolo elongato, uniarticulato, alis brevibus obscuris.

Habitat in Isle de France Mus. Dom. Boſc.

Magnitudo fere *S. fabulosae*. Caput et thorax villosa, nigra, obscura. Abdominis petiolus abdome longior, cylindricus, uniarticulatus. Abdomen ouatum, immaculatum. Alae vix petiolo longiores, obscurae ferrugineo parum nitentes. Pedes nigrae.

*atra.* 18—9. *S. atra* labio argenteo villoso, alis abdominis longitudine.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Difert manifesta *S. figulo*. Caput nigrum labio pube argentea nitido. Thorax niger. Abdomen atrum, nitidem, immaculatum petiolo longiori, incurvo. Alae obscurae abdominis longitudine. Pedes nigri.

*cruenta.* 54—5. *S. atra* thorace rufo, abdome strigis duabus albis.

Habitat in Gallia Dom. Boſc.

Statura parua *S. languinolentae*. Caput nigrum orbita oculorum alba. Thorax rufus linea scutellari, antece bifida nigra. Abdomen atrum, nitidum segmento secundo et quarto apice striga albida. Pedes nigri. Alae albidæ.

88—9. *S. coerulea* alis totis obscure rufis. *heros.*

Habitat in America meridionali Mus. Dom.

Bosc.

Maxima in hoc genere. Antennae fuscae: articulo primo cyaneo. Corpus totum coeruleum, immaculatum. Alae magnae, obscure ferrugineae. Pedes nigri tibiis posticis serratis.

89—90. *S. coerulea* alis cyaneis apice albis. *grossa.*

Habitat in India.

Affinis *S. coeruleae* eiusdemque magnitudinis et staturalis. Antennae porrectae, nigrae. Corpus coeruleum, nitidum. Alae cyaneae, omnes apice albæ. Pedes nigri.

89—90. *S. atra* capite thoracis antico abdominis *annulata.*  
que segmentis basi flavis, alis ferrugineis  
apice atris.

Habitat in Italia Mus. Dom. Bosc.

Magna. Caput cum antennis ferrugineum, immaculatum. Thorax niger lobo antico dorsoque obscure ferrugineis. Abdomen atrum, nitidum segmentis 2. 3. 4. 5. basi late flavis. Pedes flavi femoribus basi nigris. Alae ferrugineæ apice nigrae.

POMPILLUS. *Maxilla bifida.*

*Labium breue, corneum,  
integrum.*

*Antennae setaceae.*

- analis.* 1. *P. glaber ater abdomine apice ferrugineo, alis  
albis.*

*Sphex analis* Ent. syst. 2. 209. 42.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.

- similis.* 2. *P. glaber ater abdomine apice ferrugineo alis  
nigris.*

*Sphex similis* Ent. syst. 2. 209. 43.

Habitat in Africa aequinoctiali Mus. D. Banks.

- fusca.* 3. *P. glaber ater abdomine basi ferrugineo.*

*Sphex fusca* Ent. syst. 2. 210. 46. Linn. syst.

Nat. 2. 944. 16. Fn. Su. 1652.

Geoff. Inf. 2. 254. 74.

Degeer Inf. 2. 2. 147. tab. 28. fig. 6.

Goed. Inf. 1. tab. 58.

Habitat in Europae fabuletis larvas attrahens,  
sepeliens.

- vaticus.* 4. *P. pubescens niger alis fuscis, abdomine anti-  
ce ferrugineo: cingulis nigris.*

*Pompili* corpus oblongum, immarginatum, agile,  
capite exerto, rotundato, transuerso, thorace latiore,  
oculis magnis, oblongis, lateralibus, antennis approxi-  
matis, supra os insertis: articulo primo compresso,  
thorace ouato, planiusculo, scutello vix ullo, abdomi-  
ne ouato, sessili, alis inaequalibus, pedibus tenuibus;  
elongatis, tarolis quinquearticulatis, colore vario.

Genus *Sphegibus* nimis affine.

*Sphex viatica* Ent. syst. 2. 210. 47. Linn. syst.

Nat. 2. 943. 15. Fn. Su. 1651.

Degeer Ins. 2. 2. 153. 6. tab. 28. fig. 16.

Frisch. Ins. 2. tab. 1. fig. 13.

Habitat in Europae sabuletis larvas ouo imposito sepeliens.

5. P. hirtus ater abdominis segmento secundo fer- *ursus*.  
rugineo, alis atris.

*Sphex ursus* Ent. syst. 2. 210. 48.

Habitat — — Dom. Lund.

6. P. cyaneus antennis pedibusque nigris. *amethystinus*.  
*Sphex amethystina* Ent. syst. 2. 210. 49.

Habitat in Insula St. Crucis Dr. Pflug.

7. P. niger fronte thoracis striga antica abdomi- *cingulatus*.  
nisque segmentorum marginibus cinereis.

*Sphex cingulata* Ent. syst. 2. 211. 50.

Habitat in noua Hollandia Mus. Dom. Banks.

8. P. niger abdoinine segmentorum marginibus *niger*.  
lucidis.

*Sphex nigra* Ent. syst. 2. 211. 51.

Habitat in Europae sabuletis.

9. P. niger abdoinine segmentorum marginibus *labiatus*.  
cinereis, alis testaceis apice fuscis.

*Sphex labiata* Ent. syst. 2. 211. 52.

Habitat in Americae meridionalis Insulis Dr.

Pflug.

10. P. ater albo maculatus thorace sub scutello *variegatus*.  
rufo, alis apice fuscis.

*Sphex variegata* Ent. syst. 2. 211. 53.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

11. P. niger femoribus posticis rufis. *maurus*.

*Sphex maura* Ent. syst. 2. 212. 55.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

*mixtus.* 12. P. niger flavo varius abdomine flavo: fasciis tribus nigris.

Habitat in Americae Insulis Dom. v. Rehr.

Medius. Antennae rufie, apice nigrae. Caput nigrum orbita oculorum, ore lineaque frontali flavis. Thorax niger margine antico subalas extenso lineolis duabus dorsalibus, scutello maculisque sub scutello flavis. Abdomen sessile flavidum fasciis quatuor latis, nigris. Pedes flavi. Alae anticae subtestaceae.

*hyalinatus.* 13. P. ater femoribus quatuor posticis rufis, aliis hyalinis.

*Sphex hyalinata* Ent. syst. 2. 212. 56.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

*fuscatus.* 14. P. ater abdomine utrinque puncto transuerso albo, femoribus posticis rufis, aliis apice fuscis.

*Sphex fuscata* Ent. syst. 2. 212. 57.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

*opunctatus.* 15. P. ater punctis duobus sub scutello quatuor abdominis albis aliis apice fuscis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura omnino P. fuscata. Caput rotundatum, immaculatum. Thorax compressus, ater sub scutello punctis duobus albis. Abdomen atrium, nitidum punctorum duobus paribus albis. Alae albidæ apice fuscae. Pedes atri.

*bifasciatus.* 16. P. ater immaculatus aliis albis: fasciis duabus nigris.

*Sphex bifasciata* Ent. syst. 2. 212. 58.

Geoff. Int. 2. 337. 37.

Habitat in agro Parisino Dom. Boſe.

17. P. niger abdomine ferrugineo apice fuscō, *gibbus*.  
alīs anticis apice fuscis.

*Sphex gibba* Ent. syst. 2. 212. 59. Linn. syst.

Nat. 2. 946. 33. Fn. Su. 1653. Scop. carn.

570.

Habitat in Europae sylvis.

18. P. ater thorace striga abdominis segmento *2guttatus*.  
tertio punctis duobus baseos albis.

Habitat in America septentrionali Mus. Dom.  
Boſe.

Paruus. Caput cum antennis atrum. Thorax  
ater striga antica impressa, cinerea. Abdo-  
men atrum segmento tertio utrinque punto  
baseos albo. Pedes nigri.

19. P. cinereo pubescens abdominis segmentis basi *pulcher*.  
atris, alīs albī apice nigris.

Habitat in Italia Mus. Dom. Boſe.

Paruus cinereo pubescens antennis nigris. Tho-  
rax immaculatus. Abdominis segmenta basi  
atra apice cinerea pubescentia. Alae albae,  
apice nigrae.

20. P. niger antennis rufis, alīs albī; fasciis dua-*fasciatus*.  
bus fuscis.

*Sphex fasciata* Ent. syst. 2. 213. 60.

Habitat in noua Hollandia Mus. Dom. Banks.

21. P. niger abdominis segmento secundo tertio-*lunicornis*.  
que rufis, anten varum ultimo articulo lu-  
nato.

## Habitat in Gallia Dom. Cuvier.

Minutus. Antennae singulares, nigrae, setaceae articulo ultimo arcuato. Caput et thorax nigra, iminaculata. Abdomen atrum, nitidum segmentis duobus rufis. Pedes nigri. Alae hyalinae.

- cinereus.* 22. P. cinereus abdominis segmentis basi atris apice fuscis.

*Sphex cinerea* Ent. syst. 2. 213. 61.

Habitat in noua Hollandia Mus. Dom. Banks.

- tropicus.* 23. P. niger abdominis segmento secundo ferrugineo.

*Sphex tropica* Ent. syst. 2. 213. 62. Linn. syst. nat. 2. 945. 27. Mus. Lud. Ulr. 408.

Habitat in America.

- fugax.* 24. P. thorace tomentoso aureo, abdome ferrugineo, alis flavescentibus: fascia fusca.

*Sphex fugax* Ent. syst. 2. 213. 63.

Habitat in noua Zelandia Mus. Dom. Banks.

- auratus.* 25. P. capite thoraceque tomentoso aureis, abdome nigro: segmentorum marginibus cincereis.

*Sphex aurata* Ent. syst. 2. 213. 64.

Habitat in India orientali Dem. de Schlanbusch.

- nitidus.* 26. P. ferrugineus thorace polito aureo, alis flavescentibus.

*Sphex nitida* Ent. syst. 2. 214. 65.

Habitat in noua Hollandia Mus. Dom. Banks.

- rufipes.* 27. P. ater abdominis segmentis utrinque puncto albo, alis apice fulcis.

*Sphex rufipes* Ent. syst. 2. 214. 66. Linn. syst.

Nat. 2. 945. 29. Fn. Su. 1659.

Habitat in Europae fabuletis;

28. P. glaber ater abdomine punctis duobus fas. *spunctatus*.  
claque postica albis, alis apice fuscis.

*Sphex spunctata* Ent. syst. 2. 214. 67.

Habitat in Europa.

29. P. ater capite thoraceque rufis. *nigricornis*.

*Sphex nigricornis* Ent. syst. 2. 214. 68.

Habitat in noua Hollandia Mus. Dom. Banks.

30. P. niger alis apice fuscis: puncto albo. *hircana*.

Habitat in Gallia Dom. Cuvier.

Nimis assimilis P. exaltati et forte mera varietas.

Diffrerit tantum corpore toto atro, immaculato. Alae albae fascia media apiceque fuscis et in hac apice punctum magnum album,

31. P. niger abdome rufo apice atro, alis apice *exaltatus*.

fuscis: puncto albo.

*Sphex exaltata* Ent. syst. 2. 214. 69.

Habitat in Europae fabulosis.

32. P. ater thorace albo maculato, abdомinis *maculatus*.

segmento primo rufo, reliquis utrinque linea transuersa alba.

*Sphex maculata* Ent. syst. 2. 215. 70.

Habitat Kiliae Dom. Daldorff.

33. P. niger abdome utrinque lunulis *argenteo tricolor*.

sericeis: basi rufo, apice nigro.

*Sphex tricolor* Ent. syst. 2. 215. 71.

Habitat in Barbaria Mus. Dom. Desfontaines,

*guttatus.* 34. *P. glaber* ater thorace albo maculato, abdome rufo: punctis transversis albis, ante apicem nigro.

*Sphex guttata* Ent. syst. 2. 215. 72.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

*nigripes.* 35. *P. niger* abdomine ferrugineo, alis obscuris, pedibus nigris.

*Sphex nigripes* Ent. syst. 2. 216. 77.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Lund.

*hirtus.* 36. *P. ater* abdomine villosi testaceo, alis cyaneis. Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Affinis certe *P. villosi* at duplo fere maior. Corpus atrum, immaculatum abdomine villosi, testaceo. Alae cyanæ.

*villosus.* 37. *P. niger* abdomine villosi testaceo, alis fuscis.

*Sphex villosa* Ent. syst. 2. 216. 78.

Habitat ad littora malabarica Dr. Koenig.

**LARRA.** *Maxilla* brevis, cornæa, fornicate.

*Labium* exsertum, apice membranaceum, emarginatum.

*Antennæ* filiformes.

*2fasciata.* 5—6. *L. atra* abdomine fasciis duabus fuluis, alis nigris apice albis.

Habitat in Tangier Dom. Schousboe Mus. Dom. Lund.

Statura omnino L. ichneumoniformis. Caput et thorax atra, immaculata. Abdomen atrum, nitidum segmento secundo tertioque

fascia dorsali late fuluis: Alae nigrae, apice  
albae. Pedes nigri.

6—7. L. flava thorace nigro lineato, ab domine cingulata,  
fasciato.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Media. Labium flavum argenteo pubescens.

Antennae ferrugineae. Thorax obscurior  
lineis tribus abbreviatis, nigris. Scutellum  
flavum striga nigra. Abdomen flavum fas-  
ciis sex nigris. Alae albidae macula magna  
costali ante apicem fusca. Pedes flavi.

7—8. L. nigra capite thoracis antico anoque ful-fasciata.  
uis, alis ante apicem late atris.

Habitat Tranquebariae D. Daldorff Mus. D. de  
Scheftedt.

Statura et magnitudo praecedentis. Caput cum  
antennis ferrugineum. Thorax ante ful-  
uis, postice niger. Abdomen atrum ulti-  
mis segmentis fuluis. Alae albae, nitidae  
ante apicem late atris apice tamen albo. Pe-  
des fului.

Variat obscurior capite thoracis antico anoque  
fuscis nullo modo distincta.

TIPHIA. *Maxilla membranacea*, rotundata.

*Labium breue, cornuum,*  
*tridentatum, medio pal-*  
*pigertum.*

*Antennae filiformes.*

*glabrata.* 1—2. *T. glabra atra antennis basi pedibusque ferugineis.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura omnino *T. femoratae* at duplo minor.

Antennae nigrae, basi rufescentes. Corpus atrum, glabrum, immaculatum. Pedes rufi femoribus angulatis.

*hemiptera.* 1—2. *T. glabra atra alis breuissimis.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura parua praecedentis tota atra. Alae breuissimae et fere tantum rudimentum alarum.

*mixta.* 10—11. *T. hirta ferruginea flavoque varia, alarum costa ferruginea apice nigra.*

Habitat Tranquebariae Dom. Lund.

Media. Antennae ferrugineae. Mandibulae ferrugineae, apice nigrae. Caput flavum oculis magnis reniformibus nigris. Thorax hirtus, ferrugineus lobo antico scutelloque flavis. Abdomen ferrugineum segmento 2. 3. 4. supra flavis margine lineaque dorsali ferrugineis. Alae obscurae anticarum costa ferruginea apice nigra. Pedes ferruginei.

*thoracica.* 15—16. *T. atra thorace cinereo villoso, alis cyaneis.*

Habitat ad littora malabarica.

Affinis certe T. collaris cuius varietatem olim  
credi. Differt tamen capite toto atro, tho-  
race toto cinereo villoso alisque anticis totis  
cyaneis.

**SCOLIA.** Os lingua inflexa, trifida.

*Labium* porrectum, apice  
membranaceum, integrum  
medio palpigerum.

*Antennae* filiformes.

16—17. S. hirta nigra abdome fasciis quatuor *4fasciata*.  
flavis, ano tridentato.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Nunis affinis S. radula. Differt tantum ano tri-  
dentato alias simillima.

16—17. S. hirta atra abdome fasciis duabus fla- *erythroce-*  
vis, alis ferrugineis apice cyaneis, capite *phala*.  
ferrugineo.

Habitat in Europa australi Dom. Lünd.

Distincta omnino a S. hortorum. Caput cum  
antennis ferruginosum. Thorax hirtus, ob-  
scure ferrugineus fere niger. Abdomen atrum  
fasciis duabus dorsalibus flavis: anteriore  
maiore, integra, posteriore subinterrupta.  
Corpus atrum.

24—5. S. atra abdome fasciis duabus flavis: an- *notata*.  
teriore utrinque puncto atro.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura omnino S. cinctae at distincta videtur.  
Caput atrum maculis tribus frontalibus fla-

vis: lateralibus lunatis. Thorax immaculatus. Abdomen atrum supra fasciis duabus latis, aequalibus, flavis: anteriore utrinque puncto atro notata. Pone fascias praeterea par punctorum parvorum, flauorum. Alae cyaneae. Pedes atri.

*histrionica*. 35—6. S. flavo ferrugineoque varia alis macula costali apicis fusca.

Habitat Tranquebariae Mus. D. de Sehestedt. Media. Antennae breves, incurvae, ferrugineae. Caput flavidum linea transversa, verticali ferruginea et in hac itemnata trii ordinaria. Thorax ferrugineus lobo ante utrinque flavo. Abdominis segmentum primum ferrugineum, immaculatum, 2 flavidum utrinque puncto parvo apiceque ferrugineis 3. 4. flavis basi apiceque lineaque dorsali ferrugineis, reliqua ferruginea pilis aureis. Alae subferrugineae, nuda macula magna costali versus apicem fusca. Pedes ferruginei femoribus complicitis, posticis apice parum dilatatis.

*volvulus*. 38. S. nigra cinereo hirta thorace flavo maculato, abdome fasciis sex flavis.

Habitat Tangier Dom. Schousboe Mus. Dom. de Sehestedt.

Statura et magnitudo omnino S. cylindricae. Antennae cylindricae, porrectae, nigrae. Caput nigrum, cinereo tomentosum. Thorax cinereo tomentosus antice fasciis duabus flavis. Abdomen cylindricum, atrum fas-

ciiis sex flavis aculeo paruo, recurvo. Alae  
abdomine breiores, albidae.

39. S. hirta nigra abdominis segmentis apice *coeruleata*,  
ruleis, antennis apice cochleatis.

Habitat in Guinea Dom. Isert Mus. Dom. Lund.

Animaleculum singulare huius generis viderut.

Caput fuscum, cinereo pubescens antennis  
filiformibus: articulo primo longiore, ante  
apicem tenuissimis, petiolatis, apice dilata-  
tis, rotundatis, depresso. Thorax fuscus,  
immaculatus. Abdominis segmenta basi atra,  
apice coerulea. Alae obscurae. Pedes fus-  
ci, postici femoribus brevibus, incrassatis,  
tibiis incurvis, vix longioribus, apice parum  
dilatatis.

CHRYYSIS. *Labium porrectum, maxil-*  
*la linearis multo longius,*  
*apice membranaceum,*  
*emarginatum.*

*Antennae filiformes.*

- 4—5. C. coerulea nitida scutello ab domine que *scutellaris*.  
aureis, ano coeruleo.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Affinis videtur C. calens. Caput coeruleum an-  
tennis nigris. Thorax coeruleus, viridi ni-  
tens scutello aureo et sub scutello viridi ni-  
tens. Abdomen aureum, nitidum ano coe-  
ruleo, vix dentato. Pedes coerulei.

- 9—10. C. glabra nitida auro purpurea antennis *coeruleis*,  
thoracisque postico nigris. cens.

R

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bosc.

Statura et magnitudo C. ignitae. Caput, thorax, abdomen auro purpurea, nitida. Antennae rotac nigrae. Thorax sub scutello niger. Pedesque coerulea, nitida.

*maculata.* 12—13. C. glabra viridis, nitida occipite fascia abdomine maculis dorsalibus atris, ano integro.

Habitat in Americae Insulis Mus. Dom. Bosc.

Statura et magnitudo C. auratae. Caput viride aeneum, nitidum occipite fascia atra. Antennae nigrae. Thorax viridis macula antica coerulecente. Abdomen aeneum, macula magna ad basin singuli segmenti atra.

*dimidiata.* 15—16. C. glabra viridis nitens thorace abdominisque segmentis duobus anticis aureis, ano quadridentato.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bosc.

Caput viride, nitens antenuis maculaque verticis nigris. Thorax aureus pectore viridi. Abdomen aureum ano quadridentato, viridi.

*sexdentata.* 20—1. C. glabra viridis nitida abdominis segmentis basi cyaneis, ano sexdentato.

Parua. Caput viride antennis nigris. Thorax viridis, immaculatus. Abdomen viride segmentis basi cyaneis. Anus sex dentatus.

LEUCOSPIS. *Palpi breues, aequales.*

*Labium maxilla longius,*  
*emarginatum.*

*Antennae extrorsum cras-*  
*fiores.*

3. *L. abdomine subpetiolato corpore atro cinereo atra.*  
pubescente.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.  
Caput nigrum, cinereo pubescens. Thorax  
elevatus, punctatus, niger, cinereo subpu-  
bescens strigis duabus anticis tenuissimis, te-  
staceis. Abdomen nigrum segmento primo  
cyindrico, quasi petiolo, reliquis compressis  
aculeo in canali dorsali recondendo. Pedes  
nigri femoribus posticis incrassatis, subtus  
dentatis.

BEMBEX. *Os lingua inflexa, quinque-*  
*fida.*

*Labium superius porrec-*  
*tum, os obtegens.*

*Antennae filiformes.*

5—6. *B. labio conico flavo nigra abdominis seg. labiata.*  
mentis apice glaucis.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bosc.

Paullo minor B. glaucae. Antennae nigrae ar-  
ticulo primo subtus flavo. Labium magnum,  
porrectum, flavum. Caput et thorax ni-  
gra, cinereo villosa. Abdomen nigrum seg-

mentorum marginibus glaucis. Alae hyalinae.

*spinosa.* 9—10. B. labio conico nigra thorace maculato postice utrinque unidendato, abdome striatis sex interruptis flavis.

Habitat in Americae Insulis Dom. v. Rohr.

Media. Antennae nigrae articulo primo subtus flavo. Caput nigrum labio conico flavo. Thorax niger margine antico, linea laterali, lineolis duabus dorsalibus punctis duobus sub alis, punctis duobus lineolisque duabus transuersis loco rictelli flavis postice utrinque excurrit in dentem validum, flavidum. Abdomen glabrum, atrium, nitidum strigis sex, in medio late interruptis, flavis. Pedes flavi femoribus nigris.

**VESPA.** *Labium* porrectum, maxilla longius, emarginatum, utrinque seta instructum.

*Antennae* exterritorum eratio. rcs.

*labiata.* 18—19. V. nigra thoracis margine antico albo, abdome atro: segmentorum marginibus albis.

Habitat Tangier Dom. Schousbœc.

Pauilio minor V. maculatae. Antennae nigrae articulo primo subtus albo. Caput nigrum labio, mandibulis maculaque inter antennas albis. Thorax niger margine antico in me-

dio interrupto albo. Abdomen atrum, nitidum segmentorum marginibus albis. Alae plicatae, obscurae. Pedes flavescentes femoribus basi nigris.

22—3. V. brunnea abdominis segmento secundo *carnatica*.  
tertioque basi atris, alis apice nigris.

Habitat Trinquebariae Dom. Daldorff.

Corpus magnum, brunneum, immaculatum abdominis segmento secundo tertioque basi atris. Alae plicatae, brunneae, apice nigrae.

40—1. V. testacea abdominis ultimis segmentis *analis*.  
nigris.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Statura et magnitudo V. marginalis. Antennae ferrugineae. Caput et thorax testacea, flavo parum mixta. Abdominis segmentum secundum magis obscurum margine nigro. Reliqua nigra. Alae pedesque testacea.

40—1. V. obscure ferruginea thorace subscutello *myops*.  
lo flavo lineato, abdominis segmento secundo punctis duobus flavis.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Media. Antennae ferrugineae, in medio nigrae. Caput et thorax obscure ferruginea, immaculata et sub scutello niger striga lineisque duabus flavis. Abdomen ovoatum, ferrugineum primo secundoque segmentis obscurioribus et in hoc puncta duo flavescentia. Alae obscure ferrugineae. Pedes ferruginei femoribus nigris.

*Neflor.* 42—3. *V. fusca* fronte flava, abdomine ferrugineo: segmentis basi macula nigra marginata flavo.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

*Paullo maior* *V. marginali.* Antennae nigrae, subtus ferruginea. Caput fuscum fronte oreque late flavis. Thorax fuscus margine antico tenuissime lineolis duabus anticis obliquis lineolisque duabus abbreviatis sub scutello flavis. Scutellum ferrugineum. Abdomen ferrugineum segmento singulo maculata baseos nigra marginaque flavo. Alae ferruginea. Pedes ferruginei.

*nitidula.* 44—5. *V. atra* argento nitida thoracis angulo postico utrinque dilatato argenteo.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Corpus *V. atrata* paullo maius, totum atrum argento certo situ nitidulum. Thorax punctatus postice sub alis angulo utrinque dilatato, argenteo, nitido. Scutellum emarginatum. Alae cyaneae.

*atrata.* 44—5. *V. atra* labio albo, alis hyalinis.

Habitat in Americae meridionalis insulis Dom. Lund.

Media, tota atra, immaculata. Labium villis albo argenteis testum. Alae hyalinae.

*minuta.* 65—6. *V. atra* labio thoracis punctis duobus anticus abdominalisque fasciis duabus flavis.

Habitat Haliae Saxonum Dom. Hybner.

Corpus minutum. Antennae nigrae. Caput nigrum labio eleuato, flavo. Thorax niger

punctis duobus marginis antici punctoque paruo calloso ante alas flavis. Abdomen glabrum, atrum strigis duabus flavis. Pedes variegati.

66—7. V. nigra antennis ano pedibusque rufis, *affimilis*.  
alis cyaneis basi apiceque albis.

*Sphex affimilis* Eot. syst. 2. 209. 44.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

78—9. V. ferruginea abdomine striga basos fas. *Tamula*.  
ciaque media flavis, alis apice macula nigra.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Statura et summa affinitas V. flavescentis. Differt tantum abdominis segmento primo apice tertio apice quartoque basi flavis,

86—7. V. nigra abdominis petiolo clauato, alis *coeruleopen-*  
*nis*.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Praecedentibus minor. Corpus totum atrum  
alis solis cyaneis. Abdominis petiolus bre-  
uis, clavatus.

88—9. V. ferruginea abdomine atro: ano ferru- *diadema*.  
gineo.

Habitat Cajennae.

Specimen mihi mutilatum. Corpus mag-  
num. Caput ferrugineum vertice nigro:  
striga ferruginea. Thorax ferrugineus linea  
punctisque duobus dorsibus nigris. Petio-  
lus elongatus, incurvus, niger, apice pa-  
rum ferrugineus. Abdomen quadratum, atrum  
ano late ferrugineo. Alae defunt. Pedes  
ferruginei.

*morio.* 98—9. V. atra immaculata bdominis petiolo clauato, alarum costa nigra.

Habitat Cajennae in nido obconico, papyraceo, rudiore, griseo, truncato: orificio parvo, laterali Dom. Cuvier. Corpus paruum, totum atrum, immaculatum tibus foliis parum cinerascentibus. Alarum costa late nigra.

*binodis.* 100—1. V. atra abdominis petiolo biarticulato, segmentis striga tenuissima testacea.

Habitat Cajennae Mos. Dom. Bosc.

Parua. Caput, antennae, thorax, pedes atra, immaculata. Abdomen petiolo biarticulato, primo clavato, secundo basin secundi segmenti efficiens, tenuissimo, atrum singula segmento ante marginem striga tenuissima, testacea. Alae obscurae.

*reiecta.* 100—1. V. nigra abdominis ferruginei petiolo clavato nigro.

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Parua. Caput nigrum. Thorax niger margine lobi antice flavo. Abdomen ferrugineum petiolo breui, clavato, nigro. Alae ferrugineaæ, apice fuscae. Pedes nigri.

*atrophica.* 101—2. V. atra abdominis petiolo segmentoque primo apice flavis.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Lund.

Parua. Caput nigrum puncto parvo inter antennas flavo. Thorax niger margine antico scutellique linea transversa flavis. Abdominis petiolum elongatus, incurvus, apice fla-

uus. Segmentum primum maius, atrum,  
apice flavum, reliqua brevissima, nigra. Pe-  
des nigri.

103. *V. flavescentis thoracis dorso nigro: lineis cajennensis.*  
duabus flavis.

Habitat Cajennae Dom. Boe.

Parua. Caput flavidum antennis ferrugineis.  
Mandibulae apice nigrae. Thorax flavidus  
dorso nigro: lineis duabus, quae tamen in ar-  
gines haud attingunt flavis. Abdomen fla-  
vescentis. Alae obscurae.

MELLINUS. *Palpi elongati: articulis  
cylindricis.*

*Labium ovatum longitu-  
dine maxillae, sub api-  
ce palpigerum.*

*Antennae cylindricae: ar-  
ticulo primo longiori.*

1—2. *M. niger thorace maculato, ab domine atro: 2 punctatus.*  
utrinque macula transversa cinerascente.

Habitat Halee Saxonum Dom. Hybner.

Corpus paruum. Caput nigrum utrinque sub  
anteunis macula angulata, flava. Thorax  
niger marginé antice puncto que sub alis fla-  
vis. Abdomen atrum, nitidum utrinque  
macula secundi segmenti transversa cineras-  
cente. Pedes nigri tibiis posticis basi albis.

1—2. *M. niger thorace maculato, ab domine basi variegatus.*  
rufa.

Habitat Halee Saxonum Dom. Hybner.

Statura et magnitudo praecedentis et forte me-  
ra eius varietas. Differt tantum abdominis  
segmento primo toto, secundo basi ferrugi-  
neis, reliquis margine cinerascentibus.

*interruptus.* 4—5. M. ater nitidus abdomine fasciis tribus in-  
terruptis albis, pedibus rufis.

Habitat Halee Saxonum Dom. Hybner.

Statura parua praecedentium. Caput nigrum  
labio pube parum cinerascente. Thorax ni-  
ger margine antico punctoque lateralii flavis,  
sub scutello utrinque spinosus. Abdomen  
atrum, nitidum fasciis tribus flavis omnibus  
interruptis, ultimis duabus approximatis.  
Pedes rufi.

*trifrigatus.* 4—5. M. niger thorace maculato sub scutello bi-  
punctato, abdomine fasciis tribus flavis.

Habitat in Americae Insulis Dom. v. Rohr.

Paruus. Antennae nigrae articulo primo sub-  
tus flavo. Caput nigrum ore flavo. Tho-  
rax niger puncto ante alas et sub alis flavis.  
Scutellum flavidum et puncta duo magna sub  
scutello. Abdomen atrum fasciis tribus in-  
tegris, flavis. Alae apice fuscac. Pedes fla-  
ui femoribus nigris.

*scaber.* 7—8. M. scaber niger abdominis segmento pri-  
mo macula media, reliquis lateralii flavis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Paruus. Antennae supra nigrae, subtus ferru-  
gineae. Caput nigrum, sub antennis fla-  
vidum. Thorax niger punctis duobus minu-

tis lobi antici, callosoque ante alas flavi. Abdomen sebrum, atrum primo segmento macula media transuersa, flavo, reliquis utrinque laterali, quarum prima maior, intus emarginata. Anus siue ultimum segmentum immaculatum. Pedes flavi femoribus nigris.

7—8. *M. niger thorace maculato, capite sub an. labiatus. tennis tibiisque albis.*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Partius. Antennae breues, nigrae: articulo primo latiori, subtus albo. Caput nigrum, sub antennis album. Thorax niger margine antico, puncto sub alis duobusque dorsilibus albis. Abdomen nigrum segmentorum marginibus parum piceis. Pedes nigri tibiis albis, posticis annulo albo.

9. *M. ater fronte punctis duobus, thorace qua. nigrita. tuor anticis albis.*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Partius. Antennae nigrae. Caput nigrum utrinque puncto oblongo in cantho oculorum albo. Thorax niger margine antico punctis duobus transuersis punctoque ante alas albis. Abdomen nigrum, immaculatum. Pedes nigri tibiis posticis annulo albo.

PHILANTHUS. *Labium compressum,*  
*rotundatum, maxil-*  
*lis longius.*

*Antennae filiformes,*  
*in medio frontis in-*  
*fertae.*

*auritus.* 1—2. *P. niger capite thoraceque maculatis, ab-*  
*dominis primo segmento maculis duabus,*  
*reliquis fascia flavis.*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura et magnitudo *P. coronati.* Antennae  
*nigrae articulo primo-flavo. Caput nigrum*  
*labio, orbita oculorum antice lati puncto-*  
*que magno pone oculos flavis. Thorax ni-*  
*ger margine antico interrupto, puncto ante*  
*alas, scutello maculisque duabus sub scutel-*  
*lo fulvis. Abdomen nigrum primo segmen-*  
*to paruo maculis duabus magnis flavis. 2,*  
*fascia flava, in medio antico late emargina-*  
*ta, 3. 4. fascia integra, linearis, simmacu-*  
*lato. Pedes flavi.*

*ventilabris.* 3—4. *P. niger thoracis margine antico postico-*  
*que abdominis fasciis tribus flavis: anterio-*  
*re latiore.*

Habitat in Carolina Dom. Bosc.

Magnitudo praecedentium. Antennae nigrae,  
*subtus basi flavae. Caput nigrum sub anten-*  
*nis maculaque magna frontali flavis. Tho-*  
*rax scaber, niger margine antico posticoque*  
*integris, flavis. Abdomen scabrum, ni-*

grum segmento primo utrinque puncto flauo, secundo fascia lata, in medio subinterrupta, reliquis margine parum stanicantibus. Pedes flavi femoribus rufis. Alae basi flavecentes, apice fuscae.

11—12. *P. niger* flauo variis abdominis segmento *interfus-*  
*to* primo rufo, alis apice nigris. *diffusus.*

Habitat in India Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo *P. ruficornis*. Antennae ferrugineae articulo primo flauo. Caput flavidum vertice nigro. Thorax niger margine antico, puncto calloso ante alas, lineis duabus scutelli, macula utrinque sub alas et subscutello flavis. Abdomen nigrum segmento primo rufo, reliquis apice flavis, ano tamen toto nigro. Alae albæ, anticae apice nigrae. Pedes flavi geniculis nigris.

11—12. *P. niger* flauo varius abdominis basi rufo: *diffusus,*  
fo: macula flava.

Habitat in India Dom. Daldorff.

Præcedente parvo minor. Antennæ rufæ, basi flavæ. Caput nigrum labio albo. Thorax niger margine antico utrinque lineola, puncto ante alas scutelloque flavis. Abdomen nigrum petiolo toto ferrugineo, segmento primo basi ferrugineo; macula flava, secundo quartoque apice inprimis ad latera flavis. Pedes flavi femoribus supra nigris.

**CRABRO.** *Palpi articulis compressis,  
rhomboidalibus.*

*Labium breue, cornicum,  
apice palpigerum.  
Antennae filiformes.*

*mediatus.* 16—17. *C. niger thorace maculato, abdomine  
atro: fasciis quinque flavis; anticis quatuor  
interruptis.*

Habitat in Europa.

*Medius.* Caput nigrum labio argenteo. Antennae nigrae primo articulo subtus flavo. Thorax niger punctis duobus transuersis marginis antici, puncto sub alis, lineolaque transuersa scutelli flavis. Abdomen atrum fasciis quinque flavis, quatuor anticis interruptis. Pedes flavi femoribus nigris.

*tridens.* 24—5. *C. scutello bidentato mucronatoque niger  
immaculatus abdominis segmentis utrinque  
macula transuersa flava.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura omnino *C. mucronati* at distinctus et alius. Corpus paullo maius. Caput nigrum labii pube argentea. Thorax niger, immaculatus. Scutellum denticulis duobus minutis, flavescentibus subtusque mucrone maiori, canaliculato, nigro. Abdomen atrum, glabrum segmentis omnibus utrinque macula flava. Pedes rufi femoribus nigris.

*eraffipes.* 26—7. *C. ater abdomine petiolato: segmento se-  
cundo margine flavo.*

Habitat Halaë Saxonum Dom. Hybner.

Magnitudo et statura omniis C. leucostomae.

Caput nigrum labio argenteo. — Antennae nigrae articulo primo toto flavo. Thorax niger puncto calloso flavo ad basin alarum. Abdomen petiolatum, atrum segmento secundo margine flavo. Pedes variegati tibiis posticis apice incrassatis, rufis.

27—8. C. ater abdome petiolato: primo seg. *tibialis*.  
mento nodoso, tibiis flavescentibus.

Habitat Halaë Saxonum Dom. Hybner.

Statura et magnitudo C. leucostoma. Caput nigrum mandibulis apice flavis. Antennae nigrae articulo primo subtus flavo. Thorax niger, immaculatus. Abdomen nigrum, nitidum primo segmento basi attenuato, apice nodoso. Anus flavesiens aculeo brevissimo, flavescente. Aliae aqueae. Pedes flani femoribus in medio atris. Tibiae posticae ferrugineae.

27—8. C. ater antennarum medio pedibusque *varicornis*.  
rufis.

Habitat Halaë Saxonum Dom. Hybner.

Statura parua praecedentis. Antennae nigrie, in medio rufae. Caput et thorax nigra, immaculata. Abdomen atrum, nitidum. Pedes rufi.

**HYLAEUS.** *Os lingua inflexa, trifida.  
Maxilla breuis, cornea.  
Labium in medio inflexum, trifidum: lacinia intermedia emarginata.  
Antennae cylindricae.*

**minutus.** 16—17. *H. ater nitens antennis subtus ferrugineis, fronte cinereo villosa.*

*Habitat in Americae Insulis.*

*Minutus totus ater, nitidus. Antennae tantum subtus ferrugineae et frons cinereo pubescens. Alae albo hyalinæ.*

**ANDRENA.** *Os lingua trifida.*

*Labium cylindricum, maxilla longius, utrinque setis duabus membranaceis.*

*Antennæ filiformes.*

**grisea.** 4—5. *A. cinereo villosa abdomen atro: fasciis quatuor albis; articulis duabus interruptis.*

*Habitat in Italia Dr. Allioni.*

*A. cornutæ assimilis videtur attumen distincta.  
Antennæ nigrae. Caput et thorax cinereo villosa, immaculata. Abdomen atrum, nitidum fasciis quatuor albis prima obsoleta secundaque interruptis. Pedes cinereo hirti tibiis posticis pilis rufis.*

APIS. *Os lingua inflexa, quinquefida,*

*Palpi breuissimi.*

*Antennae filiformes.*

3—4. *A. atra alis violaceis basi hyalinis.* *feneſtrata.*

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Nimis affinis *A. violaceae* at alae omnes basi hyalinae nec unquam eundem nidum cum illa cohalitat obſeruante Daldorfio.

13—14. *A. hirsuta thorace flaueſcente: fascia Cajennen-*

*atra, abdomen atro: fascia flaueſcente.* *sis.*

Habitat Cajennae Dom. Richard.

Statura et magnitudo praecedentium. Caput atrum antennis fusis. Thorax niger, supra flaueſens fascia lata inter alas nigra. Abdomen nigrum fascia media flaueſcente. Corpus nigrum. Alae obſcurae.

20—21. *A. hirsuta atra thorace ferrugineo, abdo-* *marylandi-*

*ca. minis segmento secundo flauo.*

Habitat in America Dom. Weber.

Magna. Caput atrum labio ferrugineo. Antennae nigrae primo articulo ferrugineo. Thorax hirtus, ferrugineus. Abdomen hirtum, atrum segmento secundo flauo. Pedes postici hirsutissimi. Alae violaceo nigrae.

29—30. *A. hirsuta atra thorace fuluo, ano albo.* *aprīca.*

Habitat in Lapponiae Alpibus Dom. de Paykull.

Minor *A. agrorum* et distincta. Caput atrum vertice parum ferrugineo. Thorax supra fulvus, immaculatus. Abdomen atrum ano albo.

*nidulans.* 33—4. *A. hirsuta flava thorace fascia nigra ano fuluo.*

Habitat in America boreali.

Statura et summa affinitas *A. pratorum* at paulo maior. Caput atrum antennis longioribus. Thorax flavus fascia inter alas nigra. Abdomen flavum ano parum fuluo. Pedes nigri.

*feruida.* 43—4. *A. hirta flauescens capite thoracis fascia anque atris.*

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Parva in hac familia. Caput atrum, immaculatum. Thorax hirtus, flauescens fascia inter alas nigra. Abdomen hirtum, flauescens ano atro. Corpus atrum.

*alata.* 43—4. *A. hirta flauescens capite anque nigris.*

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Statura praecedentis at thorax immaculatus.

*muraria.* 50—1. *A. hirta nigra aut fulua pedibus nigris: tarsis testaceis.*

Geoff. Inf. 2. 409. 4.

Reaum. Inf. 6. tab. 7. 8.

Schaeff. Monogr. Mouerbiene.

Habitat in Germaniae, Galliae muris nidum e fabulo plures cellulas continentem struens at solitaria.

Affinis *A. amethystinae* at distincta. Mestotus hirtus, ater tarsis solis testaceis. Alae cyaneae. Faemina nigra fronte thoracis ab dominisque dorso fuluo. Alae albae.

59—60. *A. cinereo villosa abdomine testaceo: ano nigro.*

*indica.*

Habitat in Indiae arboribus cauis, aedificiis strenue mellificans Dom. Daldorff.

A. mellifica duplo minor. Antennae nigrae. Caput et thorax cinereo villosa, immaculata. Scutellum testaceum. Abdomen nudum, testaceum ano nigro. Pedes nigri tibias pollicis compressis.

59—60. A. atra alis coerulecenti fuscis. *carbonaria*.

*Apis carbonaria* Linn. sylt. Nat. a. 954. 7.

Habitat Tranquebariae Dom. Lund.

Distincta omnino ab *Andrena carbonaria*. Frons cinereo hirta. Corpus atrum. Alae fuscoceruleae.

82—3. A. thorace ferrugineo tomentoso, abdo-

mine subgloboso nigro: segmentis margine flavis.

Habitat Cajennae strenue mellificans Dom. Bosc.

Statura parua praecedentium. Labium flavum lineolis duabus fuscis. Antennae ferrugineae articulo primo longiori, nigro. Thorax ferrugineo hirtus. Abdomen subglobosum, nigrum segmentorum marginibus flavis. Pedes nigricantes.

83—4. A. hirta nigra thorace ferrugineo, pedi-

bus flavis.

Habitat in America boreali strenue mellificans cera atra Dom. Bosc.

Statura et summa affinitas A. fauofae. Thorax pilis densis, ferrugineis hirtus. Abdomen subglobosum, nigrum. Pedes flavi.

- grisea.* 101—2. A. ferrugineo villoso abdome nigro:  
segmentorum marginibus griseis.  
Habitat in Italia Dr. Allioni.  
Parua. Antennae nigrae. Caput et thorax fus-  
ca, ferrugineo villosa. Abdomen nigrum seg-  
mentorum marginibus cinereo ferrugineis.  
Pedes ferruginei.
- pallens.* 110—1. A. pallide testacea labio cinereo villosa.  
Habitat Cajennae Dom. Richard.  
Parua tota pallide testacea labio solo cinereo  
pubescente. Tibiae posticae valde compres-  
sae. Alae albidae.
- flavicornis.* 111—12. A. nigra abdominis segmentis tribus  
apice albis, antennis flavis, tibiis posticis  
hirsutissimis.  
Habitat Surinami Dom. Richard.  
Parua. Caput et thorax nigra hirsutie parua  
cinerea. Antennae flavae. Abdomen ni-  
grum segmento 2. 3. 4. apice albidis. Pedes  
nigri tibiis posticis hirsutissimis.
- cinerea.* 119—20. A. cinereo pubescens abdome atro:  
segmentorum marginibus albo ciliatis.  
Habitat in India orientali Dom. Daldorff.  
Corpus paruum, nigrum. Caput et thorax  
cinereo pubescentia. Abdomen atrum, ni-  
tidum segmentorum marginibus albo cilia-  
tis. Alae albae costa nigra. Pedes rufef-  
centes.
- seladonia.* 120—1. A. hirta virescens abdominis segmentis  
margine albo.  
Habitat in Italia Dr. Allioni.

Parua. Caput et thorax virescens, cinereo pubescentia. Abdomen virescens segmentorum marginibus latè albis. Pedes cinerei feminoribus albis.

121—2. A. viridis nitida antennis pedibusque *aenea*. nigris.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Nimis affinis A. smaragdula et forte mera eius varietas. Corpus totum nudum, viridi acneum, nitidum. Labium cinereum. Antennae pedesque nigri.

122—3. A. atra coeruleo nitida labio puncto, *calloso*. thorace calloso utrinque ante alas albis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura omnino A. minutae at paullo maior. Corpus atrum, coeruleo nitidum. Labium puncto oblongo albo. Thorax ater puncto utrinque calloso ante alas albo. Pedes nigri apice pilis pallidis ciliati.

123—4. A. nigra viridi nitida abdomine albo: *paruula*. segmentis basi atris.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Minutissima. Antennae supra nigrae, subtus albidae. Caput nigrum, viridi nitens labio albido. Thorax viridi nitens scutello albo: striga media nigra. Abdomen album, nitidum segmentis basi nigris. Pedes pilosi, albi.

EUCERA. *Os lingua septemfida.*

*Labium* quinquefidum: la-  
ciniis intermediis maiori-  
bus, apice palpigeris.

*Antennae cylindricae.*

*breuicornis.* 8. E. *ferrugineo hirta* abdome aenco, anten-  
nis breuibus nigris.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

*Antennae cylindricae* omnino huius generis at  
thorace breuiores. Caput et thorax ferru-  
gineo *hirta*. Abdomen obscure aeneum,  
pilis rarioribus hirtum. Pedes ferrugineo  
hirti.

*craffipes.* 9. E. *cinereo hirta* abdome atro: segmentorum  
marginibus virecentibus, femoribus posti-  
cis incrassatis.

Habitat Tranquebariae D. Daldorff Muſ. Dom.  
Lund.

Statura omnino huius generis. Antennae cy-  
lindricae, thorace breuiores, piceae. Ca-  
put et thorax cinereo *hirta*. Abdomen atrum  
segmentorum marginibus virecentibus. Alae  
obtcurae, apice fuscae. Pedes flauescentes  
femoribus posticis incrassatis, dentatis, ni-  
gris tibiis incurvis, dentatis, flauis.

**FORMICA.** *Palpi inaequales: articulis cylindricis.*

*Labium submembranaceum, cylindricum, apice palpigerum.*

*Antennae filiformes.*

9—10. *F. atra abdomine cinereo sericeo, thorace postice bidentato.*

Habitat in Senegalia Mus. Dom. Boe.

Statura F. nigrae. Caput magnum, atrum antennarum primo articulo basi rufum. Thorax niger, postice compressus, canaliculatus terminatus denticulis duobus obtusis. Abdomen subglobosum, cinereo nitidum, sericeum. Pedes nigri.

11—12. *F. nigra thorace abdominis primo segmento ferruginea, femoribusque ferrugineis.*

Habitat in America.

Statura F. rufae at duplo maior. Caput magnum, glabrum, nigrum. Thorax compressus, ferrugineus squama integerrima, ouata. Abdomen hirsutum, fuscum primo segmento ferrugineo. Pedes nigri femoribus ferrugineis.

27—8. *F. nigra pedibus ferrugineis, abdomine conico.*

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

*F. pallipes* paullo maior. Corpus atrum, nitidum pedibus solis rufis. Abdomen conicum, acutum squama integerrima ouata, obtusa.

*cylindrica.* 31—2. F. atra capite cylindrico rufo: ore atro.

Habitat in India Mus. Dom. Bosc.

Media. Caput magnum, cylindricum, rufum  
ore atro.

Mandibulæ exsertæ, intus dentatae. Thorax  
parum compressus, ater. Abdomen cylin-  
dricum, atrum, immaculatum. Pedes ni-  
gri. Alae obscuræ.

*flavicornis.* 38—9. F. thorace hirto ferrugineo nigra anten-  
nis apice flavis.

Habitat Cajennæ.

Magna, elongata. Caput nigrum, obscurum  
mandibulis porrectis, apice incrassatis, ob-  
lique truncatis, ferratis. Antennæ nigrae,  
apice flavæ. Thorax pilis densis ferrugi-  
neis testus. Petiolus brevis, basi pari tuber-  
culorum obtusorum. Squama integerrima  
crassa, latissima. Abdomen ovatum, obscu-  
rum. Pedes nigri. Alae subferrugineæ.

*tarsata.* 38—9. F. thorace inermi nigra tarsis anticis sub-  
tus rufo hirtis.

Habitat in Insula Goré Africæ Dom. Bosc.

Statura et magnitudo praecedentis tota nigra,  
immaculata, distincta tarsis anticis rufo  
hirtis.

*stuberculata.* 38—9. F. thorace inermi ferruginosa mandibulis  
exsertis dentatis, petiolo binodi.

Habitat Cajennæ Mus. Dom. Bosc.

Praecedentibus minor. Corpus totum pilosum,  
ferrugineum. — Petiolus elongatus tuberculis  
duobus eleuatis.

42—3. F. thorace antice bispinoso nigra mandi-*fungosa*.

bulis exsertis apice truncatis serratis.

Habitat Cajennae in nidis magnis, fungosis et  
tomento plantarum confectis.

Parua. Caput medium, ovatum, nigrum antennaruin primo articulo ferrugineo. Mandibulae exsertae, truncatae, serratae. Thorax antice utrinque spina valida armatus, niger, immaculatus. Abdomen rotundatum, atrium.

MUTILLA. *Palpi articulis obconicis.*

*Labium porrectum, cornuum, obconicum, apice palpigerum.*

*Antennae filiformes.*

13—14. M. nigra abdome puncto dorsali fasciata.

cuisse albis.

Habitat in Americae Insulis Mus. Dom. Bosc.

Caput et thorax atra, immaculata. Abdomen hirtum, atrum macula magna dorsali secundi segmenti apicibusque approximatis reliquorum segmentorum albis. Pedes nigri.

19—20. M. hirta nigra thoracis margine antico pedemone-

cinereo, abdominis secundo segmento rufo tana.

posticeque fasciis duabus cinereis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

M. italica duplo minor. Caput atrum. Tho-

rax niger margine antico scutelloque cine-  
reis. Abdomen conicum segmento secundo

rufo quarto quintoque fascia e pilis cinereo  
argenteis. Alae fuscae. Pedes nigri.

*calua*, 24—5. M. nigra vertice thoraceque rufis, abdo-  
mine segmentis margine cinereis.

Habitat in Gallia Dom. Latreille.

Corpus paruum, hirtum, nigrum. Caput ni-  
grum vertice, antennisque rufis. Thorax  
rufus. Abdomen nigrum segmentorum mar-  
ginibus cinereo ciliatis. Pedes rufi.

*vagans*. 27—8. M. rufa abdomine obscuriore segmento-  
rum marginibus punctisque duobus secundi  
segmenti albis.

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo M. nigripes. Caput ru-  
fum antennis nigris. Thorax hirtus, rufus.  
Abdomen magis obscurum segmentis omni-  
bus margine albis secundoque maiori pun-  
ctis duobus dorsalibus albis. Pedes rufi ti-  
biis obscurioribus.