

FORMICA LIGNITUM GERM.

F. LIGNITUM: capite thorace angustiori, abdomine breviter petiolato, tumido.

In carbone fossili territorii Rheni prope Bonnam.

Magnitudine F. Herculeanae. Caput oblongo-ovatum, thorace angustiss., antennis fractis, tenuibus. Thorax ovatus, magnus, alis (in specimine mutilatis) instructus. Squama petiolaris vix observanda. Abdomen brevissime petiolatum, magnum, thorace majus, triannulatum, apice obtusum. Pedum rudimenta linearia, gracilia.

Magnitudine naturali depicta.

(XLX.)

Germar, E.F. 1837.



Formica lignitum.

INDEX FASCICULI UNDEVICESIMI.

- | | | | |
|---------|-------------------------|----------|--------------------------|
| Tab. 1. | Dytici larva. | Tab. 13. | Saperda lata. |
| 2. | Buprestis major. | 14. | Molorchus antiquus. |
| 3. | Buprestis alutacea. | 15. | Coccinella ? protogaeae. |
| 4. | Buprestis carbonum. | 16. | Locusta extincta. |
| 5. | Silpha stratum. | 17. | Belostoma Goldfussii. |
| 6. | Geotrupes vetustus. | 18. | Alydus pristinus. |
| 7. | Platycerus sepultus. | 19. | Formica lignitum. |
| 8. | Tenebrio effossus. | 20. | Ypsolophas insignis. |
| 9. | Trogosita tenebrioides. | 21. | Empis carbonum. |
| 10. | Bruchus ? bituminosus. | 22. | Bibio xylophilus. |
| 11. | Brachycerus exilis. | 23. | Bibio lignarius. |
| 12. | Prionus umbrinus. | 24. | Phthiria ? dubia. |
| | | 25. | Helophilus primarius. |