

SERENISSIMO PRINCIPI

A C

DOMINO DOMINO

ERNESTO FRIDERICO

DUCI SAXONIÆ,

JULIACI, CLIVIÆ, MONTIUM

A C

WESTPHALIÆ;

COMITI THURINGIÆ;

MARCHIONI MISNIÆ;

COMITI PRINCIPI

HENNEBERGIÆ;

COMITI MARCÆ

E T

RAVENSBERGI;

DYNASTÆ IN RAVENSTEIN;

EQUITI REG. POL. ORD.

AQUILÆ CANDIDÆ

etc. etc.

PRINCIPI AC DOMINO

CLEMENTISSIMO.

[1763]

IOANNIS ANTONII SCOPOLI
MED. DOCT. S. C. R. ET APOST. MAIEST. MONTANÆ
CIVITATIS IDRIÆ PHYSICI

**ENTOMOLOGIA
CARNIOLICA**

EXHIBENS

**INSECTA
CARNIOLIÆ INDIGENA**

^{E T}
DISTRIBUTA IN ORDINES, GENERA,
SPECIES, VARIETATES.

METHODO LINNÆANA.



VINDOBONAE,
TYPIS IOANNIS THOMAE TRATTNER,
CAES. REG. AVLÆ TYPOGR. ET BIBLIOP.

MDCCLXIII. xxxvi + 420 pp.

co flavo. Antennæ nigræ: basi subtus flava. Frons flava. Tibiæ flavæ.

831. *VESPA Maculata.*

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Abdomen punctorum flavorum paribus tribus: primo remotissimo.

Araneæ tela involutam cœpi, 15. Junii, in horto.

Caput totum nigrum. Thorax antice lineola terminatus, punctoque flavo laterali supra alas posito. Abdomen acumine deflexo, antice non truncatum, sed convergens, subtus immaculatum nitens. Thorax & caput punctis prominulis scabra, abdomen punctis impressis. Pedes nigri.

F O R M I C A. (†)

LINN. *Syst. Nat.* pag. 579.

832. *FORMICA Herculeana.*

Abd. long. lin. 3.

LINN. *Syst. Nat.* p. 579.

Faun. Svec. 2. 1720.

Diagn. Nostrarum maxima, nigra; abdomine oblongo.

Habitat in cariosis putridisque arborum truncis.

Tria puncta impressa, seu foveolæ in vertice capitis. Maxillæ dentibus (5). Squama rotunda integræ. Femora modo nigra, modo plus minus rufescens, sed vere ferruginea nunquam.

833. *FORMICA Vaga.*

— long. lin. 1 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Nigra; abdomine ovato piloso.

Ha-

(†) Genus gregarium, satagens, inquietum, melliphagum, ferox, suæ lobolis amans, vindictæ cupidum, terram purgat a quisquiliis, resinam balsamicam congregat, scatet spiritu volatili nervino subacido; œconomiæ & sedulitatis humanae cathedra.

Habitat in putridis arboribus.

Puncta aut foveæ in capite nullæ. Thorax postice in singulo latere duo parva tubercula gerit. Squama integerrima, rotundata. Abdomen pilosum.

834. FORMICA Nigra.

— long. lin. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 580.

Faun. Svec. 2. 1723.

Diagn. Nigra nitens; squamula integra.

Habitat in terra.

Minor priore; abdome paucis pilis adsperso.

835. FORMICA Libera.

— long. lin. 1.

LINN. Obsoleta? Faun. Svec. 2. 1724.

descriptio certe in multis convenit.

Diagn. Nigra; antennis basi tibiisque rufis.

In terra degit, sine lege excurrens; nec cespites efficiens.

Squama integra, obtusa. Abdomen brevibus villis adspersum.

836. FORMICA Rufa.

— long. lin. 1½.

LINN. Syst. Nat. p. 580.

Faun. Svec. 2. 1721.

Diagn. Fusca; capite antice thoraceque rufis.

Habitat ad radices *Abietum*, *Betularum* &c. intra acervos vegetabilibus compositos.

Squama integra; apice nigricante. Pedes fuscescentes.

Harum ovulis seu embryonibus, pulli *Tetraonis Urogalli* & *Coturnicis* certo educantur.

837. FORMICA Cespitum.

— long. lin. ½.

LINN. Syst. Nat. p. 581.

Faun. Svec. 2. 1726.

Diagn. Abdominis petiolus nodis duobus alternis: posteriore majore.

In gramineis, tuberosis.

Thorax bispinosus, seu postice duabus spinis terminatus, quæ squamulæ loco sunt. Maxillæ dentibus sex. Abdomen nitidum, subrotundum.

Descriptiones neutrarum sunt.

M U T I L L A.

LINN. *Syst. Nat.* p. 582.

838. MUTILLA *Saltatrix*.

— long. — —

Huc refero animal 21. Martii cum floribus *Farfaræ* lectum, pediculo triplo minus, fuscum glabrum; maxillis pedibusque ferrugineis; antennis motatoriis, infractis, thorace longioribus: articulo oblongo, acuto, fusco clavatis; stipite albido; abdome ovato, subtus jugo seu plica compressa instructo. Hæc currit velociter, leviter tacta saltat, antennas assiduo agitat.



OR-

ORDO VI.
HALTERATA.
DIPTERA (†)
LINN. *Syst. Nat.* p. 584.

HALTERES CLAVATI SOLITARIIS PO-
NE SINGULAM ALAM.

OESTRUS.
LINN. *Syst. Nat.* l. c.

Cum speciem hujus generis nullam hactenus
examinaverim, ita de charactere generico nihil
statuo. Ill. LINNAEUS OS absque proboscide aut
rostro exerto ponit, FRISCHIUS autem in descrip-
tione *Oestrus Bovini*, ait habere rostrum retractile,
ut *Musca Domestica*.

TIPULA.

LINN. *Syst. Nat.* p. 585.

Os inerme, elongatum, antice palpiferum:
palpis duobus.

(*) *Antennis masculis compositis.*

839. TIPULA Peclinicornis.

Alæ long. lin. 6½.
LINN. *Syst. Nat.* p. 585.
Faun. Svec. 2. 1735.

Tipu-

(†) Ignota oris fabrica, nulla de his generibus cer-
titudo.